

2.04.6: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Beimischung

Deutschland (alle Länder) / Gesamtdeckungsgrad: >= 30 %

nur begehbare Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), NICHT mit DG reduziert / Flächenbezug: Reell(143/E338)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	6.373	90.970	52.714	150.057	32.081	182.138
Buchen-Typ	138.975	229.266	110.245	478.486	243.697	722.184
Eschen-Typ	3.797	134.593	17.986	156.375	30.638	187.013
Birken-Typ	11.663	40.019	53.470	105.152	11.041	116.193
Erlen-Typ	4.894	9.972	5.193	20.059	8.475	28.534
ALN ^{*2} -Typ	16.167	126.535	41.949	184.651	54.989	239.640
ALH ^{*1} -Typ	25.239	360.862	95.830	481.931	100.262	582.192
Fichten-Typ	47.770	320.757	116.942	485.469	232.072	717.541
Tannen-Typ	14.795	12.590	31.987	59.372	6.091	65.463
Douglasien-Typ	4.385	7.281	9.772	21.438	1.897	23.335
Kiefern-Typ	9.784	55.201	20.940	85.926	71.763	157.689
Lärchen-Typ	1.396	3.188	4.188	8.772	1.696	10.467
mehrere gleichrangige Baumarten	8.392	84.747	136.259	229.398		229.398
alle Bestockungstypen	293.628	1.475.982	697.475	2.467.085	794.702	3.261.787

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Pappel, Roterle)

2.04.6: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Beimischung

Sachsen / alle Eigentumsarten / Gesamtdeckungsgrad: >= 30 %

nur begehbare Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), NICHT mit DG reduziert / Flächenbezug: Reell(143/E338)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	798	2.393	798	3.989	2.792	6.781
Buchen-Typ	1.197	3.989	3.191	8.377	2.792	11.169
Eschen-Typ		1.197		1.197		1.197
Birken-Typ	1.396	3.191	3.789	8.377	598	8.975
Erlen-Typ		598		598	598	1.197
ALN ^{*2} -Typ	199	7.978	2.992	11.169	3.191	14.360
ALH ^{*1} -Typ	1.994	14.560	2.593	19.147	4.188	23.335
Fichten-Typ	399	16.753	2.593	19.745	11.568	31.313
Tannen-Typ					199	199
Douglasien-Typ	199			199		199
Kiefern-Typ	798	8.975	997	10.770	10.371	21.141
Lärchen-Typ	199	399	399	997	199	1.197
mehrere gleichrangige Baumarten	199	6.582	7.579	14.360		14.360
alle Bestockungstypen	7.379	66.615	24.931	98.925	36.499	135.424

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Pappel, Roterle)

2.04.6: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Beimischung

Sachsen / alle Eigentumsarten / Bäume unter 4 m Höhe aus Naturverjüngung / Gesamtdeckungsgrad: >= 30 %

nur begehbare Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), NICHT mit DG reduziert / Flächenbezug: Reell(143/E338)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	199	997	199	1.396	199	1.596
Buchen-Typ	798	1.795	598	3.191	997	4.188
Eschen-Typ		997		997		997
Birken-Typ	1.396	2.792	3.391	7.579	598	8.177
Erlen-Typ		598		598	199	798
ALN ^{*2} -Typ	199	7.778	2.992	10.970	3.191	14.161
ALH ^{*1} -Typ	1.197	13.363	2.393	16.953	3.590	20.543
Fichten-Typ	199	9.374	997	10.571	5.385	15.956
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ						
Kiefern-Typ	399	5.385	997	6.781	6.382	13.163
Lärchen-Typ						
mehrere gleichrangige Baumarten		4.986	4.787	9.773		9.773
alle Bestockungstypen	4.388	48.066	16.355	68.809	20.543	89.352

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Pappel, Roterle)

2.04.6: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Beimischung

Sachsen / alle Eigentumsarten / Bäume unter 4 m Höhe aus Pflanzung / Gesamtdeckungsgrad: $\geq 30\%$

nur begehbare Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), NICHT mit DG reduziert / Flächenbezug: Reell(143/E338)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	598	1.197	598	2.393	2.393	4.787
Buchen-Typ	399	1.994	2.593	4.986	1.396	6.382
Eschen-Typ		199		199		199
Birken-Typ			399	399		399
Erlen-Typ					199	199
ALN ^{*2} -Typ						
ALH ^{*1} -Typ	798	1.197	199	2.194	598	2.792
Fichten-Typ	199	7.180	1.596	8.975	5.983	14.958
Tannen-Typ					199	199
Douglasien-Typ	199			199		199
Kiefern-Typ	399	3.391		3.789	3.989	7.778
Lärchen-Typ	199	399	199	798	199	997
mehrere gleichrangige Baumarten	199	1.197	2.792	4.188		4.188
alle Bestockungstypen	2.992	16.753	8.377	28.122	14.958	43.080

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Pappel, Roterle)