

2.05.12: Anteil naturnaher Bestockungen an der Waldfläche nach Bestockungstyp und Altersklasse

für 2002/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

Deutschland (alle Länder) / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(127/E329)


	0 (un- gleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Alters- klassen
Eichen-Typ	16,7%	34,6%	27,1%	34,8%	37,6%	49,0%	56,1%	66,1%	64,0%	62,6%	46,8%
Buchen-Typ	84,3%	80,1%	81,3%	74,9%	78,0%	78,5%	84,2%	87,7%	89,5%	93,4%	82,4%
Eschen-Typ	100,0%	43,0%	40,0%	45,2%	47,7%	57,4%	68,3%	51,0%	86,7%	66,5%	48,6%
Birken-Typ		26,2%	34,9%	28,4%	34,2%	27,7%	41,2%	87,5%			30,5%
Erlen-Typ	66,7%	27,5%	43,3%	44,9%	44,2%	54,9%	38,4%	45,9%			42,8%
ALN ² -Typ		8,8%	5,1%	8,2%	27,6%	29,6%	40,1%	33,4%			10,4%
ALH ¹ -Typ		29,2%	24,5%	26,8%	30,2%	40,5%	50,2%	59,2%	37,2%	38,2%	32,2%
Fichten-Typ	79,2%	21,8%	18,7%	23,4%	25,5%	31,7%	36,4%	51,9%	67,9%	81,4%	27,4%
Tannen-Typ	98,3%	36,9%	37,6%	58,9%	74,4%	74,9%	84,2%	85,7%	89,2%	88,2%	71,7%
Douglasien-Typ											
Kiefern-Typ	55,7%	11,0%	12,1%	12,1%	14,7%	17,3%	20,0%	26,1%	34,5%	40,7%	15,2%
Lärchen-Typ											
mehrere gleichrangige BA	68,0%	33,6%	22,9%	25,3%	30,7%	46,7%	49,7%	53,7%	57,6%	64,1%	36,3%
alle Bestockungstypen	78,9%	26,9%	21,8%	25,2%	32,0%	38,6%	49,2%	63,6%	74,4%	78,1%	35,2%

ALH¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Baumarten und Altersklassen in Deutschland

Hauptbestockung / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden



2.05.12: Anteil naturnaher Bestockungen an der Waldfläche nach Bestockungstyp und Altersklasse

für 2002/ **alle Eigentumsarten**/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(127/E329)


	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Alters- klassen
Eichen-Typ	31,6%	14,3%	29,5%	40,9%	29,6%	28,6%	78,6%	87,5%		37,4%
Buchen-Typ	100,0%	77,8%	30,8%	56,3%	100,0%	66,7%	50,0%	100,0%	50,0%	67,5%
Eschen-Typ			33,3%			50,0%		100,0%		40,0%
Birken-Typ	24,2%	24,4%	27,4%	19,0%	14,3%		100,0%			24,7%
Erlen-Typ	16,7%	50,0%		22,2%						20,0%
ALN ² -Typ	6,7%									3,2%
ALH ¹ -Typ	16,7%	16,7%	37,5%	42,9%	22,2%	66,7%	100,0%	100,0%		32,4%
Fichten-Typ	16,3%	26,5%	28,4%	23,1%	24,9%	29,4%	11,1%			24,6%
Tannen-Typ										
Douglasien-Typ										
Kiefern-Typ	27,3%	19,7%	22,9%	23,9%	21,8%	25,6%	21,2%	16,7%		23,0%
Lärchen-Typ										
mehrere gleichrangige BA	7,1%	14,3%			16,7%	25,0%	100,0%		100,0%	14,3%
alle Bestockungstypen	20,3%	22,9%	25,4%	24,6%	24,8%	29,2%	35,6%	75,0%	40,0%	25,5%

ALH¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Baumarten und Altersklassen in Sachsen

Hauptbestockung / alle Eigentumsarten / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden



2.05.12: Anteil naturnaher Bestockungen an der Waldfläche nach Bestockungstyp und Altersklasse

für 2002/ Eigentumsart: **Staatswald (Bund)**/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(127/E329)


	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Alters- klassen
Eichen-Typ										
Buchen-Typ				100,0%		100,0%				100,0%
Eschen-Typ										
Birken-Typ	33,3%	20,0%		100,0%						30,8%
Erlen-Typ										
ALN ^{*2} -Typ										
ALH ^{*1} -Typ										
Fichten-Typ										
Tannen-Typ										
Douglasien-Typ										
Kiefern-Typ	70,6%	84,6%	57,7%	53,8%	43,8%	27,3%	66,7%			56,7%
Lärchen-Typ										
mehrere gleichrangige BA										
alle Bestockungstypen	50,0%	54,5%	42,9%	56,3%	38,9%	33,3%	57,1%			46,4%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Baumarten und Altersklassen im Bundeswald Sachsen

Hauptbestockung / Staatswald (Bund) / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden



2.05.12: Anteil naturnaher Bestockungen an der Waldfläche nach Bestockungstyp und Altersklasse

für 2002/ Eigentumsart: **Staatswald (Land)**/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(127/E329)


	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Alters- klassen
Eichen-Typ	28,6%	50,0%	6,7%			20,0%	100,0%	100,0%		28,9%
Buchen-Typ	100,0%	100,0%	37,5%	71,4%	100,0%	50,0%	33,3%	100,0%	40,0%	69,6%
Eschen-Typ								100,0%		100,0%
Birken-Typ	16,7%	20,0%	20,0%							16,2%
Erlen-Typ		25,0%								14,3%
ALN ² -Typ										
ALH ¹ -Typ		50,0%	66,7%					100,0%		41,2%
Fichten-Typ	29,3%	35,9%	34,4%	31,0%	29,1%	42,6%	12,5%			33,0%
Tannen-Typ										
Douglasien-Typ										
Kiefern-Typ	6,7%	5,4%	5,7%		4,8%	6,3%				4,8%
Lärchen-Typ										
mehrere gleichrangige BA	12,5%				50,0%				100,0%	22,2%
alle Bestockungstypen	23,8%	26,5%	24,4%	23,3%	25,9%	35,1%	25,0%	94,1%	42,9%	27,3%

ALH¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Baumarten und Altersklassen im Landeswald Sachsen

Hauptbestockung / Staatswald (Land) / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden



2.05.12: Anteil naturnaher Bestockungen an der Waldfläche nach Bestockungstyp und Altersklasse

für 2002/ Eigentumsart: **Körperschaftswald**/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(127/E329)


	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Alters- klassen
Eichen-Typ	66,7%		25,0%	100,0%	50,0%					50,0%
Buchen-Typ		66,7%	100,0%	66,7%				100,0%		75,0%
Eschen-Typ								100,0%		50,0%
Birken-Typ			20,0%							7,1%
Erlen-Typ		100,0%								33,3%
ALN ² -Typ										
ALH ¹ -Typ	50,0%			100,0%	50,0%					21,4%
Fichten-Typ		10,0%	22,7%	17,9%	37,5%		25,0%			17,4%
Tannen-Typ										
Douglasien-Typ										
Kiefern-Typ		7,7%		16,7%				50,0%		5,9%
Lärchen-Typ										
mehrere gleichrangige BA										
alle Bestockungstypen	8,8%	14,7%	14,8%	22,9%	30,6%		20,0%	60,0%		17,7%

ALH¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Baumarten und Altersklassen im Körperschaftswald Sachsen

Hauptbestockung / Körperschaftswald / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden



2.05.12: Anteil naturnaher Bestockungen an der Waldfläche nach Bestockungstyp und Altersklasse

für 2002/ Eigentumsart: **Privatwald**/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(127/E329)


	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Alters- klassen
Eichen-Typ	40,0%		57,1%	40,0%	30,0%	33,3%	60,0%	100,0%		40,3%
Buchen-Typ	100,0%	100,0%			100,0%			100,0%	100,0%	63,6%
Eschen-Typ			50,0%							33,3%
Birken-Typ	31,3%	29,4%	20,0%	27,3%	33,3%		100,0%			27,5%
Erlen-Typ	16,7%	100,0%		16,7%						16,7%
ALN ^{*2} -Typ										
ALH ^{*1} -Typ	16,7%		55,6%	50,0%		66,7%	100,0%			36,7%
Fichten-Typ	5,4%	18,0%	18,8%	18,0%	8,3%	8,3%				13,9%
Tannen-Typ										
Douglasien-Typ										
Kiefern-Typ	17,1%	12,3%	22,2%	24,1%	20,9%	33,3%	13,3%			20,9%
Lärchen-Typ										
mehrere gleichrangige BA						33,3%				5,3%
alle Bestockungstypen	15,1%	15,5%	25,2%	23,0%	19,5%	27,2%	25,9%	75,0%	100,0%	21,3%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Baumarten und Altersklassen im Privatwald Sachsen

Hauptbestockung / Privatwald / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden



2.05.12: Anteil naturnaher Bestockungen an der Waldfläche nach Bestockungstyp und Altersklasse

für 2002/ Eigentumsart: **Treuhandwald**/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(127/E329)

	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Alters- klassen
Eichen-Typ			30,0%	50,0%	33,3%	25,0%	85,7%	50,0%		39,4%
Buchen-Typ				33,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		50,0%
Eschen-Typ						100,0%				33,3%
Birken-Typ		27,3%	50,0%							33,3%
Erlen-Typ				100,0%						50,0%
ALN ^{*2} -Typ	25,0%									12,5%
ALH ^{*1} -Typ					33,3%		100,0%			22,2%
Fichten-Typ		22,2%	14,3%	9,1%		20,0%				10,2%
Tannen-Typ										
Douglasien-Typ										
Kiefern-Typ	33,3%	33,3%	36,0%	30,0%	35,7%	37,5%	12,5%			32,1%
Lärchen-Typ										
mehrere gleichrangige BA		50,0%					100,0%			28,6%
alle Bestockungstypen	13,9%	26,9%	28,6%	23,8%	24,2%	36,8%	55,6%	50,0%		27,8%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Baumarten und Altersklassen im Treuhandwald Sachsen

Hauptbestockung / Treuhandwald / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden

