

2.13.3: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **mit Schäden**

Deutschland (alle Länder) /nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	7,4%	10,7%	11,5%	16,7%	20,7%	22,3%	22,9%	25,6%	27,8%	34,8%	11,9%
Buche	15,5%	23,3%	29,1%	36,0%	41,3%	45,3%	47,3%	50,5%	50,8%	48,1%	25,7%
ALH ^{*1}	11,0%	13,8%	17,6%	20,5%	22,5%	26,5%	27,8%	30,4%	36,8%	54,6%	14,3%
ALN ^{*2}	10,8%	11,2%	11,7%	12,7%	13,4%	17,3%	15,8%	14,1%	17,6%	17,4%	11,3%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>11,8%</i>	<i>15,7%</i>	<i>19,0%</i>	<i>24,8%</i>	<i>30,4%</i>	<i>34,9%</i>	<i>35,8%</i>	<i>37,3%</i>	<i>37,3%</i>	<i>38,9%</i>	<i>17,1%</i>
Fichte	16,3%	24,5%	33,5%	39,9%	42,2%	40,4%	37,7%	32,9%	27,8%	27,7%	28,2%
Tanne	12,3%	18,7%	19,6%	22,2%	23,0%	24,7%	23,3%	31,1%	33,8%	39,4%	19,0%
Douglasie	19,4%	14,5%	13,0%	16,2%	13,0%	15,5%	18,8%	17,2%	17,0%	6,5%	15,2%
Kiefer	20,2%	16,0%	12,2%	14,7%	19,3%	24,9%	31,5%	34,7%	66,5%	54,3%	16,2%
Lärche	10,8%	10,8%	10,9%	12,2%	13,9%	15,4%	11,3%	12,7%	15,9%	20,7%	11,3%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>18,1%</i>	<i>20,1%</i>	<i>23,1%</i>	<i>28,0%</i>	<i>33,0%</i>	<i>34,6%</i>	<i>32,9%</i>	<i>30,5%</i>	<i>28,6%</i>	<i>29,6%</i>	<i>22,0%</i>
alle Baumarten	15,4%	18,5%	21,8%	27,1%	32,1%	34,7%	34,5%	35,1%	35,2%	37,6%	20,2%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **mit Schäden**

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		12,0%	7,9%	12,2%	13,7%	12,8%	14,2%	8,4%	19,5%	21,3%	8,8%
Buche	5,2%	16,2%	29,8%	30,9%	31,1%	32,1%	26,8%	37,9%	23,9%	51,2%	19,3%
ALH ^{*1}	8,6%	12,3%	12,3%	15,7%	10,5%	19,9%	25,4%	12,8%		30,1%	11,8%
ALN ^{*2}	18,3%	13,9%	12,0%	14,9%	15,1%	25,6%	7,4%				15,1%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>13,4%</i>	<i>13,5%</i>	<i>12,3%</i>	<i>16,7%</i>	<i>17,8%</i>	<i>21,3%</i>	<i>19,7%</i>	<i>21,0%</i>	<i>18,9%</i>	<i>42,7%</i>	<i>13,7%</i>
Fichte	20,2%	42,0%	58,5%	57,6%	54,9%	54,0%	40,6%	31,3%	100,0%	100,0%	44,3%
Tanne		100,0%									100,0%
Douglasie					20,8%	36,7%					2,7%
Kiefer	16,5%	12,4%	14,6%	19,7%	27,1%	24,2%	48,6%	100,0%			14,7%
Lärche	6,7%	5,7%	11,4%	12,2%	12,3%	8,1%	8,8%	23,9%			8,3%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>17,6%</i>	<i>25,2%</i>	<i>36,7%</i>	<i>41,6%</i>	<i>45,3%</i>	<i>46,1%</i>	<i>36,5%</i>	<i>36,9%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>28,1%</i>
alle Baumarten	16,4%	22,1%	31,4%	37,0%	39,3%	34,8%	24,4%	23,0%	20,5%	44,3%	24,4%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Staatswald (Bund)** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **mit Schäden**

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		32,7%	35,7%		54,9%						30,5%
Buche			66,4%	65,8%	100,0%	43,7%	56,2%	60,2%		40,2%	43,2%
ALH ^{*1}											
ALN ^{*2}		12,3%	11,2%	57,1%							11,4%
<i>alle Laubbäume</i>		13,2%	17,4%	31,8%	40,7%	31,2%	35,5%	60,2%		40,2%	14,4%
Fichte		77,5%	90,3%	85,3%	66,6%	100,0%					76,4%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	33,5%	22,5%	20,4%	24,0%	39,1%						25,9%
Lärche				23,6%							2,2%
<i>alle Nadelbäume</i>	31,7%	24,7%	30,1%	31,8%	46,1%	100,0%					28,8%
alle Baumarten	30,5%	22,5%	28,8%	31,8%	44,8%	54,1%	35,5%	60,2%		40,2%	27,0%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Staatswald (Land)** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **mit Schäden**

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		10,4%	6,3%	15,9%	14,1%	25,8%		23,2%	49,3%		8,0%
Buche	7,2%	17,3%	28,8%	36,1%	33,8%	33,1%	25,7%	35,5%	18,1%	53,9%	20,4%
ALH ^{*1}	32,0%	14,4%	24,0%		33,6%	14,2%	36,6%			53,8%	19,9%
ALN ^{*2}	27,1%	17,7%	18,6%	17,5%	8,0%	49,3%	51,7%				20,1%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>19,1%</i>	<i>15,8%</i>	<i>17,5%</i>	<i>22,2%</i>	<i>23,2%</i>	<i>30,7%</i>	<i>21,9%</i>	<i>31,2%</i>	<i>20,6%</i>	<i>51,3%</i>	<i>17,7%</i>
Fichte	28,6%	52,8%	65,5%	64,5%	61,9%	58,9%	35,3%	71,3%	100,0%		53,9%
Tanne		100,0%									100,0%
Douglasie					20,8%	36,7%					9,9%
Kiefer	17,4%	17,1%	15,2%	18,7%	27,9%	33,1%	48,8%				17,2%
Lärche		7,4%	8,3%	10,9%	12,1%	8,0%					7,8%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>24,8%</i>	<i>39,2%</i>	<i>51,8%</i>	<i>52,5%</i>	<i>52,6%</i>	<i>52,1%</i>	<i>29,1%</i>	<i>45,7%</i>	<i>100,0%</i>		<i>42,0%</i>
alle Baumarten	23,2%	33,6%	45,9%	49,1%	48,3%	45,5%	25,0%	33,2%	24,6%	51,3%	36,8%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Schälschäden (jung und alt) nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Staatswald (Land)** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **Schälschäden** (jung und alt)

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche											
Buche	7,2%	5,2%	5,1%		1,6%	3,6%					4,8%
ALH ^{*1}											
ALN ^{*2}	19,4%	8,2%	4,3%	7,2%							10,1%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>11,0%</i>	<i>5,0%</i>	<i>2,9%</i>	<i>3,1%</i>	<i>0,8%</i>	<i>2,1%</i>					<i>5,8%</i>
Fichte	26,7%	48,8%	52,4%	39,7%	30,7%	22,9%	9,7%				43,6%
Tanne		100,0%									100,0%
Douglasie											
Kiefer	12,7%	14,5%	3,4%	0,8%	0,9%						10,4%
Lärche											
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>22,1%</i>	<i>35,5%</i>	<i>39,3%</i>	<i>29,9%</i>	<i>23,6%</i>	<i>18,2%</i>	<i>7,3%</i>				<i>32,8%</i>
alle Baumarten	19,0%	28,2%	33,0%	26,8%	20,3%	13,2%	3,2%				26,9%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Rucke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Staatswald (Land)** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **Rucke- oder Fällschaden**

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		2,7%	2,1%	5,3%	7,5%	16,8%					2,5%
Buche		6,8%	11,2%	21,8%	22,0%	9,9%	5,3%	10,2%			8,1%
ALH ^{*1}	13,5%	6,3%	11,8%				36,6%				8,6%
ALN ^{*2}	3,3%	3,1%	7,5%	6,5%	2,6%	17,1%					4,1%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>3,4%</i>	<i>4,0%</i>	<i>7,0%</i>	<i>10,9%</i>	<i>13,0%</i>	<i>11,6%</i>	<i>6,6%</i>	<i>8,2%</i>			<i>5,1%</i>
Fichte	1,9%	4,6%	13,4%	25,9%	31,1%	35,7%	22,9%	26,9%	100,0%		10,8%
Tanne											
Douglasie						36,7%					4,2%
Kiefer	4,7%	2,4%	7,8%	6,3%	9,6%	10,2%					4,4%
Lärche		7,4%	3,6%	9,8%	12,1%	8,0%					6,5%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>2,6%</i>	<i>4,0%</i>	<i>11,7%</i>	<i>21,2%</i>	<i>26,1%</i>	<i>30,7%</i>	<i>17,3%</i>	<i>17,2%</i>	<i>100,0%</i>		<i>8,9%</i>
alle Baumarten	2,8%	4,0%	10,9%	20,0%	24,2%	24,8%	11,3%	9,4%	5,0%		8,1%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Körperschaftswald** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **mit Schäden**

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		6,3%	8,1%	9,9%			31,7%	24,3%			5,8%
Buche		3,7%	9,9%	40,2%	21,1%	8,5%	24,5%				8,0%
ALH ^{*1}		11,2%	10,2%	10,7%	6,1%						8,9%
ALN ^{*2}	14,4%	16,2%	9,3%	23,8%	15,6%	16,8%					14,8%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>6,5%</i>	<i>11,6%</i>	<i>9,3%</i>	<i>18,6%</i>	<i>11,7%</i>	<i>6,0%</i>	<i>23,9%</i>	<i>11,1%</i>			<i>10,8%</i>
Fichte	11,7%	24,1%	52,3%	49,8%	44,2%	48,4%	100,0%				32,7%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	2,5%	3,9%	17,9%	12,4%	24,8%						6,2%
Lärche			19,9%	16,3%	10,2%	32,3%					10,5%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>6,4%</i>	<i>13,6%</i>	<i>39,6%</i>	<i>39,4%</i>	<i>38,1%</i>	<i>37,7%</i>	<i>41,7%</i>				<i>20,5%</i>
alle Baumarten	6,4%	13,0%	31,6%	35,5%	34,0%	22,8%	26,7%	9,9%			18,1%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Privatwald** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **mit Schäden**

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		12,2%	8,0%	13,0%	15,3%	7,8%	12,4%		17,9%	34,7%	9,1%
Buche		19,5%	36,6%	11,7%	16,4%	31,5%	28,6%	45,9%	29,0%	100,0%	16,9%
ALH ^{*1}		15,8%	10,8%	19,7%	3,4%	29,0%	14,4%	22,1%			12,4%
ALN ^{*2}	18,6%	13,9%	7,4%	11,6%	24,0%	9,6%					14,6%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>14,1%</i>	<i>13,9%</i>	<i>9,0%</i>	<i>13,6%</i>	<i>15,8%</i>	<i>14,9%</i>	<i>14,1%</i>	<i>18,7%</i>	<i>22,4%</i>	<i>44,3%</i>	<i>13,1%</i>
Fichte	11,5%	33,5%	47,3%	45,5%	44,8%	42,3%	48,6%			100,0%	33,5%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	14,2%	10,4%	13,4%	21,9%	25,3%	30,9%	41,6%	100,0%			13,2%
Lärche	11,7%	5,2%	8,4%	6,2%	10,8%						7,8%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>13,4%</i>	<i>19,2%</i>	<i>25,1%</i>	<i>31,6%</i>	<i>36,1%</i>	<i>37,7%</i>	<i>45,9%</i>	<i>25,6%</i>		<i>100,0%</i>	<i>20,3%</i>
alle Baumarten	13,6%	17,8%	21,1%	26,8%	30,2%	24,4%	21,0%	19,9%	22,4%	51,7%	18,3%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Schälsschäden (jung und alt) nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Privatwald** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **Schälsschäden** (jung und alt)

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		1,5%									0,6%
Buche											
ALH ^{*1}											
ALN ^{*2}	11,5%	10,8%	0,7%								9,0%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>8,7%</i>	<i>7,3%</i>	<i>0,3%</i>								<i>5,7%</i>
Fichte	8,6%	23,8%	21,4%	12,7%	9,0%	5,0%	7,8%				18,8%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	14,2%	7,0%	1,4%	0,8%		7,8%					7,4%
Lärche	11,7%										3,6%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>12,6%</i>	<i>13,3%</i>	<i>8,4%</i>	<i>5,8%</i>	<i>5,1%</i>	<i>5,1%</i>	<i>4,9%</i>				<i>11,3%</i>
alle Baumarten	11,4%	11,7%	6,4%	4,3%	3,6%	2,1%	1,1%				9,8%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Privatwald** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **Rücke- oder Fällschaden**

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		4,5%	3,7%	4,5%	3,0%	1,6%	6,8%				3,3%
Buche				8,6%	5,6%	7,1%	7,9%				2,3%
ALH ^{*1}		11,2%	5,6%	11,0%		15,7%	14,4%				7,9%
ALN ^{*2}	3,9%	4,3%	3,2%	8,0%	18,2%						4,3%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>2,9%</i>	<i>5,2%</i>	<i>3,6%</i>	<i>7,2%</i>	<i>7,0%</i>	<i>4,8%</i>	<i>7,4%</i>				<i>4,4%</i>
Fichte	1,4%	6,2%	24,6%	29,7%	28,2%	29,9%	8,9%				11,9%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer		1,0%	5,1%	7,9%	7,3%	7,6%		100,0%			2,2%
Lärche		2,1%	8,4%	6,2%	10,8%						2,6%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>0,4%</i>	<i>3,1%</i>	<i>12,0%</i>	<i>17,1%</i>	<i>19,2%</i>	<i>24,3%</i>	<i>5,5%</i>	<i>25,6%</i>			<i>5,7%</i>
alle Baumarten	1,2%	3,7%	9,9%	14,5%	15,7%	12,9%	7,0%	4,5%			5,3%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.3: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Eigentumsart: **Treuhandwald** / Anteil an der Stammzahl / Stammschaden: **mit Schäden**

Sachsen / nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		12,6%	8,8%	7,1%	3,1%	19,2%	20,2%	7,1%			8,7%
Buche		28,4%	28,3%	19,5%	79,2%	44,2%	22,0%		100,0%	46,9%	25,9%
ALH ^{*1}		7,5%	9,2%	21,9%	16,8%	15,2%	100,0%				6,1%
ALN ^{*2}	12,6%	6,1%	14,5%	9,9%	9,8%	51,0%					10,2%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>8,2%</i>	<i>9,9%</i>	<i>12,5%</i>	<i>12,7%</i>	<i>12,6%</i>	<i>27,2%</i>	<i>25,2%</i>	<i>5,5%</i>	<i>16,7%</i>	<i>26,1%</i>	<i>10,1%</i>
Fichte	17,2%	28,9%	41,5%	41,6%	49,4%	33,8%					31,0%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	15,1%	8,4%	11,7%	13,6%	29,4%		100,0%				11,1%
Lärche			23,2%	16,1%	19,5%		100,0%	100,0%			14,5%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>15,6%</i>	<i>13,7%</i>	<i>22,0%</i>	<i>23,5%</i>	<i>39,1%</i>	<i>15,4%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>			<i>16,8%</i>
alle Baumarten	12,4%	12,5%	19,5%	20,7%	26,6%	23,9%	29,8%	9,9%	16,7%	26,1%	14,5%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer