Deutschland (alle Länder) / alle Eigentumsformen


nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	Schälschaden jünger 12 Mon.	Schälschaden älter 12 Mon.	Schälschäden (jung + alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilz- konsolen	Harz- lachten	Käfer- löcher	sonstige Schäden	mit Schäden	ohne Schäden
Eiche	0,1%	0,5%	0,6%	5,4%	0,2%	0,2%	0,0%	0,4%	5,8%	11,9%	88,1%
Buche	0,1%	4,0%	4,1%	16,2%	0,3%	0,2%	0,0%	0,1%	6,2%	25,7%	74,3%
ALH ^{*1}	0,1%	1,8%	1,9%	6,6%	0,2%	0,4%	0,0%	0,4%	5,7%	14,3%	85,7%
ALN ^{*2}	0,1%	1,5%	1,6%	3,1%	0,3%	0,7%	0,0%	0,4%	6,1%	11,3%	88,7%
alle Laubbäume	0,1%	2,3%	2,4%	8,8%	0,2%	0,4%	0,0%	0,3%	6,0%	17,1%	82,9%
Fichte	0,7%	14,0%	14,7%	10,8%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	4,2%	28,3%	71,7%
Tanne	0,1%	2,4%	2,4%	10,9%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	6,3%	19,0%	81,0%
Douglasie	0,5%	7,4%	7,9%	4,2%	0,0%		0,1%	0,0%	3,6%	15,2%	84,8%
Kiefer	0,1%	9,3%	9,5%	3,6%	0,1%	0,1%	0,3%	0,2%	3,0%	16,2%	83,8%
Lärche	0,1%	2,0%	2,1%	5,4%	0,1%	0,2%		0,1%	4,1%	11,3%	88,7%
alle Nadelbäume	0,4%	11,2%	11,7%	7,4%	0,1%	0,1%	0,3%	0,2%	3,7%	22,0%	78,0%
alle Baumarten	0,3%	8,0%	8,4%	7,9%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	4,5%	20,2%	79,8%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

Anteil geschädigter Bäume [%] nach Baumartengruppe und Stammschäden in Deutschland

alle Eigentumsarten / Anteil an der Stammzahl / Bäume > 7 cm Bhd. / alle Bestandesschichten



Sachsen / alle Eigentumsformen / Anteil an der Stammzahl


nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	Schälschaden jünger 12 Mon.	Schälschaden älter 12 Mon.	Schälschäden (jung + alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilz- konsolen	Harz- lachten	Käfer- löcher	sonstige Schäden	mit Schäden	ohne Schäden
Eiche		0,5%	0,5%	2,6%	0,0%	0,1%			5,7%	8,8%	91,2%
Buche		2,8%	2,8%	8,8%	0,3%	0,3%		0,0%	7,7%	19,3%	80,7%
ALH ^{*1}		0,5%	0,5%	6,4%	0,0%	0,3%		0,2%	4,6%	11,8%	88,2%
ALN ^{*2}	0,7%	6,6%	7,3%	3,8%	0,2%	0,6%		0,1%	3,9%	15,1%	84,9%
alle Laubbäume	0,4%	4,1%	4,4%	4,4%	0,2%	0,4%		0,1%	4,7%	13,7%	86,3%
Fichte	0,8%	30,8%	31,6%	11,6%	0,1%	0,0%		0,1%	2,7%	44,3%	55,7%
Tanne		100,0%	100,0%							100,0%	
Douglasie				1,2%					1,6%	2,7%	97,3%
Kiefer		9,1%	9,1%	2,7%	0,1%	0,0%	0,9%	0,2%	2,0%	14,7%	85,3%
Lärche		1,3%	1,3%	5,6%	0,1%				1,5%	8,3%	91,7%
alle Nadelbäume	0,4%	18,8%	19,2%	6,8%	0,1%	0,0%	0,5%	0,1%	2,3%	28,1%	71,9%
alle Baumarten	0,4%	15,1%	15,4%	6,2%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	2,9%	24,4%	75,6%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

Anteil geschädigter Bäume [%] nach Baumartengruppe und Stammschäden in Sachsen

alle Eigentumsarten /Anteil an der Stammzahl / Bäume > 7 cm Bhd. / alle Bestandesschic hten




Sachsen / Staatswald (Bund) / Anteil an der Stammzahl

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

				Düalea adam	er Specht- oder Pilz-	11	I/ "f		T maid	ahna	
	Schälschaden jünger 12 Mon.	Schälschaden älter 12 Mon.	Schälschäden (jung + alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	konsolen	Harz- lachten	Käfer- löcher	sonstige Schäden	mit Schäden	ohne Schäden
Eiche									30,5%	30,5%	69,5%
Buche				3,0%	1,8%				40,7%	43,2%	56,8%
ALH ^{*1}											100,0%
ALN ^{*2}				0,6%				2,0%	8,8%	11,4%	88,6%
alle Laubbäume				0,6%	0,1%			1,5%	12,3%	14,4%	85,6%
Fichte		69,5%	69,5%	6,6%					4,8%	76,4%	23,6%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer		20,2%	20,2%	3,3%	0,0%	0,1%	0,3%	0,1%	2,6%	25,9%	74,1%
Lärche				2,2%						2,2%	97,8%
alle Nadelbäume		23,0%	23,0%	3,5%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	2,7%	28,8%	71,2%
alle Baumarten		20,2%	20,2%	3,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	3,9%	27,0%	73,0%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

Anteil geschädigter Bäume [%] nach Baumartengruppe und Stammschäden im Staatswald (Bund) in Sachsen




Sachsen / Staatswald (Land) / Anteil an der Stammzahl

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	Schälschaden jünger 12 Mon.	Schälschaden älter 12 Mon.	Schälschäden (jung + alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilz- konsolen	Harz- lachten	Käfer- löcher	sonstige Schäden	mit Schäden	ohne Schäden
Eiche				2,5%	0,0%				5,5%	8,0%	92,0%
Buche		4,8%	4,8%	8,1%	0,5%	0,4%		0,0%	7,5%	20,4%	79,6%
ALH ^{*1}				8,6%				1,0%	10,3%	19,9%	80,1%
ALN ^{*2}		10,1%	10,1%	4,1%	0,3%	1,2%		0,1%	4,6%	20,1%	79,9%
alle Laubbäume		5,8%	5,8%	5,1%	0,2%	0,7%		0,2%	6,0%	17,7%	82,3%
Fichte	1,1%	42,5%	43,6%	10,8%	0,1%			0,1%	1,8%	53,9%	46,1%
Tanne		100,0%	100,0%							100,0%	
Douglasie				4,2%					5,7%	9,9%	90,1%
Kiefer		10,4%	10,4%	4,4%	0,0%		1,5%	0,2%	1,2%	17,2%	82,8%
Lärche				6,5%	0,2%				1,4%	7,8%	92,2%
alle Nadelbäume	0,7%	32,0%	32,8%	8,9%	0,1%		0,4%	0,1%	1,6%	42,0%	58,0%
alle Baumarten	0,6%	26,4%	26,9%	8,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	2,6%	36,8%	63,2%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

Anteil geschädigter Bäume [%] nach Baumartengruppe und Stammschäden im Staatswald (Land) in Sachsen




Sachsen / Körperschaftswald / Anteil an der Stammzahl

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	Schälschaden jünger 12 Mon.	Schälschaden älter 12 Mon.	Schälschäden (jung + alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilz- konsolen	Harz- lachten	Käfer- löcher	sonstige Schäden	mit Schäden	ohne Schäden
Eiche				3,5%	0,1%	0,3%			2,2%	5,8%	94,2%
Buche				6,0%					2,0%	8,0%	92,0%
ALH ^{*1}				6,8%					2,1%	8,9%	91,1%
ALN ^{*2}		1,3%	1,3%	7,0%					6,5%	14,8%	85,2%
alle Laubbäume		0,6%	0,6%	6,2%	0,0%	0,0%			4,0%	10,8%	89,2%
Fichte	1,7%	12,0%	13,6%	16,3%	0,1%				3,3%	32,7%	67,3%
Tanne											
Douglasie											100,0%
Kiefer		2,4%	2,4%	1,6%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	2,1%	6,2%	93,8%
Lärche				7,9%					2,6%	10,5%	89,5%
alle Nadelbäume	0,9%	7,4%	8,3%	9,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%	20,5%	79,5%
alle Baumarten	0,7%	5,7%	6,4%	8,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	18,1%	81,9%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

Anteil geschädigter Bäume [%] nach Baumartengruppe und Stammschäden im Körperschaftswald in Sachsen




Sachsen / Privatwald / Anteil an der Stammzahl

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	Schälschaden jünger 12 Mon.	Schälschaden älter 12 Mon.	Schälschäden (jung + alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilz- konsolen	Harz- lachten	Käfer- löcher	sonstige Schäden	mit Schäden	ohne Schäden
Eiche		0,6%	0,6%	3,3%		0,1%			5,3%	9,1%	90,9%
Buche				2,3%	0,2%	0,1%			14,4%	16,9%	83,1%
ALH ^{*1}				7,9%	0,1%	0,9%			4,3%	12,4%	87,6%
ALN ^{*2}	1,4%	7,6%	9,0%	4,3%	0,3%	0,3%			2,2%	14,6%	85,4%
alle Laubbäume	0,9%	4,8%	5,7%	4,4%	0,2%	0,3%			3,5%	13,1%	86,9%
Fichte	0,2%	18,6%	18,8%	11,9%	0,0%	0,0%		0,0%	3,9%	33,5%	66,5%
Tanne											
Douglasie											100,0%
Kiefer		7,4%	7,4%	2,2%	0,1%	0,0%	1,2%	0,3%	2,2%	13,2%	86,8%
Lärche		3,6%	3,6%	2,6%					1,5%	7,8%	92,2%
alle Nadelbäume	0,1%	11,3%	11,3%	5,7%	0,1%	0,0%	0,7%	0,2%	2,8%	20,3%	79,7%
alle Baumarten	0,3%	9,5%	9,8%	5,3%	0,1%	0,1%	0,5%	0,1%	3,0%	18,3%	81,7%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

Anteil geschädigter Bäume [%] nach Baumartengruppe und Stammschäden im Privatwald in Sachsen



Sachsen / Treuhandwald / Anteil an der Stammzahl

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	Schälschaden jünger 12 Mon.	Schälschaden älter 12 Mon.	Schälschäden (jung + alt)	Rücke- oder Fällschaden		Pilz- konsolen	Harz- lachten	Käfer- löcher	sonstige Schäden	mit Schäden	ohne Schäden
Eiche		1,4%	1,4%	0,8%	0,1%	0,1%			6,4%	8,7%	91,3%
Buche				22,3%		0,3%			3,3%	25,9%	74,1%
ALH ^{*1}		2,1%	2,1%	2,5%	0,1%	0,1%			1,4%	6,1%	93,9%
ALN ^{*2}		3,0%	3,0%	1,4%		1,0%			5,1%	10,2%	89,8%
alle Laubbäume		2,3%	2,3%	2,8%	0,0%	0,6%			4,5%	10,1%	89,9%
Fichte		18,1%	18,1%	9,7%					4,0%	31,0%	69,0%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer		6,5%	6,5%	2,0%		0,1%	0,4%	0,2%	1,9%	11,1%	88,9%
Lärche				13,0%					1,5%	14,5%	85,5%
alle Nadelbäume		9,6%	9,6%	4,4%		0,1%	0,3%	0,1%	2,5%	16,8%	83,2%
alle Baumarten		7,1%	7,1%	3,8%	0,0%	0,3%	0,2%	0,1%	3,2%	14,5%	85,5%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

Anteil geschädigter Bäume [%] nach Baumartengruppe und Stammschäden im Treuhandwald in Sachsen

