

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	61.092	490.883	337.319	889.295	85.876	975.171
Buchen-Typ	[ha]	394.907	556.570	603.339	1.554.815	246.477	1.801.292
Eschen-Typ	[ha]	4.994	127.839	58.186	191.019	10.459	201.478
Birken-Typ	[ha]	60.588	93.761	129.437	283.786	50.937	334.723
Erlen-Typ	[ha]	13.457	123.322	52.587	189.366	48.392	237.758
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	8.571	129.920	65.759	204.251	46.442	250.692
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	16.434	241.371	139.005	396.811	36.515	433.326
Fichten-Typ	[ha]	536.551	916.102	821.943	2.274.596	908.452	3.183.048
Tannen-Typ	[ha]	43.693	19.088	93.397	156.178	7.378	163.555
Douglasien-Typ	[ha]	41.821	55.220	84.528	181.569	37.133	218.702
Kiefern-Typ	[ha]	231.470	790.019	408.702	1.430.191	1.079.714	2.509.905
Lärchen-Typ	[ha]	36.215	49.558	102.911	188.684	21.574	210.258
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	17.466	79.679	229.386	326.531		326.531
alle führenden Baumarten	[ha]	1.467.260	3.673.332	3.126.499	8.267.091	2.579.348	10.846.440

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	320	2.861	1.754	4.935	515	5.450
Buchen-Typ	Sek	2.029	3.145	3.306	8.480	1.311	9.791
Eschen-Typ	Sek	28	816	327	1.171	63	1.234
Birken-Typ	Sek	312	498	608	1.418	278	1.696
Erlen-Typ	Sek	62	738	280	1.080	304	1.384
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	49	725	316	1.090	283	1.373
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	85	1.514	786	2.385	208	2.593
Fichten-Typ	Sek	2.625	4.578	4.006	11.209	4.594	15.803
Tannen-Typ	Sek	368	160	722	1.250	51	1.301
Douglasien-Typ	Sek	237	397	563	1.197	258	1.455
Kiefern-Typ	Sek	938	3.915	1.935	6.788	5.080	11.868
Lärchen-Typ	Sek	192	271	504	967	122	1.089
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	87	454	1.239	1.780		1.780
alle führenden Baumarten	Sek	7.332	20.072	16.346	43.750	13.067	56.817

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-7,3%	+/-2,7%	+/-3,2%	+/-2,1%	+/-5,8%	+/-2,1%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-3,3%	+/-2,7%	+/-2,4%	+/-1,8%	+/-4,3%	+/-1,7%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-22,3%	+/-4,6%	+/-7,0%	+/-3,9%	+/-15,1%	+/-3,8%
Birken-Typ	SE[%]	+/-7,0%	+/-5,7%	+/-5,0%	+/-3,5%	+/-8,7%	+/-3,4%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-15,0%	+/-5,1%	+/-7,4%	+/-4,2%	+/-8,2%	+/-3,9%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-17,3%	+/-4,9%	+/-7,1%	+/-4,0%	+/-8,2%	+/-3,7%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-12,9%	+/-3,4%	+/-4,5%	+/-2,8%	+/-8,9%	+/-2,7%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-2,9%	+/-2,0%	+/-2,2%	+/-1,4%	+/-2,3%	+/-1,3%
Tannen-Typ	SE[%]	+/-6,9%	+/-9,8%	+/-5,1%	+/-4,1%	+/-19,3%	+/-4,0%
Douglasien-Typ	SE[%]	+/-8,4%	+/-6,4%	+/-5,3%	+/-3,9%	+/-8,3%	+/-3,7%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-4,6%	+/-2,4%	+/-3,1%	+/-1,9%	+/-2,5%	+/-1,6%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-9,1%	+/-7,7%	+/-5,7%	+/-4,3%	+/-11,9%	+/-4,1%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-13,2%	+/-5,9%	+/-3,5%	+/-3,0%		+/-3,0%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-1,7%	+/-1,0%	+/-1,2%	+/-0,8%	+/-1,4%	+/-0,7%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	6,3%	50,3%	34,6%	91,2%	8,8%	100,0%
Buchen-Typ	%	21,9%	30,9%	33,5%	86,3%	13,7%	100,0%
Eschen-Typ	%	2,5%	63,5%	28,9%	94,8%	5,2%	100,0%
Birken-Typ	%	18,1%	28,0%	38,7%	84,8%	15,2%	100,0%
Erlen-Typ	%	5,7%	51,9%	22,1%	79,6%	20,4%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	3,4%	51,8%	26,2%	81,5%	18,5%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	3,8%	55,7%	32,1%	91,6%	8,4%	100,0%
Fichten-Typ	%	16,9%	28,8%	25,8%	71,5%	28,5%	100,0%
Tannen-Typ	%	26,7%	11,7%	57,1%	95,5%	4,5%	100,0%
Douglasien-Typ	%	19,1%	25,2%	38,7%	83,0%	17,0%	100,0%
Kiefern-Typ	%	9,2%	31,5%	16,3%	57,0%	43,0%	100,0%
Lärchen-Typ	%	17,2%	23,6%	48,9%	89,7%	10,3%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	5,3%	24,4%	70,2%	100,0%		100,0%
alle führenden Baumarten	%	13,5%	33,9%	28,8%	76,2%	23,8%	100,0%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	3.987	18.139	14.152	36.278	3.588	39.866
Buchen-Typ	[ha]	4.385	3.588	6.977	14.950	3.189	18.139
Eschen-Typ	[ha]		2.990	598	3.588		3.588
Birken-Typ	[ha]	6.578	8.173	13.355	28.105	1.794	29.899
Erlen-Typ	[ha]		4.784	2.193	6.977	797	7.774
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	399	4.784	2.990	8.173	2.791	10.963
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	199	9.767	5.382	15.348	797	16.146
Fichten-Typ	[ha]	30.697	48.636	35.879	115.212	81.326	196.539
Tannen-Typ	[ha]	199			199	399	598
Douglasien-Typ	[ha]	399	199	399	997		997
Kiefern-Typ	[ha]	6.977	52.822	16.345	76.144	74.350	150.494
Lärchen-Typ	[ha]	2.392	2.591	6.179	11.162	1.196	12.358
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	399	1.993	9.767	12.159		12.159
alle führenden Baumarten	[ha]	56.610	158.467	114.216	329.292	170.227	499.519

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	20	91	71	182	18	200
Buchen-Typ	Sek	22	18	35	75	16	91
Eschen-Typ	Sek		15	3	18		18
Birken-Typ	Sek	33	41	67	141	9	150
Erlen-Typ	Sek		24	11	35	4	39
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	2	24	15	41	14	55
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	49	27	77	4	81
Fichten-Typ	Sek	154	244	180	578	408	986
Tannen-Typ	Sek	1			1	2	3
Douglasien-Typ	Sek	2	1	2	5		5
Kiefern-Typ	Sek	35	265	82	382	373	755
Lärchen-Typ	Sek	12	13	31	56	6	62
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	2	10	49	61		61
alle führenden Baumarten	Sek	284	795	573	1.652	854	2.506

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-22,3%	+/-11,8%	+/-13,1%	+/-8,4%	+/-27,1%	+/-8,2%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-23,1%	+/-23,5%	+/-20,7%	+/-13,9%	+/-30,6%	+/-12,9%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-25,7%	+/-74,5%	+/-24,8%		+/-24,8%
Birken-Typ	SE[%]	+/-18,8%	+/-16,6%	+/-12,6%	+/-9,4%	+/-33,3%	+/-9,4%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-21,1%	+/-30,1%	+/-17,3%	+/-50,0%	+/-16,3%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-70,7%	+/-25,6%	+/-27,4%	+/-18,6%	+/-26,7%	+/-15,8%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-17,1%	+/-19,8%	+/-13,7%	+/-50,0%	+/-13,4%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-9,9%	+/-7,8%	+/-8,8%	+/-5,7%	+/-7,4%	+/-5,1%
Tannen-Typ	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-74,5%
Douglasien-Typ	SE[%]	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-44,7%		+/-44,7%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-19,1%	+/-8,1%	+/-11,9%	+/-6,9%	+/-8,4%	+/-5,9%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-28,8%	+/-31,7%	+/-19,5%	+/-15,2%	+/-40,8%	+/-14,5%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-70,7%	+/-31,6%	+/-15,0%	+/-13,3%		+/-13,3%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-7,4%	+/-4,3%	+/-5,3%	+/-3,4%	+/-5,0%	+/-3,0%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	10,0%	45,5%	35,5%	91,0%	9,0%	100,0%
Buchen-Typ	%	24,2%	19,8%	38,5%	82,4%	17,6%	100,0%
Eschen-Typ	%		83,3%	16,7%	100,0%		100,0%
Birken-Typ	%	22,0%	27,3%	44,7%	94,0%	6,0%	100,0%
Erlen-Typ	%		61,5%	28,2%	89,7%	10,3%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	3,6%	43,6%	27,3%	74,5%	25,5%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	1,2%	60,5%	33,3%	95,1%	4,9%	100,0%
Fichten-Typ	%	15,6%	24,7%	18,3%	58,6%	41,4%	100,0%
Tannen-Typ	%	33,3%			33,3%	66,7%	100,0%
Douglasien-Typ	%	40,0%	20,0%	40,0%	100,0%		100,0%
Kiefern-Typ	%	4,6%	35,1%	10,9%	50,6%	49,4%	100,0%
Lärchen-Typ	%	19,4%	21,0%	50,0%	90,3%	9,7%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	3,3%	16,4%	80,3%	100,0%		100,0%
alle führenden Baumarten	%	11,3%	31,7%	22,9%	65,9%	34,1%	100,0%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]		199		199		199
Buchen-Typ	[ha]	199			199	199	399
Eschen-Typ	[ha]		199		199		199
Birken-Typ	[ha]	1.595		797	2.392	797	3.189
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	199	797		997		997
Fichten-Typ	[ha]	598	997	199	1.794	997	2.791
Kiefern-Typ	[ha]	797	5.183	997	6.977	14.750	21.727
Lärchen-Typ	[ha]					199	199
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		199	199	399		399
alle führenden Baumarten	[ha]	3.389	7.575	2.193	13.156	16.943	30.099

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek		1		1		1
Buchen-Typ	Sek	1			1	1	2
Eschen-Typ	Sek		1		1		1
Birken-Typ	Sek	8		4	12	4	16
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	1	4		5		5
Fichten-Typ	Sek	3	5	1	9	5	14
Kiefern-Typ	Sek	4	26	5	35	74	109
Lärchen-Typ	Sek					1	1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		1	1	2		2
alle führenden Baumarten	Sek	17	38	11	66	85	151

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%		+/-100,0%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%		+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]	+/-43,3%		+/-50,0%	+/-37,2%	+/-50,0%	+/-36,4%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%		+/-82,5%		+/-82,5%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-57,7%	+/-52,9%	+/-100,0%	+/-45,8%	+/-66,3%	+/-45,1%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-61,2%	+/-28,2%	+/-44,7%	+/-25,0%	+/-20,0%	+/-17,7%
Lärchen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%		+/-70,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-28,1%	+/-24,3%	+/-32,7%	+/-19,9%	+/-18,1%	+/-15,4%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%		100,0%		100,0%		100,0%
Buchen-Typ	%	50,0%			50,0%	50,0%	100,0%
Eschen-Typ	%		100,0%		100,0%		100,0%
Birken-Typ	%	50,0%		25,0%	75,0%	25,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	20,0%	80,0%		100,0%		100,0%
Fichten-Typ	%	21,4%	35,7%	7,1%	64,3%	35,7%	100,0%
Kiefern-Typ	%	3,7%	23,9%	4,6%	32,1%	67,9%	100,0%
Lärchen-Typ	%					100,0%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		50,0%	50,0%	100,0%		100,0%
alle führenden Baumarten	%	11,3%	25,2%	7,3%	43,7%	56,3%	100,0%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	997	3.987	4.585	9.568	797	10.365
Buchen-Typ	[ha]	3.588	1.196	3.588	8.372	1.595	9.966
Eschen-Typ	[ha]	0	199	0	199	0	199
Birken-Typ	[ha]	1.196	1.196	3.987	6.379	0	6.379
Erlen-Typ	[ha]	0	797	399	1.196	199	1.395
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	199	797	997	1.993	598	2.591
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	0	1.595	1.395	2.990	0	2.990
Fichten-Typ	[ha]	18.139	23.122	18.538	59.799	50.630	110.428
Tannen-Typ	[ha]	199	0	0	199	199	399
Douglasien-Typ	[ha]	0	199	199	399	0	399
Kiefern-Typ	[ha]	2.591	12.757	6.777	22.126	10.764	32.889
Lärchen-Typ	[ha]	1.993	997	2.990	5.980	598	6.578
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	399	199	3.588	4.186	0	4.186
alle führenden Baumarten	[ha]	29.301	47.042	47.042	123.385	65.380	188.765

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	5	20	23	48	4	52
Buchen-Typ	Sek	18	6	18	42	8	50
Eschen-Typ	Sek		1		1		1
Birken-Typ	Sek	6	6	20	32		32
Erlen-Typ	Sek		4	2	6	1	7
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	1	4	5	10	3	13
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		8	7	15		15
Fichten-Typ	Sek	91	116	93	300	254	554
Tannen-Typ	Sek	1			1	1	2
Douglasien-Typ	Sek		1	1	2		2
Kiefern-Typ	Sek	13	64	34	111	54	165
Lärchen-Typ	Sek	10	5	15	30	3	33
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	2	1	18	21		21
alle führenden Baumarten	Sek	147	236	236	619	328	947

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-44,7%	+/-25,4%	+/-24,1%	+/-16,8%	+/-61,2%	+/-16,6%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-26,0%	+/-40,8%	+/-28,3%	+/-18,6%	+/-46,7%	+/-17,8%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%		+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]	+/-40,8%	+/-40,8%	+/-23,4%	+/-19,2%		+/-19,2%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-50,0%	+/-70,7%	+/-40,8%	+/-100,0%	+/-37,7%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-50,0%	+/-44,7%	+/-34,6%	+/-57,7%	+/-31,7%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-39,5%	+/-37,8%	+/-29,0%		+/-29,0%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-13,3%	+/-11,6%	+/-12,5%	+/-8,2%	+/-9,8%	+/-7,2%
Tannen-Typ	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%		+/-70,7%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-27,7%	+/-17,8%	+/-19,4%	+/-13,5%	+/-20,7%	+/-12,4%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-31,6%	+/-44,7%	+/-30,5%	+/-21,5%	+/-57,7%	+/-20,7%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-24,8%	+/-22,7%		+/-22,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-10,7%	+/-8,6%	+/-8,9%	+/-6,4%	+/-8,5%	+/-5,7%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	9,6%	38,5%	44,2%	92,3%	7,7%	100,0%
Buchen-Typ	%	36,0%	12,0%	36,0%	84,0%	16,0%	100,0%
Eschen-Typ	%		100,0%		100,0%		100,0%
Birken-Typ	%	18,8%	18,8%	62,5%	100,0%		100,0%
Erlen-Typ	%		57,1%	28,6%	85,7%	14,3%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	7,7%	30,8%	38,5%	76,9%	23,1%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		53,3%	46,7%	100,0%		100,0%
Fichten-Typ	%	16,4%	20,9%	16,8%	54,2%	45,8%	100,0%
Tannen-Typ	%	50,0%			50,0%	50,0%	100,0%
Douglasien-Typ	%		50,0%	50,0%	100,0%		100,0%
Kiefern-Typ	%	7,9%	38,8%	20,6%	67,3%	32,7%	100,0%
Lärchen-Typ	%	30,3%	15,2%	45,5%	90,9%	9,1%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	9,5%	4,8%	85,7%	100,0%		100,0%
alle führenden Baumarten	%	15,5%	24,9%	24,9%	65,4%	34,6%	100,0%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	199	2.591	1.595	4.385	598	4.983
Buchen-Typ	[ha]	199	399	997	1.595	199	1.794
Eschen-Typ	[ha]		598	199	797		797
Birken-Typ	[ha]	199	997	1.196	2.392	399	2.791
Erlen-Typ	[ha]		598		598	199	797
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		598	598	1.196	399	1.595
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		1.395	1.196	2.591	199	2.791
Fichten-Typ	[ha]	2.591	5.781	6.379	14.750	9.568	24.318
Tannen-Typ	[ha]					199	199
Douglasien-Typ	[ha]	199			199		199
Kiefern-Typ	[ha]	199	3.787	1.395	5.382	4.585	9.966
Lärchen-Typ	[ha]			797	797		797
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		797	598	1.395		1.395
alle führenden Baumarten	[ha]	3.588	17.541	14.950	36.079	16.345	52.424

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	1	13	8	22	3	25
Buchen-Typ	Sek	1	2	5	8	1	9
Eschen-Typ	Sek		3	1	4		4
Birken-Typ	Sek	1	5	6	12	2	14
Erlen-Typ	Sek		3		3	1	4
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		3	3	6	2	8
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		7	6	13	1	14
Fichten-Typ	Sek	13	29	32	74	48	122
Tannen-Typ	Sek					1	1
Douglasien-Typ	Sek	1			1		1
Kiefern-Typ	Sek	1	19	7	27	23	50
Lärchen-Typ	Sek			4	4		4
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		4	3	7		7
alle führenden Baumarten	Sek	18	88	75	181	82	263

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-27,7%	+/-39,5%	+/-23,1%	+/-74,5%	+/-23,6%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-44,7%	+/-35,3%	+/-100,0%	+/-33,3%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-57,7%	+/-100,0%	+/-50,0%		+/-50,0%
Birken-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-52,9%	+/-40,8%	+/-31,1%	+/-70,7%	+/-30,2%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-57,7%		+/-57,7%	+/-100,0%	+/-50,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-57,7%	+/-74,5%	+/-47,1%	+/-70,7%	+/-39,5%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-55,3%	+/-40,8%	+/-35,2%	+/-100,0%	+/-34,9%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-31,7%	+/-20,3%	+/-23,7%	+/-16,1%	+/-21,8%	+/-14,8%
Tannen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%
Douglasien-Typ	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%		+/-100,0%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-25,2%	+/-37,7%	+/-21,8%	+/-32,2%	+/-21,3%
Lärchen-Typ	SE[%]			+/-50,0%	+/-50,0%		+/-50,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-50,0%	+/-57,7%	+/-37,7%		+/-37,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-27,1%	+/-12,2%	+/-16,1%	+/-11,0%	+/-16,1%	+/-10,1%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	4,0%	52,0%	32,0%	88,0%	12,0%	100,0%
Buchen-Typ	%	11,1%	22,2%	55,6%	88,9%	11,1%	100,0%
Eschen-Typ	%		75,0%	25,0%	100,0%		100,0%
Birken-Typ	%	7,1%	35,7%	42,9%	85,7%	14,3%	100,0%
Erlen-Typ	%		75,0%		75,0%	25,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		37,5%	37,5%	75,0%	25,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		50,0%	42,9%	92,9%	7,1%	100,0%
Fichten-Typ	%	10,7%	23,8%	26,2%	60,7%	39,3%	100,0%
Tannen-Typ	%					100,0%	100,0%
Douglasien-Typ	%	100,0%			100,0%		100,0%
Kiefern-Typ	%	2,0%	38,0%	14,0%	54,0%	46,0%	100,0%
Lärchen-Typ	%			100,0%	100,0%		100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		57,1%	42,9%	100,0%		100,0%
alle führenden Baumarten	%	6,8%	33,5%	28,5%	68,8%	31,2%	100,0%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	2.791	11.362	7.973	22.126	2.193	24.318
Buchen-Typ	[ha]	399	1.993	2.392	4.784	1.196	5.980
Eschen-Typ	[ha]		1.993	399	2.392		2.392
Birken-Typ	[ha]	3.588	5.980	7.375	16.943	598	17.541
Erlen-Typ	[ha]		3.389	1.794	5.183	399	5.581
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		2.591	1.395	3.987	1.794	5.781
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	199	6.777	2.791	9.767	598	10.365
Fichten-Typ	[ha]	9.368	18.737	10.764	38.869	20.132	59.001
Douglasien-Typ	[ha]	199		199	399		399
Kiefern-Typ	[ha]	3.389	31.095	7.176	41.660	44.251	85.911
Lärchen-Typ	[ha]	399	1.595	2.392	4.385	399	4.784
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		797	5.382	6.179		6.179
alle führenden Baumarten	[ha]	20.332	86.310	50.032	156.673	71.559	228.232

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	14	57	40	111	11	122
Buchen-Typ	Sek	2	10	12	24	6	30
Eschen-Typ	Sek		10	2	12		12
Birken-Typ	Sek	18	30	37	85	3	88
Erlen-Typ	Sek		17	9	26	2	28
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		13	7	20	9	29
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	34	14	49	3	52
Fichten-Typ	Sek	47	94	54	195	101	296
Douglasien-Typ	Sek	1		1	2		2
Kiefern-Typ	Sek	17	156	36	209	222	431
Lärchen-Typ	Sek	2	8	12	22	2	24
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		4	27	31		31
alle führenden Baumarten	Sek	102	433	251	786	359	1.145

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-26,7%	+/-15,3%	+/-17,2%	+/-11,0%	+/-32,7%	+/-10,6%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-70,7%	+/-31,6%	+/-37,2%	+/-25,6%	+/-47,1%	+/-23,0%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-31,6%	+/-100,0%	+/-31,1%		+/-31,1%
Birken-Typ	SE[%]	+/-24,8%	+/-19,3%	+/-17,2%	+/-12,2%	+/-57,7%	+/-12,1%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-25,6%	+/-33,3%	+/-20,2%	+/-70,7%	+/-19,5%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-29,7%	+/-37,7%	+/-23,4%	+/-33,3%	+/-19,7%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-19,0%	+/-28,5%	+/-16,6%	+/-57,7%	+/-16,0%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-17,0%	+/-12,9%	+/-14,9%	+/-9,6%	+/-13,0%	+/-8,6%
Douglasien-Typ	SE[%]	+/-100,0%		+/-100,0%	+/-70,7%		+/-70,7%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-28,1%	+/-10,0%	+/-17,9%	+/-9,3%	+/-10,8%	+/-7,8%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-70,7%	+/-43,3%	+/-28,8%	+/-24,0%	+/-70,7%	+/-22,7%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-50,0%	+/-19,8%	+/-18,4%		+/-18,4%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-11,8%	+/-5,9%	+/-7,8%	+/-5,0%	+/-7,8%	+/-4,5%

1.04.11 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	11,5%	46,7%	32,8%	91,0%	9,0%	100,0%
Buchen-Typ	%	6,7%	33,3%	40,0%	80,0%	20,0%	100,0%
Eschen-Typ	%		83,3%	16,7%	100,0%		100,0%
Birken-Typ	%	20,5%	34,1%	42,0%	96,6%	3,4%	100,0%
Erlen-Typ	%		60,7%	32,1%	92,9%	7,1%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		44,8%	24,1%	69,0%	31,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	1,9%	65,4%	26,9%	94,2%	5,8%	100,0%
Fichten-Typ	%	15,9%	31,8%	18,2%	65,9%	34,1%	100,0%
Douglasien-Typ	%	50,0%		50,0%	100,0%		100,0%
Kiefern-Typ	%	3,9%	36,2%	8,4%	48,5%	51,5%	100,0%
Lärchen-Typ	%	8,3%	33,3%	50,0%	91,7%	8,3%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		12,9%	87,1%	100,0%		100,0%
alle führenden Baumarten	%	8,9%	37,8%	21,9%	68,6%	31,4%	100,0%