1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	[ha]	60.629	737	50.703	1.217	1.375	114.661
Buchen-Typ	[ha]	632.095	3.421	95.029	3.231	6.962	740.738
Eschen-Typ	[ha]	115.241	247	4.423	249	90	120.249
Birken-Typ	[ha]	82.467		4.626	2.294	1.631	91.018
Erlen-Typ	[ha]	11.205	109	5.112	3.417	587	20.430
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	317.719	360	12.106	9.630	2.118	341.932
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	314.756	1.036	26.343	4.803	1.970	348.908
Fichten-Typ	[ha]	442.069	2.106	67.476	169	3.105	514.926
Tannen-Typ	[ha]	43.384	130	11.399	20	160	55.093
Douglasien-Typ	[ha]	7.433		25.598		2.275	35.306
Kiefern-Typ	[ha]	72.092	418	13.820	40	2.386	88.756
Lärchen-Typ	[ha]	4.693		2.575		209	7.477
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	145.005	968	24.867	905	4.632	176.377
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	[ha]	2.248.789	9.532	344.076	25.976	27.499	2.655.871

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	Sek	1.130	11	403	30	16	1.590
Buchen-Typ	Sek	8.612	41	860	113	78	9.704
Eschen-Typ	Sek	1.556	5	43	8	3	1.615
Birken-Typ	Sek	1.073		30	22	14	1.139
Erlen-Typ	Sek	219	4	45	70	17	355
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	4.391	11	112	123	33	4.670
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	4.459	17	267	125	32	4.900
Fichten-Typ	Sek	5.973	23	567	3	32	6.598
Tannen-Typ	Sek	807	2	113	1	5	928
Douglasien-Typ	Sek	196		240		15	451
Kiefern-Typ	Sek	950	5	116	1	10	1.082
Lärchen-Typ	Sek	74		20		2	96
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	2.300	16	209	19	35	2.579
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	Sek	31.740	135	3.025	515	292	35.707

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	SE[%]	+/-5,8%	+/-46,2%	+/-7,6%	+/-27,3%	+/-35,5%	+/-4,6%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-2,3%	+/-22,5%	+/-5,2%	+/-16,1%	+/-16,1%	+/-2,1%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-4,2%	+/-50,0%	+/-18,5%	+/-41,4%	+/-59,8%	+/-4,1%
Birken-Typ	SE[%]	+/-5,4%		+/-22,0%	+/-39,0%	+/-37,9%	+/-5,2%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-10,3%	+/-67,4%	+/-19,5%	+/-22,1%	+/-32,1%	+/-8,4%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-2,9%	+/-41,0%	+/-13,9%	+/-15,1%	+/-26,9%	+/-2,8%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-2,6%	+/-30,4%	+/-9,6%	+/-15,2%	+/-30,1%	+/-2,5%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-2,4%	+/-30,9%	+/-6,2%	+/-68,8%	+/-24,3%	+/-2,3%
Tannen-Typ	SE[%]	+/-6,0%	+/-80,3%	+/-13,7%	+/-100,0%	+/-56,5%	+/-5,6%
Douglasien-Typ	SE[%]	+/-11,4%		+/-9,5%		+/-32,1%	+/-7,8%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-6,0%	+/-46,6%	+/-14,2%	+/-100,0%	+/-34,8%	+/-5,5%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-17,9%		+/-30,7%		+/-71,4%	+/-15,5%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-3,3%	+/-33,8%	+/-9,4%	+/-35,4%	+/-23,7%	+/-3,1%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	SE[%]	+/-1,1%	+/-12,5%	+/-2,9%	+/-8,4%	+/-9,6%	+/-1,0%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	%	52,9%	0,6%	44,2%	1,1%	1,2%	100,0%
Buchen-Typ	%	85,3%	0,5%	12,8%	0,4%	0,9%	100,0%
Eschen-Typ	%	95,8%	0,2%	3,7%	0,2%	0,1%	100,0%
Birken-Typ	%	90,6%		5,1%	2,5%	1,8%	100,0%
Erlen-Typ	%	54,8%	0,5%	25,0%	16,7%	2,9%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	92,9%	0,1%	3,5%	2,8%	0,6%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	90,2%	0,3%	7,6%	1,4%	0,6%	100,0%
Fichten-Typ	%	85,9%	0,4%	13,1%	0,0%	0,6%	100,0%
Tannen-Typ	%	78,7%	0,2%	20,7%	0,0%	0,3%	100,0%
Douglasien-Typ	%	21,1%		72,5%		6,4%	100,0%
Kiefern-Typ	%	81,2%	0,5%	15,6%	0,0%	2,7%	100,0%
Lärchen-Typ	%	62,8%		34,4%		2,8%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	82,2%	0,5%	14,1%	0,5%	2,6%	100,0%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	%	84,7%	0,4%	13,0%	1,0%	1,0%	100,0%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	[ha]	2.452	0	3.727	60		6.239
Buchen-Typ	[ha]	10.026	179	9.249	0		19.455
Eschen-Typ	[ha]	957	0	199	60		1.216
Birken-Typ	[ha]	4.983	0	638	120		5.741
Erlen-Typ	[ha]	399	0	219	159		777
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	23.979	0	259	100		24.338
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	8.232	0	2.372	439		11.043
Fichten-Typ	[ha]	31.574	0	3.090	60		34.723
Tannen-Typ	[ha]	0	0	1.415	0		1.415
Douglasien-Typ	[ha]	0	0	797	0		797
Kiefern-Typ	[ha]	5.322	0	1.236	40		6.598
Lärchen-Typ	[ha]	120	0	439	0		558
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	6.418	0	1.595	20		8.033
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	[ha]	94.462	179	25.235	1.056		120.933

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	Sek	50		26	2		78
Buchen-Typ	Sek	123	2	71			196
Eschen-Typ	Sek	15		1	1		17
Birken-Typ	Sek	67		4	2		73
Erlen-Typ	Sek	6		3	3		12
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	323		2	3		328
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	105		18	4		127
Fichten-Typ	Sek	366		23	1		390
Tannen-Typ	Sek			11			11
Douglasien-Typ	Sek			6			6
Kiefern-Typ	Sek	100		7	1		108
Lärchen-Typ	Sek	1		3			4
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	81		12	1		94
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	Sek	1.237	2	187	18		1.444

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	SE[%]	+/-20,8%		+/-24,4%	+/-74,5%		+/-16,9%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-15,8%	+/-74,5%	+/-15,4%			+/-11,2%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-33,3%		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-31,3%
Birken-Typ	SE[%]	+/-19,5%		+/-52,3%	+/-74,5%		+/-18,1%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-56,5%		+/-82,8%	+/-58,6%		+/-39,1%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-8,1%		+/-70,9%	+/-66,3%		+/-8,1%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-13,6%		+/-37,3%	+/-75,2%		+/-13,3%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-9,0%		+/-24,6%	+/-100,0%		+/-8,6%
Tannen-Typ	SE[%]			+/-35,3%			+/-35,3%
Douglasien-Typ	SE[%]			+/-43,3%			+/-43,3%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-16,5%		+/-45,3%	+/-100,0%		+/-16,5%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-100,0%		+/-62,6%			+/-53,7%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-14,2%		+/-31,1%	+/-100,0%		+/-12,8%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	SE[%]	+/-4,8%	+/-74,5%	+/-9,8%	+/-38,4%		+/-4,5%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	%	39,3%		59,7%	1,0%		100,0%
Buchen-Typ	%	51,5%	0,9%	47,5%			100,0%
Eschen-Typ	%	78,7%		16,4%	4,9%		100,0%
Birken-Typ	%	86,8%		11,1%	2,1%		100,0%
Erlen-Typ	%	51,3%		28,2%	20,5%		100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	98,5%		1,1%	0,4%		100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	74,5%		21,5%	4,0%		100,0%
Fichten-Typ	%	90,9%		8,9%	0,2%		100,0%
Tannen-Typ	%			100,0%			100,0%
Douglasien-Typ	%			100,0%			100,0%
Kiefern-Typ	%	80,7%		18,7%	0,6%		100,0%
Lärchen-Typ	%	21,4%		78,6%			100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	79,9%		19,9%	0,2%		100,0%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	%	78,1%	0,1%	20,9%	0,9%		100,0%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1J_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	[ha]			100			100
Buchen-Typ	[ha]	259		259			518
Eschen-Typ	[ha]	140					140
Birken-Typ	[ha]	219			80		299
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	498					498
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	40					40
Fichten-Typ	[ha]	757					757
Kiefern-Typ	[ha]	1.236		60			1.296
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	239					239
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	[ha]	3.389		419	80		3.887

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	Sek			1			1
Buchen-Typ	Sek	5		2			7
Eschen-Typ	Sek	1					1
Birken-Typ	Sek	2			1		3
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	7					7
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1					1
Fichten-Typ	Sek	7					7
Kiefern-Typ	Sek	29		1			30
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	4					4
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	Sek	56		4	1		61

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	SE[%]			+/-100,0%			+/-100,0%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-60,1%		+/-80,3%			+/-50,1%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-100,0%					+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]	+/-91,4%			+/-100,0%		+/-72,1%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-71,2%					+/-71,2%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%					+/-100,0%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-57,5%					+/-57,5%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-29,8%		+/-100,0%			+/-29,1%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-67,7%					+/-67,7%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	SE[%]	+/-22,7%		+/-56,9%	+/-100,0%		+/-22,3%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JL_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	%			100,0%			100,0%
Buchen-Typ	%	50,0%		50,0%			100,0%
Eschen-Typ	%	100,0%					100,0%
Birken-Typ	%	73,3%			26,7%		100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	100,0%					100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	100,0%					100,0%
Fichten-Typ	%	100,0%					100,0%
Kiefern-Typ	%	95,4%		4,6%			100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	100,0%					100,0%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	%	87,2%		10,8%	2,1%		100,0%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	[ha]	399	0	1.794	20		2.213
Buchen-Typ	[ha]	5.880	60	5.302	0		11.242
Eschen-Typ	[ha]	179	0	0	0		179
Birken-Typ	[ha]	2.073	0	0	0		2.073
Erlen-Typ	[ha]	120	0	179	60		359
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	8.452	0	120	20		8.591
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	2.651	0	478	0		3.129
Fichten-Typ	[ha]	20.312	0	1.674	0		21.986
Tannen-Typ	[ha]	0	0	1.156	0		1.156
Douglasien-Typ	[ha]	0	0	478	0		478
Kiefern-Typ	[ha]	877	0	199	40		1.116
Lärchen-Typ	[ha]	0	0	60	0		60
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	2.252	0	339	0		2.591
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	[ha]	43.195	60	11.780	140		55.174

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	Sek	8		12	1		21
Buchen-Typ	Sek	71	1	39			111
Eschen-Typ	Sek	3					3
Birken-Typ	Sek	32					32
Erlen-Typ	Sek	3		1	1		5
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	104		1	1		106
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	33		4			37
Fichten-Typ	Sek	229		13			242
Tannen-Typ	Sek			9			9
Douglasien-Typ	Sek			4			4
Kiefern-Typ	Sek	13		1	1		15
Lärchen-Typ	Sek			1			1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	35		2			37
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	Sek	531	1	87	4		623

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	SE[%]	+/-57,0%		+/-36,8%	+/-100,0%		+/-31,5%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-22,5%	+/-100,0%	+/-18,7%			+/-15,4%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-79,3%					+/-79,3%
Birken-Typ	SE[%]	+/-31,1%					+/-31,1%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-70,7%		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-57,7%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-14,7%		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-14,5%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-22,5%		+/-52,7%			+/-20,7%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-11,2%		+/-31,3%			+/-10,8%
Tannen-Typ	SE[%]			+/-37,8%			+/-37,8%
Douglasien-Typ	SE[%]			+/-54,3%			+/-54,3%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-48,5%		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-42,2%
Lärchen-Typ	SE[%]			+/-100,0%			+/-100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-21,9%		+/-71,8%			+/-21,2%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	SE[%]	+/-7,9%	+/-100,0%	+/-13,2%	+/-55,3%		+/-7,2%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	%	18,0%		81,1%	0,9%		100,0%
Buchen-Typ	%	52,3%	0,5%	47,2%			100,0%
Eschen-Typ	%	100,0%					100,0%
Birken-Typ	%	100,0%					100,0%
Erlen-Typ	%	33,3%		50,0%	16,7%		100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	98,4%		1,4%	0,2%		100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	84,7%		15,3%			100,0%
Fichten-Typ	%	92,4%		7,6%			100,0%
Tannen-Typ	%			100,0%			100,0%
Douglasien-Typ	%			100,0%			100,0%
Kiefern-Typ	%	78,6%		17,9%	3,6%		100,0%
Lärchen-Typ	%			100,0%			100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	86,9%		13,1%			100,0%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	%	78,3%	0,1%	21,4%	0,3%		100,0%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	[ha]	259		757			1.017
Buchen-Typ	[ha]	1.475	120	797			2.392
Eschen-Typ	[ha]	239		199			439
Birken-Typ	[ha]	359					359
Erlen-Typ	[ha]	60					60
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	3.229		140	60		3.428
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	1.017		120	140		1.276
Fichten-Typ	[ha]	4.485		399			4.884
Tannen-Typ	[ha]			100			100
Douglasien-Typ	[ha]			179			179
Kiefern-Typ	[ha]	219					219
Lärchen-Typ	[ha]	120					120
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	658		339	20		1.017
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	[ha]	12.119	120	3.030	219		15.488

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	Sek	6		5			11
Buchen-Typ	Sek	16	1	5			22
Eschen-Typ	Sek	3		1			4
Birken-Typ	Sek	5					5
Erlen-Typ	Sek	1					1
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	40		1	1		42
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	12		1	2		15
Fichten-Typ	Sek	44		3			47
Tannen-Typ	Sek			1			1
Douglasien-Typ	Sek			1			1
Kiefern-Typ	Sek	6					6
Lärchen-Typ	Sek	1					1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	8		3	1		12
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	Sek	142	1	21	4		168

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	SE[%]	+/-64,8%		+/-61,1%			+/-48,4%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-37,3%	+/-100,0%	+/-48,8%			+/-28,6%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-71,7%		+/-100,0%			+/-59,9%
Birken-Typ	SE[%]	+/-59,8%					+/-59,8%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-100,0%					+/-100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-20,5%		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-20,5%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-35,2%		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-31,5%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-28,0%		+/-64,4%			+/-26,3%
Tannen-Typ	SE[%]			+/-100,0%			+/-100,0%
Douglasien-Typ	SE[%]			+/-100,0%			+/-100,0%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-48,9%					+/-48,9%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-100,0%					+/-100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-43,6%		+/-64,7%	+/-100,0%		+/-35,5%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	SE[%]	+/-14,7%	+/-100,0%	+/-30,9%	+/-69,8%		+/-14,3%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	%	25,5%		74,5%			100,0%
Buchen-Typ	%	61,7%	5,0%	33,3%			100,0%
Eschen-Typ	%	54,5%		45,5%			100,0%
Birken-Typ	%	100,0%					100,0%
Erlen-Typ	%	100,0%					100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	94,2%		4,1%	1,7%		100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	79,7%		9,4%	10,9%		100,0%
Fichten-Typ	%	91,8%		8,2%			100,0%
Tannen-Typ	%			100,0%			100,0%
Douglasien-Typ	%			100,0%			100,0%
Kiefern-Typ	%	100,0%					100,0%
Lärchen-Typ	%	100,0%					100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	64,7%		33,3%	2,0%		100,0%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	%	78,2%	0,8%	19,6%	1,4%		100,0%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1J_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	[ha]	1.794		1.076	40		2.910
Buchen-Typ	[ha]	2.412		2.890			5.302
Eschen-Typ	[ha]	399			60		458
Birken-Typ	[ha]	2.332		638	40		3.010
Erlen-Typ	[ha]	219		40	100		359
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	11.800			20		11.820
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	4.525		1.774	299		6.598
Fichten-Typ	[ha]	6.020		1.017	60		7.096
Tannen-Typ	[ha]			159			159
Douglasien-Typ	[ha]			140			140
Kiefern-Typ	[ha]	2.990		977			3.967
Lärchen-Typ	[ha]			379			379
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	3.269		917			4.186
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	[ha]	35.760		10.006	618		46.384

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1J_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	Sek	36		8	1		45
Buchen-Typ	Sek	31		25			56
Eschen-Typ	Sek	8			1		9
Birken-Typ	Sek	28		4	1		33
Erlen-Typ	Sek	2		2	2		6
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	172			1		173
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	59		13	2		74
Fichten-Typ	Sek	86		7	1		94
Tannen-Typ	Sek			1			1
Douglasien-Typ	Sek			1			1
Kiefern-Typ	Sek	52		5			57
Lärchen-Typ	Sek			2			2
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	34		7			41
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	Sek	508		75	9		592

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	SE[%]	+/-23,7%		+/-38,4%	+/-100,0%		+/-21,3%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-27,9%		+/-32,2%			+/-21,8%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-45,2%			+/-100,0%		+/-41,4%
Birken-Typ	SE[%]	+/-28,7%		+/-52,3%	+/-100,0%		+/-25,2%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-91,4%		+/-70,7%	+/-72,1%		+/-59,8%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-11,2%			+/-100,0%		+/-11,1%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-17,2%		+/-47,4%	+/-100,0%		+/-17,9%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-18,3%		+/-48,0%	+/-100,0%		+/-17,2%
Tannen-Typ	SE[%]			+/-100,0%			+/-100,0%
Douglasien-Typ	SE[%]			+/-100,0%			+/-100,0%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-21,5%		+/-53,2%			+/-22,2%
Lärchen-Typ	SE[%]			+/-70,8%			+/-70,8%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-21,3%		+/-40,6%			+/-18,8%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	SE[%]	+/-7,2%		+/-17,0%	+/-58,1%		+/-7,1%

1.04.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Verjüngungsart

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JJ_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
Eichen-Typ	%	61,6%		37,0%	1,4%		100,0%
Buchen-Typ	%	45,5%		54,5%			100,0%
Eschen-Typ	%	87,0%			13,0%		100,0%
Birken-Typ	%	77,5%		21,2%	1,3%		100,0%
Erlen-Typ	%	61,1%		11,1%	27,8%		100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	99,8%			0,2%		100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	68,6%		26,9%	4,5%		100,0%
Fichten-Typ	%	84,8%		14,3%	0,8%		100,0%
Tannen-Typ	%			100,0%			100,0%
Douglasien-Typ	%			100,0%			100,0%
Kiefern-Typ	%	75,4%		24,6%			100,0%
Lärchen-Typ	%			100,0%			100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	78,1%		21,9%			100,0%
alle führenden Baumarten der Jungbestockung	%	77,1%		21,6%	1,3%		100,0%