

1.05.24 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1J1_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Drahtschmielen-Buchenwald	[ha]	119.187	61.200	1.095	37.628	7.060	14.515	17.677	116.151	3.787	25.658	591.609	45.189	25.843	1.066.600
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	363.289	800.031	17.030	105.422	17.027	72.000	115.113	1.925.637	87.880	137.949	638.511	92.801	135.751	4.508.441
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	167.736	472.552	55.271	27.219	19.813	39.550	123.439	357.586	29.797	30.190	119.102	35.027	56.335	1.533.618
Waldgersten-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	37.295	290.323	34.640	3.289	5.268	9.650	45.528	170.000	10.905	9.088	53.193	6.188	23.770	699.139
Bergahorn-Buchenwald	[ha]	199	1.399					498	2.098	200					4.395
Fichten-Buchenwald	[ha]		8.694		2.594	199	1.798	599	66.880	400		3.000	998	1.598	86.761
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	[ha]		36.404	2.797		400	500	4.099	118.476	8.500	100	2.601	599	7.401	181.877
Seggen-Buchenwald	[ha]	3.398	32.512	2.702	100	100	600	5.488	16.998	500	1.490	17.618	800	2.901	85.208
Buchenwälder	[ha]	691.104	1.703.116	113.536	176.253	49.867	138.614	312.441	2.773.826	141.969	204.476	1.425.635	181.603	253.598	8.166.039
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]	58.403	26.152	1.894	13.924	5.778	8.654	8.863	30.069	896	3.789	70.892	5.875	8.170	243.358
Birken-Stieleichenwald	[ha]	18.985	2.790	400	33.433	12.023	3.287	1.790	27.522	100	797	98.180	2.985	4.083	206.377
Birken-Traubeneichenwald	[ha]	10.285	2.398		5.878	399	1.796	2.397	9.870	499	2.492	100.200	2.885	2.391	141.481
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	13.544	1.978		14.862	2.174	8.307	12.056	7.787		594	470.255	3.077	4.954	539.588
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]	75.129	22.485	19.311	14.411	30.064	17.620	25.599	28.299	2.688	1.692	51.271	4.784	12.452	305.806
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	66.808	6.462	9.883	8.748	1.094	13.947	30.901	14.060	200	3.067	150.451	3.569	6.378	315.566
Traubeneichen-Linden-Wälder	[ha]	8.838	697	395	2.882	199	3.174	4.765	1.587		199	76.970	2.181	2.683	104.571
Xerotherme Eichen-Mischwälder	[ha]	5.178	2.483	400	100		200	1.197	301		697	4.294		599	15.448
Eichenwälder	[ha]	257.171	65.444	32.283	94.239	51.730	56.986	87.569	119.494	4.383	13.327	1.022.514	25.356	41.709	1.872.204
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	[ha]		1.201				500	200	39.115	5.503		500		1.501	48.520
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	[ha]	702	601	301	1.302	401	500	200	64.219	4.703	100	17.501	802	2.802	94.133
Labkraut-Fichten-Tannenwald	[ha]	800	3.598	600	999	1.899	800	400	19.982	3.101	300	800		700	33.982
Wintergrün-Fichten-Tannenwald	[ha]					400			5.093						5.493
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]		799				199		34.049			799			35.846
Alpenlattich-Fichtenwald	[ha]								9.191	199		400		400	10.190
Peitschenmoos-Fichtenwald	[ha]				2.801	500	199		8.084					400	11.984
Lärchen-Zirbenwald	[ha]												400		400
Schneeheide-Kiefernwälder	[ha]					400			400			2.401			3.201
Nadelwälder	[ha]	1.502	6.199	901	5.102	3.600	2.199	800	180.133	13.505	400	22.401	1.202	5.804	243.748
Grauerlenauewald	[ha]			900		3.197	1.499	400	2.298			798		800	9.893
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	[ha]	500	999	3.399		5.288	2.196	499	9.289		100	201	199	699	23.368
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]	4.381	1.895	10.474	4.275	26.979	10.376	2.589	24.381	200		3.683	200	4.584	94.017
Bach-Eschenwälder	[ha]	3.181	3.471	11.545	1.486	11.435	5.266	4.082	21.639	600		299	800	4.783	68.587
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]	7.176	497	8.783	699	1.199	8.969	7.576	1.198			1.795	398	1.794	40.083
Silberweiden-Weichholzauewald	[ha]			700	199	199	6.765	898				100		100	8.960
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]	5.669	2.287	3.874	11.622	73.621	11.439	2.287	10.460			3.968		2.884	128.112
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]	99			39.050	3.181	2.386		11.960	100		24.914	199	3.981	85.871
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	[ha]	21.005	9.148	39.676	57.332	125.098	48.897	18.332	81.225	900	100	35.759	1.796	19.625	458.892
Block-Fichtenwald	[ha]			199		398			1.298					400	2.296
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	[ha]	100	100						1.294	100					1.593
Ahorn-Eschenwald	[ha]	2.197	6.998	11.584	1.698	6.766	3.496	9.892	15.693	1.800	300	1.697	100	5.096	67.316

Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]	2.092	9.887	3.299	100	299	500	4.292	7.487	898	100	299	201	299	29.753
Alpenrosen-Latschengebüsche	[ha]		400						2.399			1.600			4.399
Grünerlengebüsch	[ha]								199						199
sonstige azonale Waldgesellschaften	[ha]	4.389	17.385	15.082	1.798	7.463	3.996	14.183	28.370	2.798	400	3.597	300	5.795	105.556
alle natürliche Waldgesellschaften	[ha]	975.171	1.801.292	201.478	334.723	237.758	250.692	433.326	3.183.048	163.555	218.702	2.509.905	210.258	326.531	10.846.440

1.05.24 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Drahtschmielen-Buchenwald	Sek	564	313	7	202	34	73	90	622	28	125	2.868	251	124	5.301
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	2.167	4.108	98	528	112	380	725	8.973	672	952	3.381	440	734	23.270
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	1.037	2.738	354	145	132	208	721	2.076	268	208	753	213	338	9.191
Waldgersten-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	237	1.748	233	24	45	72	288	1.125	106	77	243	37	145	4.380
Bergahorn-Buchenwald	Sek	2	7	0	0	0	0	3	12	2	0	0	0	0	26
Fichten-Buchenwald	Sek	0	26	0	11	1	6	2	252	1	0	8	4	4	315
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	Sek	0	133	12	0	1	2	15	385	32	1	11	2	22	616
Seggen-Buchenwald	Sek	30	203	16	1	1	5	40	110	5	12	108	5	19	555
Buchenwälder	Sek	4.037	9.276	720	911	326	746	1.884	13.555	1.114	1.375	7.372	952	1.386	43.654
Buchen-Traubeneichenwald	Sek	199	87	13	42	20	32	47	95	4	15	342	23	30	949
Birken-Stieleichenwald	Sek	83	21	2	160	49	19	8	140	1	5	390	13	23	914
Birken-Traubeneichenwald	Sek	69	19	0	35	4	12	17	62	5	17	536	20	14	810
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	40	7	0	50	6	26	35	25	0	2	1.439	10	16	1.656
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek	381	126	126	75	164	93	151	149	11	10	293	27	74	1.680
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	331	30	57	44	4	95	177	59	2	13	516	15	37	1.380
Traubeneichen-Linden-Wälder	Sek	65	7	1	23	2	20	32	10	0	2	651	13	21	847
Xerotherme Eichen-Mischwälder	Sek	52	10	4	1	0	2	12	2	0	7	26	0	6	122
Eichenwälder	Sek	1.220	307	203	430	249	299	479	542	23	71	4.193	121	221	8.358
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	Sek	0	12	0	0	0	5	2	356	52	0	5	0	15	447
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	Sek	4	5	2	6	3	5	2	441	47	1	93	4	16	629
Labkraut-Fichten-Tannenwald	Sek	8	21	6	6	8	5	4	126	30	3	8	0	7	232
Wintergrün-Fichten-Tannenwald	Sek	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	19
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek	0	3	0	0	0	1	0	146	0	0	3	0	0	153
Alpenlattich-Fichtenwald	Sek	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	1	0	1	32
Peitschenmoos-Fichtenwald	Sek	0	0	0	7	2	1	0	38	0	0	0	0	1	49
Lärchen-Zirbenwald	Sek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Schneeheide-Kiefernwälder	Sek	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6	0	0	8
Nadelwälder	Sek	12	41	8	19	15	17	8	1.155	130	4	116	5	40	1.570
Grauerlenauwald	Sek	0	0	3	0	10	5	1	8	0	0	3	0	2	32
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	Sek	2	3	11	0	25	7	2	28	0	1	1	2	3	85
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek	29	9	63	29	183	67	18	111	2	0	21	2	24	558
Bach-Eschenwälder	Sek	16	22	54	5	55	24	21	104	6	0	3	2	23	335
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek	61	2	51	4	8	55	60	4	0	0	8	1	12	266
Silberweiden-Weichholzauewald	Sek	0	0	4	1	1	34	7	0	0	0	1	0	1	49
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek	36	14	26	76	431	76	15	65	0	0	25	0	16	780
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek	1	0	0	212	19	13	0	62	1	0	111	2	18	439
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	Sek	145	50	212	327	732	281	124	382	9	1	173	9	99	2.544
Block-Fichtenwald	Sek	0	0	1	0	2	0	0	7	0	0	0	0	1	11
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	Sek	1	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	10
Ahorn-Eschenwald	Sek	17	63	76	8	58	28	68	106	17	3	8	1	30	483

Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek	18	52	14	1	2	2	30	41	7	1	2	1	3	174
Alpenrosen-Latschengebüsche	Sek	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	4	0	0	12
Grünerlengebüsch	Sek	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
sonstige azonale Waldgesellschaften	Sek	36	117	91	9	62	30	98	169	25	4	14	2	34	691
alle natürliche Waldgesellschaften	Sek	5.450	9.791	1.234	1.696	1.384	1.373	2.593	15.803	1.301	1.455	11.868	1.089	1.780	56.817

1.05.24 Waldfläche [SE68%±] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1J1_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Drahtschmielen-Buchenwald	SE[%]	+/-5,9%	+/-9,2%	+/-45,4%	+/-9,9%	+/-19,8%	+/-14,5%	+/-14,6%	+/-5,9%	+/-23,2%	+/-11,0%	+/-3,6%	+/-8,8%	+/-10,7%	+/-2,6%
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-3,3%	+/-2,6%	+/-12,9%	+/-5,9%	+/-11,6%	+/-6,7%	+/-5,0%	+/-1,8%	+/-5,6%	+/-4,7%	+/-3,0%	+/-6,3%	+/-4,7%	+/-1,2%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-4,7%	+/-3,4%	+/-7,0%	+/-10,8%	+/-11,0%	+/-9,0%	+/-5,2%	+/-3,4%	+/-8,2%	+/-9,9%	+/-6,4%	+/-9,8%	+/-6,8%	+/-1,9%
Waldgersten-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-9,6%	+/-4,4%	+/-8,4%	+/-26,6%	+/-20,5%	+/-15,5%	+/-7,7%	+/-5,0%	+/-12,0%	+/-15,4%	+/-9,2%	+/-19,5%	+/-11,2%	+/-5,0%
Bergahorn-Buchenwald	SE[%]	+/-70,7%	+/-60,6%					+/-60,0%	+/-45,9%	+/-70,7%					+/-41,4%
Fichten-Buchenwald	SE[%]		+/-30,2%		+/-35,2%	+/-100,0%	+/-53,3%	+/-74,6%	+/-11,3%	+/-100,0%		+/-48,5%	+/-52,9%	+/-50,0%	+/-10,9%
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	SE[%]		+/-13,4%	+/-32,7%		+/-100,0%	+/-82,5%	+/-28,9%	+/-8,8%	+/-21,3%	+/-100,0%	+/-47,4%	+/-74,6%	+/-23,8%	+/-7,7%
Seggen-Buchenwald	SE[%]	+/-22,0%	+/-10,1%	+/-29,4%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-47,2%	+/-21,4%	+/-15,0%	+/-44,7%	+/-34,4%	+/-12,5%	+/-46,8%	+/-26,9%	+/-6,5%
Buchenwälder	SE[%]	+/-2,4%	+/-1,8%	+/-4,8%	+/-4,5%	+/-7,1%	+/-4,8%	+/-3,1%	+/-1,4%	+/-4,3%	+/-3,8%	+/-2,1%	+/-4,4%	+/-3,4%	+/-0,8%
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-9,6%	+/-14,4%	+/-35,3%	+/-17,3%	+/-25,9%	+/-21,2%	+/-18,2%	+/-14,6%	+/-55,5%	+/-36,3%	+/-9,3%	+/-25,6%	+/-20,4%	+/-5,7%
Birken-Stieleichenwald	SE[%]	+/-15,3%	+/-26,7%	+/-70,7%	+/-10,2%	+/-17,3%	+/-28,9%	+/-39,2%	+/-11,7%	+/-100,0%	+/-46,8%	+/-8,7%	+/-30,1%	+/-23,2%	+/-5,7%
Birken-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-14,9%	+/-28,3%		+/-19,7%	+/-100,0%	+/-30,4%	+/-26,4%	+/-15,9%	+/-44,7%	+/-28,0%	+/-7,6%	+/-28,2%	+/-31,7%	+/-6,2%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-19,6%	+/-50,4%		+/-19,2%	+/-41,6%	+/-28,2%	+/-21,1%	+/-22,5%		+/-74,4%	+/-4,6%	+/-33,6%	+/-26,2%	+/-4,3%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]	+/-8,1%	+/-12,9%	+/-11,8%	+/-15,8%	+/-10,1%	+/-14,3%	+/-11,0%	+/-11,9%	+/-50,3%	+/-38,5%	+/-10,2%	+/-23,7%	+/-14,4%	+/-4,4%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-8,2%	+/-25,8%	+/-15,8%	+/-17,2%	+/-55,3%	+/-12,9%	+/-10,1%	+/-18,7%	+/-70,7%	+/-42,6%	+/-7,6%	+/-33,7%	+/-19,0%	+/-4,9%
Traubeneichen-Linden-Wälder	SE[%]	+/-18,9%	+/-42,8%	+/-100,0%	+/-26,8%	+/-70,7%	+/-38,1%	+/-25,8%	+/-40,4%		+/-70,7%	+/-7,6%	+/-43,5%	+/-26,3%	+/-7,0%
Xerotherme Eichen-Mischwälder	SE[%]	+/-17,6%	+/-60,0%	+/-61,3%	+/-100,0%		+/-70,7%	+/-31,2%	+/-74,6%		+/-55,3%	+/-33,4%		+/-47,1%	+/-16,1%
Eichenwälder	SE[%]	+/-4,3%	+/-8,3%	+/-9,0%	+/-6,3%	+/-8,0%	+/-8,2%	+/-6,3%	+/-6,2%	+/-34,1%	+/-16,8%	+/-2,8%	+/-11,5%	+/-8,0%	+/-2,0%
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	SE[%]		+/-37,3%				+/-44,7%	+/-70,7%	+/-8,6%	+/-16,9%		+/-44,7%		+/-27,5%	+/-7,9%
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	SE[%]	+/-51,5%	+/-47,2%	+/-74,6%	+/-44,2%	+/-61,3%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-8,6%	+/-18,1%	+/-100,0%	+/-15,8%	+/-61,2%	+/-29,9%	+/-7,6%
Labkraut-Fichten-Tannenwald	SE[%]	+/-46,8%	+/-32,1%	+/-40,8%	+/-49,0%	+/-40,4%	+/-55,9%	+/-50,0%	+/-14,0%	+/-21,6%	+/-74,5%	+/-46,8%		+/-37,8%	+/-11,2%
Wintergrün-Fichten-Tannenwald	SE[%]					+/-100,0%			+/-43,9%						+/-42,6%
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]		+/-70,7%				+/-100,0%		+/-15,4%			+/-61,3%			+/-14,9%
Alpenlattich-Fichtenwald	SE[%]								+/-31,9%	+/-100,0%		+/-100,0%		+/-100,0%	+/-31,3%
Peitschenmoos-Fichtenwald	SE[%]				+/-55,3%	+/-82,5%	+/-100,0%		+/-23,0%					+/-100,0%	+/-25,2%
Lärchen-Zirbenwald	SE[%]												+/-100,0%		+/-100,0%
Schneeheide-Kiefernwälder	SE[%]					+/-100,0%			+/-100,0%			+/-70,7%			+/-63,7%
Nadelwälder	SE[%]	+/-34,6%	+/-22,4%	+/-36,9%	+/-33,8%	+/-29,6%	+/-28,0%	+/-35,3%	+/-5,5%	+/-10,8%	+/-61,2%	+/-14,9%	+/-52,7%	+/-19,3%	+/-4,9%
Grauerlenauewald	SE[%]			+/-63,8%		+/-47,6%	+/-48,5%	+/-100,0%	+/-45,4%			+/-70,7%		+/-70,7%	+/-28,9%
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	SE[%]	+/-82,5%	+/-60,0%	+/-43,4%		+/-24,5%	+/-48,5%	+/-82,5%	+/-20,8%		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-65,5%	+/-14,4%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]	+/-23,2%	+/-39,8%	+/-15,5%	+/-27,6%	+/-9,6%	+/-18,8%	+/-28,2%	+/-12,7%	+/-70,7%		+/-35,9%	+/-70,7%	+/-24,6%	+/-6,5%
Bach-Eschenwälder	SE[%]	+/-29,3%	+/-25,7%	+/-17,7%	+/-61,3%	+/-18,7%	+/-24,2%	+/-26,6%	+/-12,2%	+/-47,1%		+/-57,7%	+/-70,7%	+/-24,6%	+/-7,5%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]	+/-16,6%	+/-82,4%		+/-22,7%	+/-62,3%	+/-22,5%	+/-18,0%	+/-70,8%			+/-41,6%	+/-100,0%	+/-33,3%	+/-11,2%
Silberweiden-Weichholzauewald	SE[%]			+/-62,3%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-24,1%	+/-40,0%				+/-100,0%		+/-100,0%	+/-20,5%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]	+/-21,5%	+/-33,9%	+/-24,7%	+/-15,5%	+/-7,5%	+/-15,1%	+/-31,0%	+/-15,4%			+/-26,2%		+/-30,6%	+/-5,7%
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]	+/-100,0%			+/-10,7%	+/-27,2%	+/-41,2%		+/-18,5%	+/-100,0%		+/-15,3%	+/-100,0%	+/-26,2%	+/-8,3%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	SE[%]	+/-10,6%	+/-17,2%	+/-9,5%	+/-8,4%	+/-5,5%	+/-8,6%	+/-11,6%	+/-6,8%	+/-36,8%	+/-100,0%	+/-11,9%	+/-41,6%	+/-11,9%	+/-3,2%
Block-Fichtenwald	SE[%]			+/-100,0%		+/-100,0%			+/-48,1%					+/-100,0%	+/-48,2%
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%						+/-66,5%	+/-100,0%					+/-55,1%
Ahorn-Eschenwald	SE[%]	+/-28,8%	+/-15,1%	+/-16,9%	+/-54,3%	+/-16,9%	+/-24,1%	+/-16,9%	+/-14,8%	+/-26,0%	+/-57,7%	+/-50,2%	+/-100,0%	+/-24,9%	+/-7,6%

Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]	+/-28,9%	+/-18,7%	+/-31,3%	+/-100,0%	+/-74,5%	+/-82,5%	+/-20,9%	+/-21,3%	+/-40,0%	+/-100,0%	+/-74,5%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-11,4%
Alpenrosen-Latschengebüsche	SE[%]		+/-100,0%						+/-52,7%			+/-79,0%			+/-45,4%
Grünerlengebüsch	SE[%]								+/-100,0%						+/-100,0%
sonstige azonale Waldgesellschaften	SE[%]	+/-20,1%	+/-12,5%	+/-14,8%	+/-51,6%	+/-16,5%	+/-23,5%	+/-13,5%	+/-11,5%	+/-22,0%	+/-50,0%	+/-42,9%	+/-74,6%	+/-23,1%	+/-6,3%
alle natürliche Waldgesellschaften	SE[%]	+/-2,1%	+/-1,7%	+/-3,8%	+/-3,4%	+/-3,9%	+/-3,7%	+/-2,7%	+/-1,3%	+/-4,0%	+/-3,7%	+/-1,6%	+/-4,1%	+/-3,0%	+/-0,7%

1.05.24 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1J1_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Drahtschmielen-Buchenwald	%	11,2%	5,7%	0,1%	3,5%	0,7%	1,4%	1,7%	10,9%	0,4%	2,4%	55,5%	4,2%	2,4%	100,0%
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	8,1%	17,7%	0,4%	2,3%	0,4%	1,6%	2,6%	42,7%	1,9%	3,1%	14,2%	2,1%	3,0%	100,0%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	10,9%	30,8%	3,6%	1,8%	1,3%	2,6%	8,0%	23,3%	1,9%	2,0%	7,8%	2,3%	3,7%	100,0%
Waldgersten-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	5,3%	41,5%	5,0%	0,5%	0,8%	1,4%	6,5%	24,3%	1,6%	1,3%	7,6%	0,9%	3,4%	100,0%
Bergahorn-Buchenwald	%	4,5%	31,8%					11,3%	47,7%	4,6%					100,0%
Fichten-Buchenwald	%		10,0%		3,0%	0,2%	2,1%	0,7%	77,1%	0,5%		3,5%	1,2%	1,8%	100,0%
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	%		20,0%	1,5%		0,2%	0,3%	2,3%	65,1%	4,7%	0,1%	1,4%	0,3%	4,1%	100,0%
Seggen-Buchenwald	%	4,0%	38,2%	3,2%	0,1%	0,1%	0,7%	6,4%	19,9%	0,6%	1,7%	20,7%	0,9%	3,4%	100,0%
Buchenwälder	%	8,5%	20,9%	1,4%	2,2%	0,6%	1,7%	3,8%	34,0%	1,7%	2,5%	17,5%	2,2%	3,1%	100,0%
Buchen-Traubeneichenwald	%	24,0%	10,7%	0,8%	5,7%	2,4%	3,6%	3,6%	12,4%	0,4%	1,6%	29,1%	2,4%	3,4%	100,0%
Birken-Stieleichenwald	%	9,2%	1,4%	0,2%	16,2%	5,8%	1,6%	0,9%	13,3%	0,0%	0,4%	47,6%	1,4%	2,0%	100,0%
Birken-Traubeneichenwald	%	7,3%	1,7%		4,2%	0,3%	1,3%	1,7%	7,0%	0,4%	1,8%	70,8%	2,0%	1,7%	100,0%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	2,5%	0,4%		2,8%	0,4%	1,5%	2,2%	1,4%		0,1%	87,2%	0,6%	0,9%	100,0%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%	24,6%	7,4%	6,3%	4,7%	9,8%	5,8%	8,4%	9,3%	0,9%	0,6%	16,8%	1,6%	4,1%	100,0%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	21,2%	2,0%	3,1%	2,8%	0,3%	4,4%	9,8%	4,5%	0,1%	1,0%	47,7%	1,1%	2,0%	100,0%
Traubeneichen-Linden-Wälder	%	8,5%	0,7%	0,4%	2,8%	0,2%	3,0%	4,6%	1,5%		0,2%	73,6%	2,1%	2,6%	100,0%
Xerotherme Eichen-Mischwälder	%	33,5%	16,1%	2,6%	0,6%		1,3%	7,7%	1,9%		4,5%	27,8%		3,9%	100,0%
Eichenwälder	%	13,7%	3,5%	1,7%	5,0%	2,8%	3,0%	4,7%	6,4%	0,2%	0,7%	54,6%	1,4%	2,2%	100,0%
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	%		2,5%				1,0%	0,4%	80,6%	11,3%		1,0%		3,1%	100,0%
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	%	0,7%	0,6%	0,3%	1,4%	0,4%	0,5%	0,2%	68,2%	5,0%	0,1%	18,6%	0,9%	3,0%	100,0%
Labkraut-Fichten-Tannenwald	%	2,4%	10,6%	1,8%	2,9%	5,6%	2,4%	1,2%	58,8%	9,1%	0,9%	2,4%		2,1%	100,0%
Wintergrün-Fichten-Tannenwald	%					7,3%			92,7%						100,0%
Bergreitgras-Fichtenwald	%		2,2%				0,6%		95,0%			2,2%			100,0%
Alpenlattich-Fichtenwald	%								90,2%	2,0%		3,9%		3,9%	100,0%
Peitschenmoos-Fichtenwald	%				23,4%	4,2%	1,7%		67,5%					3,3%	100,0%
Lärchen-Zirbenwald	%												100,0%		100,0%
Schneeheide-Kiefernwälder	%					12,5%			12,5%			75,0%			100,0%
Nadelwälder	%	0,6%	2,5%	0,4%	2,1%	1,5%	0,9%	0,3%	73,9%	5,5%	0,2%	9,2%	0,5%	2,4%	100,0%
Grauerlenauewald	%			9,1%		32,3%	15,2%	4,0%	23,2%			8,1%		8,1%	100,0%
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	%	2,1%	4,3%	14,5%		22,6%	9,4%	2,1%	39,7%		0,4%	0,9%	0,9%	3,0%	100,0%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%	4,7%	2,0%	11,1%	4,5%	28,7%	11,0%	2,8%	25,9%	0,2%		3,9%	0,2%	4,9%	100,0%
Bach-Eschenwälder	%	4,6%	5,1%	16,8%	2,2%	16,7%	7,7%	6,0%	31,6%	0,9%		0,4%	1,2%	7,0%	100,0%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%	17,9%	1,2%	21,9%	1,7%	3,0%	22,4%	18,9%	3,0%			4,5%	1,0%	4,5%	100,0%
Silberweiden-Weichholzauewald	%			7,8%	2,2%	2,2%	75,5%	10,0%				1,1%		1,1%	100,0%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%	4,4%	1,8%	3,0%	9,1%	57,5%	8,9%	1,8%	8,2%			3,1%		2,3%	100,0%
Rauschbeeren-Moorwälder	%	0,1%			45,5%	3,7%	2,8%		13,9%	0,1%		29,0%	0,2%	4,6%	100,0%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	%	4,6%	2,0%	8,6%	12,5%	27,3%	10,7%	4,0%	17,7%	0,2%	0,0%	7,8%	0,4%	4,3%	100,0%
Block-Fichtenwald	%			8,7%		17,3%			56,6%					17,4%	100,0%
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	%	6,2%	6,2%						81,2%	6,3%					100,0%
Ahorn-Eschenwald	%	3,3%	10,4%	17,2%	2,5%	10,1%	5,2%	14,7%	23,3%	2,7%	0,4%	2,5%	0,1%	7,6%	100,0%

Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%	7,0%	33,2%	11,1%	0,3%	1,0%	1,7%	14,4%	25,2%	3,0%	0,3%	1,0%	0,7%	1,0%	100,0%
Alpenrosen-Latschengebüsche	%		9,1%						54,5%			36,4%			100,0%
Grünerlengebüsch	%								100,0%						100,0%
sonstige azonale Waldgesellschaften	%	4,2%	16,5%	14,3%	1,7%	7,1%	3,8%	13,4%	26,9%	2,7%	0,4%	3,4%	0,3%	5,5%	100,0%
alle natürliche Waldgesellschaften	%	9,0%	16,6%	1,9%	3,1%	2,2%	2,3%	4,0%	29,3%	1,5%	2,0%	23,1%	1,9%	3,0%	100,0%

1.05.24 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	13.754	11.362	1.395	10.963	1.595	5.581	3.787	127.571	598	598	29.899	8.770	6.179	222.053
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	1.196	598	598		199		598	5.581			199		399	9.368
Fichten-Buchenwald	[ha]		1.395		1.794	199	598	199	29.501			199	598		34.484
Buchenwälder	[ha]	14.950	13.355	1.993	12.757	1.993	6.179	4.585	162.653	598	598	30.298	9.368	6.578	265.905
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]		598						997			598		199	2.392
Birken-Stieleichenwald	[ha]	797	399		2.591	997		399	3.189		199	15.548	399	997	25.514
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	1.993	199		4.585	199	1.395	1.196	1.595		199	73.154	598	1.196	86.310
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]	6.578	598	399	5.183	997	199	2.392	4.784			9.368	797		31.295
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	14.352	2.193	598	2.990	199	997	4.186	3.389			19.734	1.196	1.595	51.427
Eichenwälder	[ha]	23.720	3.987	997	15.348	2.392	2.591	8.173	13.953		399	118.402	2.990	3.987	196.937
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]		399				199		15.548			399			16.544
Nadelwälder	[ha]		399				199		15.548			399			16.544
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	[ha]		199			199								199	598
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]				199	598	997		598						2.392
Bach-Eschenwälder	[ha]			199	199	399		399	1.794					399	3.389
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]	399				199	797	1.196						598	3.189
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]	199		199	399	1.993	199		199			598			3.787
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]					997			1.794			598		199	3.588
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	[ha]	598	199	399	1.794	3.389	1.993	1.595	4.385			1.196		1.395	16.943
Ahorn-Eschenwald	[ha]							598						199	797
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]	598	199	199				1.196				199			2.392
sonstige azonale Waldgesellschaften	[ha]	598	199	199				1.794				199		199	3.189
alle natürliche Waldgesellschaften	[ha]	39.866	18.139	3.588	29.899	7.774	10.963	16.146	196.539	598	997	150.494	12.358	12.159	499.519

1.05.24 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	69	57	7	55	8	28	19	640	3	3	150	44	31	1.114
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	6	3	3	0	1		3	28	0	0	1	0	2	47
Fichten-Buchenwald	Sek	0	7	0	9	1	3	1	148	0	0	1	3	0	173
Buchenwälder	Sek	75	67	10	64	10	31	23	816	3	3	152	47	33	1.334
Buchen-Traubeneichenwald	Sek		3	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	1	12
Birken-Stieleichenwald	Sek	4	2	0	13	5	0	2	16	0	1	78	2	5	128
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	10	1	0	23	1	7	6	8	0	1	367	3	6	433
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek	33	3	2	26	5	1	12	24	0	0	47	4	0	157
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	72	11	3	15	1	5	21	17	0	0	99	6	8	258
Eichenwälder	Sek	119	20	5	77	12	13	41	70	0	2	594	15	20	988
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek	0	2	0	0	0	1	0	78	0	0	2	0	0	83
Nadelwälder	Sek	0	2	0	0	0	1	0	78	0	0	2	0	0	83
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	Sek	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek	0	0	0	1	3	5	0	3	0	0	0	0	0	12
Bach-Eschenwälder	Sek	0	0	1	1	2	0	2	9	0	0	0	0	2	17
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek	2	0	0	0	1	4	6	0	0	0	0	0	3	16
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek	1	0	1	2	10	1	0	1	0	0	3	0	0	19
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek	0	0	0	5	0	0	0	9	0	0	3	0	1	18
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	Sek	3	1	2	9	17	10	8	22	0	0	6	0	7	85
Ahorn-Eschenwald	Sek	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	4
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek	3	1	1	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	12
sonstige azonale Waldgesellschaften	Sek	3	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	0	1	16
alle natürliche Waldgesellschaften	Sek	200	91	18	150	39	55	81	986	3	5	755	62	61	2.506

1.05.24 Waldfläche [SE68%±] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-13,2%	+/-15,9%	+/-42,8%	+/-14,3%	+/-35,3%	+/-21,3%	+/-24,0%	+/-6,1%	+/-74,5%	+/-57,7%	+/-11,9%	+/-16,9%	+/-17,8%	+/-4,8%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-47,1%	+/-57,7%	+/-57,7%		+/-100,0%		+/-57,7%	+/-28,5%			+/-100,0%		+/-70,7%	+/-21,3%
Fichten-Buchenwald	SE[%]		+/-51,5%		+/-40,0%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-13,7%			+/-100,0%	+/-57,7%		+/-13,1%
Buchenwälder	SE[%]	+/-12,7%	+/-14,7%	+/-34,6%	+/-13,5%	+/-31,6%	+/-20,0%	+/-21,6%	+/-5,5%	+/-74,5%	+/-57,7%	+/-11,8%	+/-16,2%	+/-17,3%	+/-4,4%
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]		+/-100,0%						+/-82,5%			+/-74,5%		+/-100,0%	+/-47,1%
Birken-Stieleichenwald	SE[%]	+/-61,2%	+/-70,7%		+/-31,7%	+/-44,7%		+/-70,7%	+/-30,6%		+/-100,0%	+/-16,8%	+/-70,7%	+/-44,7%	+/-13,9%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-31,6%	+/-100,0%		+/-24,9%	+/-100,0%	+/-42,8%	+/-70,7%	+/-43,3%		+/-100,0%	+/-8,9%	+/-57,7%	+/-40,8%	+/-8,3%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]	+/-21,1%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-26,0%	+/-44,7%	+/-100,0%	+/-37,2%	+/-30,0%			+/-20,9%	+/-61,2%		+/-12,6%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-14,4%	+/-35,2%	+/-57,7%	+/-25,7%	+/-100,0%	+/-44,7%	+/-23,7%	+/-33,7%			+/-15,8%	+/-47,1%	+/-35,3%	+/-9,6%
Eichenwälder	SE[%]	+/-11,0%	+/-27,3%	+/-44,7%	+/-14,0%	+/-28,8%	+/-29,7%	+/-19,6%	+/-17,3%		+/-70,7%	+/-6,8%	+/-29,0%	+/-22,3%	+/-5,2%
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]		+/-100,0%				+/-100,0%		+/-18,8%			+/-70,7%			+/-18,3%
Nadelwälder	SE[%]		+/-100,0%				+/-100,0%		+/-18,8%			+/-70,7%			+/-18,3%
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	SE[%]		+/-100,0%			+/-100,0%								+/-100,0%	+/-57,7%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]				+/-100,0%	+/-57,7%	+/-82,5%		+/-57,7%						+/-40,8%
Bach-Eschenwälder	SE[%]			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%		+/-70,7%	+/-40,0%					+/-70,7%	+/-29,3%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]	+/-70,7%				+/-100,0%	+/-50,0%	+/-62,3%						+/-57,7%	+/-38,5%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]	+/-100,0%		+/-100,0%	+/-70,7%	+/-34,6%	+/-100,0%		+/-100,0%			+/-57,7%			+/-27,3%
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]				+/-52,9%				+/-53,3%			+/-57,7%		+/-100,0%	+/-32,3%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	SE[%]	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-36,8%	+/-25,6%	+/-46,9%	+/-50,0%	+/-28,7%			+/-40,8%		+/-37,7%	+/-14,3%
Ahorn-Eschenwald	SE[%]							+/-57,7%						+/-100,0%	+/-50,0%
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-100,0%				+/-40,8%				+/-100,0%			+/-35,3%
sonstige azonale Waldgesellschaften	SE[%]	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-100,0%				+/-33,3%				+/-100,0%		+/-100,0%	+/-29,2%
alle natürliche Waldgesellschaften	SE[%]	+/-8,2%	+/-12,9%	+/-24,8%	+/-9,4%	+/-16,3%	+/-15,8%	+/-13,4%	+/-5,1%	+/-74,5%	+/-44,7%	+/-5,9%	+/-14,5%	+/-13,3%	+/-3,0%

1.05.24 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1J1_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	6,2%	5,1%	0,6%	4,9%	0,7%	2,5%	1,7%	57,5%	0,3%	0,3%	13,5%	3,9%	2,8%	100,0%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	12,8%	6,4%	6,4%		2,1%		6,4%	59,6%			2,1%		4,3%	100,0%
Fichten-Buchenwald	%		4,0%		5,2%	0,6%	1,7%	0,6%	85,5%			0,6%	1,7%		100,0%
Buchenwälder	%	5,6%	5,0%	0,7%	4,8%	0,7%	2,3%	1,7%	61,2%	0,2%	0,2%	11,4%	3,5%	2,5%	100,0%
Buchen-Traubeneichenwald	%		25,0%						41,7%			25,0%		8,3%	100,0%
Birken-Stieleichenwald	%	3,1%	1,6%		10,2%	3,9%		1,6%	12,5%		0,8%	60,9%	1,6%	3,9%	100,0%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	2,3%	0,2%		5,3%	0,2%	1,6%	1,4%	1,8%		0,2%	84,8%	0,7%	1,4%	100,0%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%	21,0%	1,9%	1,3%	16,6%	3,2%	0,6%	7,6%	15,3%			29,9%	2,5%		100,0%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	27,9%	4,3%	1,2%	5,8%	0,4%	1,9%	8,1%	6,6%			38,4%	2,3%	3,1%	100,0%
Eichenwälder	%	12,0%	2,0%	0,5%	7,8%	1,2%	1,3%	4,1%	7,1%		0,2%	60,1%	1,5%	2,0%	100,0%
Bergreitgras-Fichtenwald	%		2,4%				1,2%		94,0%			2,4%			100,0%
Nadelwälder	%		2,4%				1,2%		94,0%			2,4%			100,0%
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	%		33,3%			33,3%								33,3%	100,0%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%				8,3%	25,0%	41,7%		25,0%						100,0%
Bach-Eschenwälder	%			5,9%	5,9%	11,8%		11,8%	52,9%					11,8%	100,0%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%	12,5%				6,3%	25,0%	37,5%						18,8%	100,0%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%	5,3%		5,3%	10,5%	52,6%	5,3%		5,3%			15,8%			100,0%
Rauschbeeren-Moorwälder	%				27,8%				50,0%			16,7%		5,6%	100,0%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	%	3,5%	1,2%	2,4%	10,6%	20,0%	11,8%	9,4%	25,9%			7,1%		8,2%	100,0%
Ahorn-Eschenwald	%							75,0%						25,0%	100,0%
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%	25,0%	8,3%	8,3%				50,0%				8,3%			100,0%
sonstige azonale Waldgesellschaften	%	18,8%	6,3%	6,3%				56,3%				6,3%		6,3%	100,0%
alle natürliche Waldgesellschaften	%	8,0%	3,6%	0,7%	6,0%	1,6%	2,2%	3,2%	39,3%	0,1%	0,2%	30,1%	2,5%	2,4%	100,0%

1.05.24 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L343of_2012_L344)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]		399		997				1.595			2.392	199		5.581
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]			199					199						399
Buchenwälder	[ha]		399	199	997				1.794			2.392	199		5.980
Birken-Stieleichenwald	[ha]				598				199			2.591			3.389
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	199			1.196		199					15.747		199	17.541
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]				199				797			797		199	1.993
Eichenwälder	[ha]	199			1.993		199		997			19.136		399	22.923
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]						797								797
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]											199			199
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]				199										199
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	[ha]				199		797					199			1.196
alle natürliche Waldgesellschaften	[ha]	199	399	199	3.189		997		2.791			21.727	199	399	30.099

1.05.24 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek		2		5				8			12	1		28
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek			1					1						2
Buchenwälder	Sek		2	1	5				9			12	1		30
Birken-Stieleichenwald	Sek				3				1			13			17
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	1			6		1					79		1	88
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek				1				4			4		1	10
Eichenwälder	Sek	1			10		1		5			96		2	115
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek						4								4
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek											1			1
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek				1										1
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	Sek				1		4					1			6
alle natürliche Waldgesellschaften	Sek	1	2	1	16		5		14			109	1	2	151

1.05.24 Waldfläche [SE68%±] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]		+/-70,7%		+/-60,0%				+/-58,6%			+/-52,7%	+/-100,0%		+/-36,0%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]			+/-100,0%					+/-100,0%						+/-100,0%
Buchenwälder	SE[%]		+/-70,7%	+/-100,0%	+/-60,0%				+/-53,3%			+/-52,7%	+/-100,0%		+/-34,3%
Birken-Stieleichenwald	SE[%]				+/-74,5%				+/-100,0%			+/-50,4%			+/-44,4%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-100,0%			+/-57,7%		+/-100,0%					+/-20,9%		+/-100,0%	+/-19,9%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]				+/-100,0%				+/-100,0%			+/-79,0%		+/-100,0%	+/-52,9%
Eichenwälder	SE[%]	+/-100,0%			+/-49,0%		+/-100,0%		+/-82,5%			+/-18,9%		+/-70,7%	+/-17,6%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]						+/-100,0%								+/-100,0%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]											+/-100,0%			+/-100,0%
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]				+/-100,0%										+/-100,0%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	SE[%]				+/-100,0%		+/-100,0%					+/-100,0%			+/-70,7%
alle natürliche Waldgesellschaften	SE[%]	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-36,4%		+/-82,5%		+/-45,1%			+/-17,7%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-15,4%

1.05.24 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%		7,1%		17,9%				28,6%			42,9%	3,6%		100,0%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%			50,0%					50,0%						100,0%
Buchenwälder	%		6,7%	3,3%	16,7%				30,0%			40,0%	3,3%		100,0%
Birken-Stieleichenwald	%				17,6%				5,9%			76,5%			100,0%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	1,1%			6,8%		1,1%					89,8%		1,1%	100,0%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%				10,0%				40,0%			40,0%		10,0%	100,0%
Eichenwälder	%	0,9%			8,7%		0,9%		4,3%			83,5%		1,7%	100,0%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%						100,0%								100,0%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%											100,0%			100,0%
Rauschbeeren-Moorwälder	%				100,0%										100,0%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	%				16,7%		66,7%					16,7%			100,0%
alle natürliche Waldgesellschaften	%	0,7%	1,3%	0,7%	10,6%		3,3%		9,3%			72,2%	0,7%	1,3%	100,0%

1.05.24 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl, L343of_2012_L344)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	3.987	5.781	0	2.392	399	1.595	797	65.579	399	399	9.966	4.385	2.791	98.469
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	0	199	0	0	0			797	0	0	0	0	199	1.196
Fichten-Buchenwald	[ha]	0	1.196	0	598	0	199	199	23.322	0	0	199	598	0	26.311
Buchenwälder	[ha]	3.987	7.176	0	2.990	399	1.794	997	89.698	399	399	10.166	4.983	2.990	125.976
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]		598	0	0	0	0	0	199	0	0	399	0	0	1.196
Birken-Stieleichenwald	[ha]	199	399	0	598	0	0	0	1.794	0	0	3.787	199	199	7.176
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	399	0	0	598	199	199	0	1.395	0	0	10.963	399	598	14.750
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]	2.193	199	0	797	199		399	2.791	0	0	3.389	598	0	10.564
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	3.389	997	0	598	199	199	797	997	0	0	3.389	399	199	11.162
Eichenwälder	[ha]	6.179	2.193	0	2.591	598	399	1.196	7.176	0	0	21.926	1.595	997	44.849
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]	0	399	0	0	0	199	0	10.963	0	0	399	0	0	11.960
Nadelwälder	[ha]	0	399	0	0	0	199	0	10.963	0	0	399	0	0	11.960
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]	0	0	0	199	0	0	0	399	0	0	0	0	0	598
Bach-Eschenwälder	[ha]	0	0	0	0	0	0	0	997	0	0	0	0	0	997
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]	199	0	0	0	199	199	399	0	0	0	0	0	199	1.196
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]	0	0	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	598
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]	0	0		399	0	0	0	1.196	0	0	399	0	0	1.993
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	[ha]	199	0	199	797	399	199	399	2.591	0	0	399	0	199	5.382
Ahorn-Eschenwald	[ha]	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	199
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]	0	199	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	399
sonstige azonale Waldgesellschaften	[ha]	0	199	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	598
alle natürliche Waldgesellschaften	[ha]	10.365	9.966	199	6.379	1.395	2.591	2.990	110.428	399	399	32.889	6.578	4.186	188.765

1.05.24 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	20	29		12	2	8	4	329	2	2	50	22	14	494
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek		1						4					1	6
Fichten-Buchenwald	Sek		6		3		1	1	117			1	3		132
Buchenwälder	Sek	20	36		15	2	9	5	450	2	2	51	25	15	632
Buchen-Traubeneichenwald	Sek		3						1			2			6
Birken-Stieleichenwald	Sek	1	2		3				9			19	1	1	36
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	2			3	1	1		7			55	2	3	74
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek	11	1		4	1		2	14			17	3		53
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	17	5		3	1	1	4	5			17	2	1	56
Eichenwälder	Sek	31	11		13	3	2	6	36			110	8	5	225
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek		2				1		55			2			60
Nadelwälder	Sek		2				1		55			2			60
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek				1				2						3
Bach-Eschenwälder	Sek								5						5
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek	1				1	1	2						1	6
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek			1	1	1									3
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek				2				6			2			10
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	Sek	1		1	4	2	1	2	13			2		1	27
Ahorn-Eschenwald	Sek							1							1
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek		1					1							2
sonstige azonale Waldgesellschaften	Sek		1					2							3
alle natürliche Waldgesellschaften	Sek	52	50	1	32	7	13	15	554	2	2	165	33	21	947

1.05.24 Waldfläche [SE68%±] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-22,3%	+/-20,9%		+/-31,1%	+/-70,7%	+/-43,3%	+/-61,2%	+/-8,9%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-19,5%	+/-24,8%	+/-26,7%	+/-7,7%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]		+/-100,0%						+/-50,0%					+/-100,0%	+/-40,8%
Fichten-Buchenwald	SE[%]		+/-57,7%		+/-57,7%		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-15,6%			+/-100,0%	+/-57,7%		+/-15,2%
Buchenwälder	SE[%]	+/-22,3%	+/-19,5%		+/-27,4%	+/-70,7%	+/-40,0%	+/-52,9%	+/-7,7%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-19,2%	+/-22,9%	+/-25,7%	+/-6,9%
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]		+/-100,0%						+/-100,0%			+/-100,0%			+/-62,3%
Birken-Stieleichenwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-70,7%		+/-57,7%				+/-43,0%			+/-32,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-23,8%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-70,7%			+/-57,7%	+/-100,0%	+/-100,0%		+/-47,3%			+/-22,5%	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-19,8%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]	+/-39,6%	+/-100,0%		+/-61,2%	+/-100,0%		+/-70,7%	+/-40,4%			+/-31,6%	+/-74,5%		+/-22,3%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-32,7%	+/-52,9%		+/-57,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-50,0%	+/-44,7%			+/-34,7%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-23,1%
Eichenwälder	SE[%]	+/-23,8%	+/-39,6%		+/-29,7%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-40,8%	+/-23,8%			+/-15,2%	+/-39,5%	+/-44,7%	+/-11,5%
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]		+/-100,0%				+/-100,0%		+/-22,4%			+/-70,7%			+/-21,4%
Nadelwälder	SE[%]		+/-100,0%				+/-100,0%		+/-22,4%			+/-70,7%			+/-21,4%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]				+/-100,0%				+/-70,7%						+/-57,7%
Bach-Eschenwälder	SE[%]								+/-52,9%						+/-52,9%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]	+/-100,0%				+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%						+/-100,0%	+/-62,3%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%									+/-74,5%
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]				+/-70,7%				+/-62,3%			+/-70,7%			+/-42,4%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	SE[%]	+/-100,0%		+/-100,0%	+/-50,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-36,8%			+/-70,7%		+/-100,0%	+/-25,3%
Ahorn-Eschenwald	SE[%]							+/-100,0%							+/-100,0%
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]		+/-100,0%					+/-100,0%							+/-70,7%
sonstige azonale Waldgesellschaften	SE[%]		+/-100,0%					+/-70,7%							+/-57,7%
alle natürliche Waldgesellschaften	SE[%]	+/-16,6%	+/-17,8%	+/-100,0%	+/-19,2%	+/-37,7%	+/-31,7%	+/-29,0%	+/-7,2%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-12,4%	+/-20,7%	+/-22,7%	+/-5,7%

1.05.24 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1J1_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchewald, z.T. mit Tanne	%	4,0%	5,9%		2,4%	0,4%	1,6%	0,8%	66,6%	0,4%	0,4%	10,1%	4,5%	2,8%	100,0%
Waldmeister-Buchewald, z.T. mit Tanne	%		16,7%						66,7%					16,7%	100,0%
Fichten-Buchewald	%		4,5%		2,3%		0,8%	0,8%	88,6%			0,8%	2,3%		100,0%
Buchenwälder	%	3,2%	5,7%		2,4%	0,3%	1,4%	0,8%	71,2%	0,3%	0,3%	8,1%	4,0%	2,4%	100,0%
Buchen-Traubeneichenwald	%		50,0%						16,7%			33,3%			100,0%
Birken-Stieleichenwald	%	2,8%	5,6%		8,3%				25,0%			52,8%	2,8%	2,8%	100,0%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	2,7%			4,1%	1,4%	1,4%		9,5%			74,3%	2,7%	4,1%	100,0%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%	20,8%	1,9%		7,5%	1,9%		3,8%	26,4%			32,1%	5,7%		100,0%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	30,4%	8,9%		5,4%	1,8%	1,8%	7,1%	8,9%			30,4%	3,6%	1,8%	100,0%
Eichenwälder	%	13,8%	4,9%		5,8%	1,3%	0,9%	2,7%	16,0%			48,9%	3,6%	2,2%	100,0%
Bergreitgras-Fichtenwald	%		3,3%				1,7%		91,7%			3,3%			100,0%
Nadelwälder	%		3,3%				1,7%		91,7%			3,3%			100,0%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%				33,3%				66,7%						100,0%
Bach-Eschenwälder	%								100,0%						100,0%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%	16,7%				16,7%	16,7%	33,3%						16,7%	100,0%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%			33,3%	33,3%	33,3%									100,0%
Rauschbeeren-Moorwälder	%				20,0%				60,0%			20,0%			100,0%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	%	3,7%		3,7%	14,8%	7,4%	3,7%	7,4%	48,1%			7,4%		3,7%	100,0%
Ahorn-Eschenwald	%							100,0%							100,0%
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%		50,0%					50,0%							100,0%
sonstige azonale Waldgesellschaften	%		33,3%					66,7%							100,0%
alle natürliche Waldgesellschaften	%	5,5%	5,3%	0,1%	3,4%	0,7%	1,4%	1,6%	58,5%	0,2%	0,2%	17,4%	3,5%	2,2%	100,0%

1.05.24 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl, L343of_2012_L344)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	2.591	399	399	1.794		997	598	18.538	199	199	4.385	797	399	31.295
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]		199	199					797					199	1.395
Fichten-Buchenwald	[ha]		199		598	199			2.591						3.588
Buchenwälder	[ha]	2.591	797	598	2.392	199	997	598	21.926	199	199	4.385	797	598	36.278
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]													199	199
Birken-Stieleichenwald	[ha]					199		199				997			1.395
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	199							199			3.189			3.588
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]	199	399		199			797				797			2.392
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	1.794	598	199				598	399			399		199	4.186
Eichenwälder	[ha]	2.193	997	199	199	199		1.595	598			5.382		399	11.760
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]								1.395						1.395
Nadelwälder	[ha]								1.395						1.395
Bach-Eschenwälder	[ha]				199				399					199	797
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]	199					399	399						199	1.196
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]					399	199					199			797
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	[ha]	199			199	399	598	399	399			199		399	2.791
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]							199							199
sonstige azonale Waldgesellschaften	[ha]							199							199
alle natürliche Waldgesellschaften	[ha]	4.983	1.794	797	2.791	797	1.595	2.791	24.318	199	199	9.966	797	1.395	52.424

1.05.24 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	13	2	2	9		5	3	93	1	1	22	4	2	157
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek		1	1					4					1	7
Fichten-Buchenwald	Sek		1		3	1			13						18
Buchenwälder	Sek	13	4	3	12	1	5	3	110	1	1	22	4	3	182
Buchen-Traubeneichenwald	Sek													1	1
Birken-Stieleichenwald	Sek					1		1				5			7
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	1							1			16			18
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek	1	2		1			4				4			12
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	9	3	1				3	2			2		1	21
Eichenwälder	Sek	11	5	1	1	1		8	3			27		2	59
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek								7						7
Nadelwälder	Sek								7						7
Bach-Eschenwälder	Sek				1				2					1	4
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek	1					2	2						1	6
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek					2	1					1			4
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	Sek	1			1	2	3	2	2			1		2	14
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek							1							1
sonstige azonale Waldgesellschaften	Sek							1							1
alle natürliche Waldgesellschaften	Sek	25	9	4	14	4	8	14	122	1	1	50	4	7	263

1.05.24 Waldfläche [SE68%±] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-35,2%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-36,8%		+/-52,9%	+/-57,7%	+/-16,6%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-32,7%	+/-50,0%	+/-70,7%	+/-13,3%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%					+/-61,2%					+/-100,0%	+/-55,3%
Fichten-Buchenwald	SE[%]		+/-100,0%		+/-74,5%	+/-100,0%			+/-42,8%						+/-37,6%
Buchenwälder	SE[%]	+/-35,2%	+/-50,0%	+/-57,7%	+/-33,3%	+/-100,0%	+/-52,9%	+/-57,7%	+/-15,5%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-32,7%	+/-50,0%	+/-57,7%	+/-12,5%
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]													+/-100,0%	+/-100,0%
Birken-Stieleichenwald	SE[%]					+/-100,0%		+/-100,0%				+/-66,3%			+/-62,2%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-100,0%							+/-100,0%			+/-37,5%			+/-34,2%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-70,7%		+/-100,0%			+/-79,0%				+/-61,2%			+/-39,0%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-33,3%	+/-57,7%	+/-100,0%				+/-57,7%	+/-70,7%			+/-70,7%		+/-100,0%	+/-27,3%
Eichenwälder	SE[%]	+/-30,1%	+/-44,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%		+/-46,7%	+/-57,7%			+/-28,4%		+/-70,7%	+/-18,4%
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]								+/-62,2%						+/-62,2%
Nadelwälder	SE[%]								+/-62,2%						+/-62,2%
Bach-Eschenwälder	SE[%]				+/-100,0%				+/-70,7%					+/-100,0%	+/-50,0%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]	+/-100,0%					+/-70,7%	+/-100,0%						+/-100,0%	+/-57,7%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]					+/-70,7%	+/-100,0%					+/-100,0%			+/-50,0%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-70,7%			+/-100,0%		+/-70,7%	+/-31,9%
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]							+/-100,0%							+/-100,0%
sonstige azonale Waldgesellschaften	SE[%]							+/-100,0%							+/-100,0%
alle natürliche Waldgesellschaften	SE[%]	+/-23,6%	+/-33,3%	+/-50,0%	+/-30,2%	+/-50,0%	+/-39,5%	+/-34,9%	+/-14,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-21,3%	+/-50,0%	+/-37,7%	+/-10,1%

1.05.24 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1J1_L343of_2012_L344)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	8,3%	1,3%	1,3%	5,7%		3,2%	1,9%	59,2%	0,6%	0,6%	14,0%	2,5%	1,3%	100,0%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%		14,3%	14,3%					57,1%					14,3%	100,0%
Fichten-Buchenwald	%		5,6%		16,7%	5,6%			72,2%						100,0%
Buchenwälder	%	7,1%	2,2%	1,6%	6,6%	0,5%	2,7%	1,6%	60,4%	0,5%	0,5%	12,1%	2,2%	1,6%	100,0%
Buchen-Traubeneichenwald	%													100,0%	100,0%
Birken-Stieleichenwald	%					14,3%		14,3%				71,4%			100,0%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	5,6%							5,6%			88,9%			100,0%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%	8,3%	16,7%		8,3%			33,3%				33,3%			100,0%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	42,9%	14,3%	4,8%				14,3%	9,5%			9,5%		4,8%	100,0%
Eichenwälder	%	18,6%	8,5%	1,7%	1,7%	1,7%		13,6%	5,1%			45,8%		3,4%	100,0%
Bergreitgras-Fichtenwald	%								100,0%						100,0%
Nadelwälder	%								100,0%						100,0%
Bach-Eschenwälder	%				25,0%				50,0%					25,0%	100,0%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%	16,7%					33,3%	33,3%						16,7%	100,0%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%					50,0%	25,0%					25,0%			100,0%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	%	7,1%			7,1%	14,3%	21,4%	14,3%	14,3%			7,1%		14,3%	100,0%
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%							100,0%							100,0%
sonstige azonale Waldgesellschaften	%							100,0%							100,0%
alle natürliche Waldgesellschaften	%	9,5%	3,4%	1,5%	5,3%	1,5%	3,0%	5,3%	46,4%	0,4%	0,4%	19,0%	1,5%	2,7%	100,0%

1.05.24 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	7.176	4.784	997	5.781	1.196	2.990	2.392	41.859			13.156	3.389	2.990	86.708
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	1.196	199	199		199		598	3.787			199			6.379
Fichten-Buchenwald	[ha]				598		399		3.588						4.585
Buchenwälder	[ha]	8.372	4.983	1.196	6.379	1.395	3.389	2.990	49.234			13.355	3.389	2.990	97.671
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]								797			199			997
Birken-Stieleichenwald	[ha]	598			1.395	797		199	1.196		199	8.173	199	797	13.554
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	1.196	199		2.791		997	1.196			199	43.254	199	399	50.430
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]	4.186		399	4.186	797	199	1.196	1.993			5.183	199		18.338
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	9.169	598	399	2.193		797	2.791	1.196			15.149	797	997	34.085
Eichenwälder	[ha]	15.149	797	797	10.564	1.595	1.993	5.382	5.183		399	71.958	1.395	2.193	117.405
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]								3.189						3.189
Nadelwälder	[ha]								3.189						3.189
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	[ha]		199			199								199	598
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]					598	199		199						997
Bach-Eschenwälder	[ha]			199		399		399	399					199	1.595
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]						199	399						199	797
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]	199			199	1.395			199			199			2.193
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]				399				598			199		199	1.395
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	[ha]	199	199	199	598	2.591	399	797	1.395			399		797	7.575
Ahorn-Eschenwald	[ha]							399						199	598
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]	598		199				797				199			1.794
sonstige azonale Waldgesellschaften	[ha]	598		199				1.196				199		199	2.392
alle natürliche Waldgesellschaften	[ha]	24.318	5.980	2.392	17.541	5.581	5.781	10.365	59.001		399	85.911	4.784	6.179	228.232

1.05.24 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	36	24	5	29	6	15	12	210			66	17	15	435
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	6	1	1		1		3	19			1			32
Fichten-Buchenwald	Sek				3		2		18						23
Buchenwälder	Sek	42	25	6	32	7	17	15	247			67	17	15	490
Buchen-Traubeneichenwald	Sek								4			1			5
Birken-Stieleichenwald	Sek	3			7	4		1	6		1	41	1	4	68
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	6	1		14		5	6			1	217	1	2	253
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek	21		2	21	4	1	6	10			26	1		92
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	46	3	2	11		4	14	6			76	4	5	171
Eichenwälder	Sek	76	4	4	53	8	10	27	26		2	361	7	11	589
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek								16						16
Nadelwälder	Sek								16						16
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	Sek		1			1								1	3
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek					3	1		1						5
Bach-Eschenwälder	Sek			1		2		2	2					1	8
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek						1	2						1	4
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek	1			1	7			1			1			11
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek				2				3			1		1	7
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	Sek	1	1	1	3	13	2	4	7			2		4	38
Ahorn-Eschenwald	Sek							2						1	3
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek	3		1				4				1			9
sonstige azonale Waldgesellschaften	Sek	3		1				6				1		1	12
alle natürliche Waldgesellschaften	Sek	122	30	12	88	28	29	52	296		2	431	24	31	1.145

1.05.24 Waldfläche [SE68%±] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI, L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-18,3%	+/-26,9%	+/-52,9%	+/-18,5%	+/-40,8%	+/-27,4%	+/-28,8%	+/-9,9%			+/-16,9%	+/-26,9%	+/-25,7%	+/-7,3%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-47,1%	+/-100,0%	+/-100,0%		+/-100,0%		+/-57,7%	+/-36,8%			+/-100,0%			+/-26,1%
Fichten-Buchenwald	SE[%]				+/-74,5%		+/-70,7%		+/-31,4%						+/-29,1%
Buchенwälder	SE[%]	+/-17,0%	+/-26,2%	+/-47,1%	+/-18,1%	+/-37,7%	+/-25,6%	+/-25,7%	+/-9,2%			+/-16,7%	+/-26,9%	+/-25,7%	+/-6,8%
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]								+/-100,0%			+/-100,0%			+/-82,5%
Birken-Stieleichenwald	SE[%]	+/-57,7%			+/-42,8%	+/-50,0%		+/-100,0%	+/-40,8%		+/-100,0%	+/-21,0%	+/-100,0%	+/-50,0%	+/-18,5%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-40,8%	+/-100,0%		+/-30,2%		+/-52,9%	+/-70,7%			+/-100,0%	+/-11,3%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-10,5%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]	+/-25,6%		+/-70,7%	+/-28,9%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-47,1%	+/-44,7%			+/-29,2%	+/-100,0%		+/-16,3%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-17,8%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-30,1%		+/-50,0%	+/-28,5%	+/-52,7%			+/-18,1%	+/-61,2%	+/-44,7%	+/-11,2%
Eichenwälder	SE[%]	+/-13,4%	+/-50,0%	+/-50,0%	+/-16,4%	+/-35,3%	+/-34,6%	+/-24,2%	+/-27,7%		+/-70,7%	+/-8,7%	+/-42,8%	+/-30,1%	+/-6,7%
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]								+/-40,5%						+/-40,5%
Nadelwälder	SE[%]								+/-40,5%						+/-40,5%
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	SE[%]		+/-100,0%			+/-100,0%								+/-100,0%	+/-57,7%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]					+/-57,7%	+/-100,0%		+/-100,0%						+/-44,7%
Bach-Eschenwälder	SE[%]			+/-100,0%		+/-70,7%		+/-70,7%	+/-100,0%					+/-100,0%	+/-43,3%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]						+/-100,0%	+/-70,7%						+/-100,0%	+/-61,2%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-42,8%			+/-100,0%			+/-100,0%			+/-37,4%
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]				+/-100,0%				+/-100,0%			+/-100,0%		+/-100,0%	+/-55,3%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-74,5%	+/-29,7%	+/-70,7%	+/-50,0%	+/-55,3%			+/-70,7%		+/-50,0%	+/-19,9%
Ahorn-Eschenwald	SE[%]							+/-70,7%						+/-100,0%	+/-57,7%
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]	+/-57,7%		+/-100,0%				+/-50,0%				+/-100,0%			+/-43,0%
sonstige azonale Waldgesellschaften	SE[%]	+/-57,7%		+/-100,0%				+/-40,8%				+/-100,0%		+/-100,0%	+/-35,3%
alle natürliche Waldgesellschaften	SE[%]	+/-10,6%	+/-23,0%	+/-31,1%	+/-12,1%	+/-19,5%	+/-19,7%	+/-16,0%	+/-8,6%		+/-70,7%	+/-7,8%	+/-22,7%	+/-18,4%	+/-4,5%

1.05.24 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp der Hauptbestockung															
Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L343of_2012_L344)															
natürliche Waldgesellschaft	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	8,3%	5,5%	1,1%	6,7%	1,4%	3,4%	2,8%	48,3%			15,2%	3,9%	3,4%	100,0%
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	18,8%	3,1%	3,1%		3,1%		9,4%	59,4%			3,1%			100,0%
Fichten-Buchenwald	%				13,0%		8,7%		78,3%						100,0%
Buchenwälder	%	8,6%	5,1%	1,2%	6,5%	1,4%	3,5%	3,1%	50,4%			13,7%	3,5%	3,1%	100,0%
Buchen-Traubeneichenwald	%								80,0%			20,0%			100,0%
Birken-Stieleichenwald	%	4,4%			10,3%	5,9%		1,5%	8,8%		1,5%	60,3%	1,5%	5,9%	100,0%
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	2,4%	0,4%		5,5%		2,0%	2,4%			0,4%	85,8%	0,4%	0,8%	100,0%
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%	22,8%		2,2%	22,8%	4,3%	1,1%	6,5%	10,9%			28,3%	1,1%		100,0%
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	26,9%	1,8%	1,2%	6,4%		2,3%	8,2%	3,5%			44,4%	2,3%	2,9%	100,0%
Eichenwälder	%	12,9%	0,7%	0,7%	9,0%	1,4%	1,7%	4,6%	4,4%		0,3%	61,3%	1,2%	1,9%	100,0%
Bergreitgras-Fichtenwald	%								100,0%						100,0%
Nadelwälder	%								100,0%						100,0%
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	%		33,3%			33,3%								33,3%	100,0%
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%					60,0%	20,0%		20,0%						100,0%
Bach-Eschenwälder	%			12,5%		25,0%		25,0%	25,0%					12,5%	100,0%
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%						25,0%	50,0%						25,0%	100,0%
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%	9,1%			9,1%	63,6%			9,1%			9,1%			100,0%
Rauschbeeren-Moorwälder	%				28,6%				42,9%			14,3%		14,3%	100,0%
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	%	2,6%	2,6%	2,6%	7,9%	34,2%	5,3%	10,5%	18,4%			5,3%		10,5%	100,0%
Ahorn-Eschenwald	%							66,7%						33,3%	100,0%
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%	33,3%		11,1%				44,4%				11,1%			100,0%
sonstige azonale Waldgesellschaften	%	25,0%		8,3%				50,0%				8,3%		8,3%	100,0%
alle natürliche Waldgesellschaften	%	10,7%	2,6%	1,0%	7,7%	2,4%	2,5%	4,5%	25,9%		0,2%	37,6%	2,1%	2,7%	100,0%