

1.07.05 Vorrat [1000 m³] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideeller Flächenbezug (gemäß Standflächenanteil) (7721Jl_L289of_2012_bi / 2014-7-1 14:5:57.247)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	[1000 m³]	107.935	36.667	138.507	57.333	3.709	95	0	0	0	0	344.246
Buche	[1000 m³]	72.061	42.908	229.478	163.332	59.536	18.611	9.605	1.620	262	0	597.415
andere Lb hoher Lebensdauer	[1000 m³]	39.620	22.673	64.682	41.699	15.001	4.114	1.194	462	117	20	189.583
andere Lb niedriger Lebensdauer	[1000 m³]	103.654	23.229	39.606	33.315	7.541	1.311	152	16	7	0	208.831
alle Laubbäume	[1000 m³]	323.270	125.478	472.274	295.680	85.787	24.132	10.951	2.098	386	20	1.340.075
Fichte	[1000 m³]	62.869	20.295	221.221	501.088	236.748	79.551	41.350	13.371	3.537	1.082	1.181.114
Tanne	[1000 m³]	2.610	119	6.570	29.552	30.267	13.393	4.884	1.423	287	19	89.125
Douglasie	[1000 m³]	13.106	3.418	29.486	20.302	4.318	401	50	0	0	0	71.080
Kiefer	[1000 m³]	386.608	100.594	126.519	128.894	11.676	2.754	314	124	0	29	757.511
Lärche	[1000 m³]	24.826	8.548	35.581	24.950	5.022	921	176	33	53	0	100.110
alle Nadelbäume	[1000 m³]	490.020	132.975	419.377	704.786	288.030	97.020	46.774	14.951	3.877	1.130	2.198.940
alle Baumarten	[1000 m³]	813.289	258.452	891.651	1.000.466	373.817	121.152	57.725	17.049	4.263	1.151	3.539.015

1.07.05 Vorrat [Sek] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideeller Flächenbezug (gemäß Standflächenanteil) (7721Jl_L289of_2012_bi / 2014-7-1 14:57:247)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	Sek	3.242	1.083	4.645	2.364	242	11	0	0	0	0	11.587
Buche	Sek	2.218	844	5.624	4.599	1.885	566	247	36	6	0	16.025
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1.730	925	2.846	1.857	846	207	65	29	6	2	8.513
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	3.919	994	2.027	1.763	387	100	21	4	1	0	9.216
alle Laubbäume	Sek	7.718	2.593	9.762	7.489	2.572	730	288	50	10	2	31.214
Fichte	Sek	1.863	366	3.752	7.477	3.955	1.476	572	134	38	7	19.640
Tanne	Sek	97	8	276	1.076	954	501	162	47	9	1	3.131
Douglasie	Sek	397	97	896	674	199	29	5	0	0	0	2.297
Kiefer	Sek	7.617	2.040	3.005	2.698	548	201	21	3	0	1	16.134
Lärche	Sek	872	216	1.209	1.012	227	53	9	1	3	0	3.602
alle Nadelbäume	Sek	9.595	2.479	7.102	9.611	4.443	1.622	594	138	40	8	35.632
alle Baumarten	Sek	14.637	4.243	13.032	13.100	5.484	1.781	642	141	41	8	53.109

1.07.05 Vorrat [SE68±%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideeller Flächenbezug (gemäß Standflächenanteil) (7721Jl_L289of_2012_bi / 2014-7-1 14:57:247)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	SE[±%]	±3,6%	±6,1%	±3,0%	±4,3%	±14,1%	±43,9%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±1,9%
Buche	SE[±%]	±4,4%	±7,8%	±3,1%	±3,3%	±5,3%	±10,8%	±15,8%	±32,8%	±57,5%	±0,0%	±1,7%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[±%]	±4,8%	±6,8%	±3,8%	±4,6%	±7,5%	±14,3%	±21,1%	±28,9%	±42,9%	±70,8%	±2,2%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[±%]	±3,6%	±6,2%	±4,6%	±4,8%	±12,6%	±19,5%	±30,2%	±62,4%	±100,0%	±0,0%	±2,3%
alle Laubbäume	SE[± %]	±2,4%	±4,4%	±2,2%	±2,5%	±4,7%	±9,4%	±14,8%	±30,4%	±48,8%	±70,8%	±1,2%
Fichte	SE[±%]	±4,3%	±10,3%	±3,5%	±2,5%	±3,6%	±6,2%	±10,4%	±19,1%	±28,9%	±69,9%	±1,5%
Tanne	SE[±%]	±23,1%	±52,5%	±10,6%	±6,1%	±6,8%	±10,7%	±17,7%	±26,8%	±60,4%	±100,0%	±3,7%
Douglasie	SE[±%]	±9,0%	±14,8%	±6,2%	±7,0%	±12,9%	±27,4%	±63,5%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±3,8%
Kiefer	SE[±%]	±2,4%	±4,9%	±3,9%	±4,2%	±8,7%	±12,1%	±32,8%	±100,0%	±0,0%	±100,0%	±1,6%
Lärche	SE[±%]	±5,8%	±12,5%	±5,3%	±5,8%	±12,7%	±26,1%	±56,3%	±100,0%	±84,7%	±0,0%	±3,0%
alle Nadelbäume	SE[± %]	±2,1%	±4,4%	±2,6%	±2,2%	±3,4%	±5,9%	±10,2%	±18,8%	±28,5%	±68,5%	±1,1%
alle Baumarten	SE[±%]	±1,7%	±3,4%	±1,9%	±1,9%	±3,1%	±5,7%	±9,8%	±18,5%	±28,6%	±68,4%	±0,8%

1.07.05 Vorrat [%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideeller Flächenbezug (gemäß Standflächenanteil) (7721Jl_L289of_2012_bi / 2014-7-1 14:5:57.247)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	%	31,4%	10,7%	40,2%	16,7%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	12,1%	7,2%	38,4%	27,3%	10,0%	3,1%	1,6%	0,3%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	20,9%	12,0%	34,1%	22,0%	7,9%	2,2%	0,6%	0,2%	0,1%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	49,6%	11,1%	19,0%	16,0%	3,6%	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	24,1%	9,4%	35,2%	22,1%	6,4%	1,8%	0,8%	0,2%	0,0%	0,0%	100,0%
Fichte	%	5,3%	1,7%	18,7%	42,4%	20,0%	6,7%	3,5%	1,1%	0,3%	0,1%	100,0%
Tanne	%	2,9%	0,1%	7,4%	33,2%	34,0%	15,0%	5,5%	1,6%	0,3%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	18,4%	4,8%	41,5%	28,6%	6,1%	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	51,0%	13,3%	16,7%	17,0%	1,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	24,8%	8,5%	35,5%	24,9%	5,0%	0,9%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	22,3%	6,0%	19,1%	32,1%	13,1%	4,4%	2,1%	0,7%	0,2%	0,1%	100,0%
alle Baumarten	%	23,0%	7,3%	25,2%	28,3%	10,6%	3,4%	1,6%	0,5%	0,1%	0,0%	100,0%

1.07.05 Vorrat [1000 m³] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideeller Flächenbezug (gemäß Standflächenanteil) (7721Jl_L289of_2012_bi / 2014-7-1 14:57:247)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	[1000 m³]	277	4.801	6.239	1.765	0	0	0	0	0	0	13.082
Buche	[1000 m³]	27	1.467	3.342	1.619	1.692	0	0	0	0	0	8.147
andere Lb hoher Lebensdauer	[1000 m³]	162	1.636	3.351	549	102	0	0	0	0	0	5.800
andere Lb niedriger Lebensdauer	[1000 m³]	161	5.422	4.170	2.115	752	24	0	0	0	0	12.644
alle Laubbäume	[1000 m³]	628	13.326	17.101	6.048	2.546	24	0	0	0	0	39.673
Fichte	[1000 m³]		1.990	15.259	22.898	24.414	4.284	162	0	0	0	69.008
Tanne	[1000 m³]			16	0	13	0	0	0	0	0	29
Douglasie	[1000 m³]		55	28	52	59	0	0	0	0	0	195
Kiefer	[1000 m³]	3.267	27.028	5.433	2.833	447	0	0	0	0	0	39.008
Lärche	[1000 m³]	6	473	2.042	1.565	1.143	46	0	0	0	0	5.275
alle Nadelbäume	[1000 m³]	3.273	29.546	22.778	27.349	26.076	4.331	162	0	0	0	113.514
alle Baumarten	[1000 m³]	3.901	42.872	39.879	33.397	28.622	4.355	162	0	0	0	153.188

1.07.05 Vorrat [Sek] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideeller Flächenbezug (gemäß Standflächenanteil) (77Z1Jl_L289of_2012_bi / 2014-7-1 14:57.247)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	Sek	12	143	185	56	0	0	0	0	0	0	396
Buche	Sek	1	44	96	54	33	0	0	0	0	0	228
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	8	63	84	26	8	0	0	0	0	0	189
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	13	236	181	95	48	3	0	0	0	0	576
alle Laubbäume	Sek	22	360	359	179	83	3	0	0	0	0	1.006
Fichte	Sek		59	274	362	340	54	4	0	0	0	1.093
Tanne	Sek			1	0	2	0	0	0	0	0	3
Douglasie	Sek		1	2	2	2	0	0	0	0	0	7
Kiefer	Sek	63	618	152	98	23	0	0	0	0	0	954
Lärche	Sek	1	21	74	62	39	2	0	0	0	0	199
alle Nadelbäume	Sek	64	652	380	403	355	54	4	0	0	0	1.912
alle Baumarten	Sek	79	819	564	467	381	54	4	0	0	0	2.368

1.07.05 Vorrat [SE68±%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideeller Flächenbezug (gemäß Standflächenanteil) (7721Jl_L289of_2012_bi / 2014-7-1 14:57.247)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	SE[±%]	±50,2%	±13,6%	±12,6%	±20,3%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±8,2%
Buche	SE[±%]	±100,0%	±25,8%	±16,7%	±23,1%	±29,6%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±11,1%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[±%]	±54,5%	±19,7%	±19,4%	±27,1%	±46,6%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±12,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[±%]	±35,5%	±11,1%	±12,6%	±15,1%	±21,5%	±67,7%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±6,7%
alle Laubbäume	SE[±%]	±38,7%	±9,6%	±9,5%	±12,1%	±21,1%	±67,7%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±5,5%
Fichte	SE[±%]		±24,6%	±10,9%	±9,4%	±10,5%	±27,7%	±100,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±5,5%
Tanne	SE[±%]			±100,0%	±0,0%	±73,3%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±64,8%
Douglasie	SE[±%]		±100,0%	±80,8%	±85,9%	±96,7%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±48,2%
Kiefer	SE[±%]	±23,7%	±7,5%	±14,1%	±17,2%	±31,5%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±5,9%
Lärche	SE[±%]	±100,0%	±29,9%	±17,4%	±19,1%	±24,9%	±86,3%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±10,5%
alle Nadelbäume	SE[±%]	±23,7%	±7,4%	±9,4%	±8,9%	±10,4%	±27,8%	±100,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±4,0%
alle Baumarten	SE[±%]	±21,6%	±6,4%	±7,4%	±8,2%	±10,1%	±27,8%	±100,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±3,4%

1.07.05 Vorrat [%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideeller Flächenbezug (gemäß Standflächenanteil) (7721Jl_L289of_2012_bi / 2014-7-1 14:5:57.247)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	%	2,1%	36,7%	47,7%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	0,3%	18,0%	41,0%	19,9%	20,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	2,8%	28,2%	57,8%	9,5%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	1,3%	42,9%	33,0%	16,7%	6,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	1,6%	33,6%	43,1%	15,2%	6,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Fichte	%		2,9%	22,1%	33,2%	35,4%	6,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Tanne	%			56,3%	0,0%	43,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%		28,1%	14,5%	26,9%	30,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	8,4%	69,3%	13,9%	7,3%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	0,1%	9,0%	38,7%	29,7%	21,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	2,9%	26,0%	20,1%	24,1%	23,0%	3,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	2,5%	28,0%	26,0%	21,8%	18,7%	2,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%