

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[m³/ha]	5	18	3	0	0	0	0	0	0	0	27
21 - 40 Jahre	[m³/ha]	7	89	78	26	6	1	0	0	0	0	208
41 - 60 Jahre	[m³/ha]	1	44	128	112	43	11	3	1	0	1	343
61 - 80 Jahre	[m³/ha]	0	20	93	139	86	29	7	3	1	1	379
81 - 100 Jahre	[m³/ha]	0	8	61	142	128	61	21	6	2	1	430
101 - 120 Jahre	[m³/ha]	0	4	36	114	144	90	39	12	4	2	445
121 - 140 Jahre	[m³/ha]	0	2	22	82	130	110	61	26	9	4	447
141 - 160 Jahre	[m³/ha]		1	12	54	108	121	85	40	16	11	448
> 160 Jahre	[m³/ha]		0	6	24	69	106	93	69	40	38	445
alle Baumaltersklassen	[m³/ha]	2	29	68	89	71	40	19	8	4	3	333

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Jahr=2012 ; <i>Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)</i>												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	1642	1991	387	31	10	3	2	2	0	1	2730
21 - 40 Jahre	Sek	2538	8275	6753	2667	698	162	38	13	13	7	10701
41 - 60 Jahre	Sek	488	6428	11431	10049	5079	1614	450	143	59	51	15175
61 - 80 Jahre	Sek	139	2887	7759	9343	6681	2899	932	285	94	74	12980
81 - 100 Jahre	Sek	26	1030	4374	7114	6824	4091	1670	538	167	88	10530
101 - 120 Jahre	Sek	5	386	2176	4743	5700	4392	2344	853	274	129	8323
121 - 140 Jahre	Sek	2	131	909	2358	3469	3324	2211	1057	397	162	5744
141 - 160 Jahre	Sek		38	357	1091	1963	2251	1848	1053	506	268	3954
> 160 Jahre	Sek		23	140	448	1028	1505	1505	1179	770	658	3062
alle Baumaltersklassen	Sek	4808	20487	32148	34626	28683	18696	10381	4930	2229	1398	53109

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	3	4	9	26	34	66	73	75	0	100	3
21 - 40 Jahre	SE[%]	3	1	2	3	6	12	22	42	34	46	1
41 - 60 Jahre	SE[%]	6	2	1	1	2	4	7	13	17	25	1
61 - 80 Jahre	SE[%]	11	3	1	1	2	3	5	9	15	20	1
81 - 100 Jahre	SE[%]	26	5	2	1	1	2	4	6	12	16	1
101 - 120 Jahre	SE[%]	62	7	3	2	1	2	3	5	8	12	1
121 - 140 Jahre	SE[%]	88	11	5	3	2	2	3	4	7	11	1
141 - 160 Jahre	SE[%]		20	7	4	3	2	3	4	6	11	1
> 160 Jahre	SE[%]		28	14	7	4	3	3	4	5	6	1
alle Baumaltersklassen	SE[%]	2	1	1	1	1	1	2	2	3	4	0

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	20	67	11	1	0	0	0	0	0	0	100
21 - 40 Jahre	%	3	43	38	13	3	1	0	0	0	0	100
41 - 60 Jahre	%	0	13	37	33	12	3	1	0	0	0	100
61 - 80 Jahre	%	0	5	25	37	23	8	2	1	0	0	100
81 - 100 Jahre	%	0	2	14	33	30	14	5	1	0	0	100
101 - 120 Jahre	%	0	1	8	26	32	20	9	3	1	0	100
121 - 140 Jahre	%	0	0	5	18	29	25	14	6	2	1	100
141 - 160 Jahre	%		0	3	12	24	27	19	9	4	3	100
> 160 Jahre	%		0	1	5	15	24	21	16	9	8	100
alle Baumaltersklassen	%	1	9	20	27	21	12	6	3	1	1	100

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[m³/ha]	5	27	6	0	0	0	0	0	0	0	38
21 - 40 Jahre	[m³/ha]	7	99	79	18	2	0	0	0	0	0	205
41 - 60 Jahre	[m³/ha]	1	45	125	113	35	7	1	0	0	0	328
61 - 80 Jahre	[m³/ha]	0	24	103	130	67	20	4	3	1	0	352
81 - 100 Jahre	[m³/ha]		6	64	142	120	43	11	3	0	0	389
101 - 120 Jahre	[m³/ha]		4	49	131	143	81	26	7	4	1	445
121 - 140 Jahre	[m³/ha]		3	34	88	114	91	47	17	10	5	408
141 - 160 Jahre	[m³/ha]		1	37	91	82	79	64	57	22	13	446
> 160 Jahre	[m³/ha]			2	31	69	58	82	80	58	91	470
alle Baumaltersklassen	[m³/ha]	2	36	77	91	60	27	10	5	2	2	312

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	65	96	24	0	0	0	0	0	0	0	116
21 - 40 Jahre	Sek	131	460	345	102	12	4	3	1	0	0	550
41 - 60 Jahre	Sek	21	345	598	462	218	57	9	2	1	0	721
61 - 80 Jahre	Sek	2	141	329	380	225	94	22	9	1	2	484
81 - 100 Jahre	Sek		47	257	389	359	187	60	13	3	2	502
101 - 120 Jahre	Sek		20	122	222	213	151	65	17	11	2	310
121 - 140 Jahre	Sek		10	50	106	126	96	70	27	12	6	201
141 - 160 Jahre	Sek		2	19	32	34	35	28	25	14	9	90
> 160 Jahre	Sek			1	7	13	15	17	17	18	20	59
alle Baumaltersklassen	Sek	218	1074	1653	1600	1138	612	267	109	59	41	2368

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	13	12	26	0	0	0	0	0	0	0	12
21 - 40 Jahre	SE[%]	11	4	5	12	36	50	59	100	0	0	3
41 - 60 Jahre	SE[%]	25	6	3	5	8	15	36	71	100	0	2
61 - 80 Jahre	SE[%]	78	9	5	4	7	11	22	37	100	71	3
81 - 100 Jahre	SE[%]		19	6	4	5	8	14	31	66	78	2
101 - 120 Jahre	SE[%]		27	9	5	6	10	14	26	34	74	4
121 - 140 Jahre	SE[%]		33	18	10	8	11	14	21	41	43	4
141 - 160 Jahre	SE[%]		71	27	22	17	21	20	23	32	34	7
> 160 Jahre	SE[%]			93	41	26	29	26	26	27	28	10
alle Baumaltersklassen	SE[%]	9	4	3	3	4	5	8	12	17	19	2

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	14	70	16	0	0	0	0	0	0	0	100
21 - 40 Jahre	%	3	48	38	9	1	0	0	0	0	0	100
41 - 60 Jahre	%	0	14	38	34	11	2	0	0	0	0	100
61 - 80 Jahre	%	0	7	29	37	19	6	1	1	0	0	100
81 - 100 Jahre	%		2	16	37	31	11	3	1	0	0	100
101 - 120 Jahre	%		1	11	29	32	18	6	2	1	0	100
121 - 140 Jahre	%		1	8	22	28	22	12	4	2	1	100
141 - 160 Jahre	%		0	8	20	18	18	14	13	5	3	100
> 160 Jahre	%			0	7	15	12	17	17	12	19	100
alle Baumaltersklassen	%	1	12	25	29	19	9	3	1	1	1	100

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[m³/ha]	4	35	4	0	0	0	0	0	0	0	44
21 - 40 Jahre	[m³/ha]	15	94	36	4	0	0	0	0	0	0	148
41 - 60 Jahre	[m³/ha]	0	39	104	79	16	2	0	0	0	0	240
61 - 80 Jahre	[m³/ha]		27	102	83	17	13	2	0	0	0	243
81 - 100 Jahre	[m³/ha]		2	88	101	43	6	3	0	0	0	242
101 - 120 Jahre	[m³/ha]		4	76	82	57	0	0	0	0	0	219
121 - 140 Jahre	[m³/ha]		6	51	116	63	29	9	10	0	11	294
141 - 160 Jahre	[m³/ha]			108	187	100	0	0	0	0	0	395
> 160 Jahre	[m³/ha]				19	62	0	0	35	0	31	147
alle Baumaltersklassen	[m³/ha]	3	36	69	61	22	6	1	2	0	2	202

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JI_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	5	11	3	0	0	0	0	0	0	0	14
21 - 40 Jahre	Sek	9	32	13	2	0	0	0	0	0	0	37
41 - 60 Jahre	Sek	1	16	33	13	8	1	0	0	0	0	35
61 - 80 Jahre	Sek		15	26	25	7	4	1	0	0	0	33
81 - 100 Jahre	Sek		1	13	14	7	2	1	0	0	0	19
101 - 120 Jahre	Sek		1	6	8	5	0	0	0	0	0	10
121 - 140 Jahre	Sek		2	5	9	6	2	1	1	0	1	12
141 - 160 Jahre	Sek			2	3	3	0	0	0	0	0	4
> 160 Jahre	Sek				2	3	0	0	1	0	1	5
alle Baumaltersklassen	Sek	15	76	96	74	39	9	3	2	0	2	146

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	37	33	48	0	0	0	0	0	0	0	28
21 - 40 Jahre	SE[%]	46	16	28	66	0	0	0	0	0	0	11
41 - 60 Jahre	SE[%]	98	29	10	39	44	90	0	0	0	0	16
61 - 80 Jahre	SE[%]		24	13	13	47	48	100	0	0	0	8
81 - 100 Jahre	SE[%]		100	25	24	39	74	100	0	0	0	9
101 - 120 Jahre	SE[%]		94	38	14	45	0	0	0	0	0	10
121 - 140 Jahre	SE[%]		58	44	19	48	65	93	96	0	96	17
141 - 160 Jahre	SE[%]			32	30	43	0	0	0	0	0	19
> 160 Jahre	SE[%]				53	27	0	0	101	0	112	22
alle Baumaltersklassen	SE[%]	42	13	11	14	23	34	58	69	0	99	7

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	10	80	10	0	0	0	0	0	0	0	100
21 - 40 Jahre	%	10	64	24	2	0	0	0	0	0	0	100
41 - 60 Jahre	%	0	16	43	33	7	1	0	0	0	0	100
61 - 80 Jahre	%		11	42	34	7	5	1	0	0	0	100
81 - 100 Jahre	%		1	36	42	18	3	1	0	0	0	100
101 - 120 Jahre	%		2	35	38	26	0	0	0	0	0	100
121 - 140 Jahre	%		2	17	39	21	10	3	3	0	4	100
141 - 160 Jahre	%			27	47	25	0	0	0	0	0	100
> 160 Jahre	%				13	42	0	0	24	0	21	100
alle Baumaltersklassen	%	2	18	34	30	11	3	1	1	0	1	100

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[m³/ha]	5	20	8	0	0	0	0	0	0	0	34
21 - 40 Jahre	[m³/ha]	5	87	79	17	1	0	1	0	0	0	190
41 - 60 Jahre	[m³/ha]	1	33	119	144	46	9	1	0	0	0	354
61 - 80 Jahre	[m³/ha]		28	96	138	78	22	6	2	0	0	369
81 - 100 Jahre	[m³/ha]		4	45	153	151	54	13	3	0	0	422
101 - 120 Jahre	[m³/ha]		1	28	121	160	103	31	5	1	1	452
121 - 140 Jahre	[m³/ha]			14	74	128	126	45	9	18	2	417
141 - 160 Jahre	[m³/ha]		2	8	76	101	108	104	70	19	21	508
> 160 Jahre	[m³/ha]				18	71	62	73	106	43	85	458
alle Baumaltersklassen	[m³/ha]	1	29	69	104	76	36	13	5	2	2	336

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	20	27	8	0	0	0	0	0	0	0	34
21 - 40 Jahre	Sek	44	152	125	42	5	1	2	1	0	0	182
41 - 60 Jahre	Sek	11	125	246	223	111	30	4	1	0	0	291
61 - 80 Jahre	Sek		52	104	128	85	34	11	3	0	0	159
81 - 100 Jahre	Sek		13	76	153	158	90	28	5	1	1	188
101 - 120 Jahre	Sek		4	38	92	103	75	29	7	2	1	124
121 - 140 Jahre	Sek			9	29	43	34	23	6	6	1	59
141 - 160 Jahre	Sek		1	4	11	17	18	18	11	5	6	36
> 160 Jahre	Sek				2	4	5	7	7	6	7	20
alle Baumaltersklassen	Sek	75	358	593	653	504	281	119	41	19	16	905

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	23	23	45	0	0	0	0	0	0	0	24
21 - 40 Jahre	SE[%]	15	7	8	18	45	100	70	100	0	0	4
41 - 60 Jahre	SE[%]	33	11	5	5	11	21	52	99	0	0	3
61 - 80 Jahre	SE[%]		16	9	6	10	17	32	57	0	0	3
81 - 100 Jahre	SE[%]		27	13	6	6	11	20	46	100	100	3
101 - 120 Jahre	SE[%]		59	18	8	7	13	21	40	72	101	5
121 - 140 Jahre	SE[%]			32	20	11	15	21	43	50	97	7
141 - 160 Jahre	SE[%]		99	41	30	23	27	20	33	56	40	8
> 160 Jahre	SE[%]				65	49	48	55	36	42	44	16
alle Baumaltersklassen	SE[%]	13	7	4	4	5	8	13	21	31	30	2

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	15	60	25	0	0	0	0	0	0	0	100
21 - 40 Jahre	%	3	46	42	9	1	0	0	0	0	0	100
41 - 60 Jahre	%	0	9	34	41	13	3	0	0	0	0	100
61 - 80 Jahre	%		8	26	37	21	6	2	0	0	0	100
81 - 100 Jahre	%		1	11	36	36	13	3	1	0	0	100
101 - 120 Jahre	%		0	6	27	35	23	7	1	0	0	100
121 - 140 Jahre	%			3	18	31	30	11	2	4	1	100
141 - 160 Jahre	%		0	1	15	20	21	20	14	4	4	100
> 160 Jahre	%				4	16	14	16	23	9	19	100
alle Baumaltersklassen	%	0	9	21	31	22	11	4	1	1	1	100

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[m³/ha]	5	23	9	0	0	0	0	0	0	0	37
21 - 40 Jahre	[m³/ha]	2	104	83	25	3	0	0	0	0	0	218
41 - 60 Jahre	[m³/ha]	0	49	104	77	33	4	0	0	0	0	269
61 - 80 Jahre	[m³/ha]		11	78	118	70	20	7	2	0	0	306
81 - 100 Jahre	[m³/ha]		2	45	141	120	50	13	4	0	0	377
101 - 120 Jahre	[m³/ha]		2	49	123	202	81	20	9	2	0	488
121 - 140 Jahre	[m³/ha]			16	84	105	102	41	46	0	6	400
141 - 160 Jahre	[m³/ha]			14	30	115	83	31	99	15	0	387
> 160 Jahre	[m³/ha]			9	58	89	80	125	40	76	76	552
alle Baumaltersklassen	[m³/ha]	1	35	63	80	66	28	10	6	2	2	292

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0	13
21 - 40 Jahre	Sek	5	43	37	16	2	0	0	0	0	0	55
41 - 60 Jahre	Sek	1	29	49	38	19	4	0	0	0	0	63
61 - 80 Jahre	Sek		7	33	37	28	12	3	1	0	0	52
81 - 100 Jahre	Sek		3	29	49	45	31	8	3	0	0	60
101 - 120 Jahre	Sek		1	13	22	21	14	6	2	1	0	29
121 - 140 Jahre	Sek			4	8	10	9	7	5	0	1	22
141 - 160 Jahre	Sek			1	1	2	4	2	4	1	0	7
> 160 Jahre	Sek			1	2	3	6	5	2	3	3	9
alle Baumaltersklassen	Sek	14	91	165	162	123	78	29	17	5	4	245

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	43	38	65	0	0	0	0	0	0	0	36
21 - 40 Jahre	SE[%]	55	13	17	28	75	0	0	0	0	0	8
41 - 60 Jahre	SE[%]	100	25	11	17	26	47	0	0	0	0	8
61 - 80 Jahre	SE[%]		36	15	12	16	29	58	101	0	0	8
81 - 100 Jahre	SE[%]		54	18	11	12	17	38	57	0	0	5
101 - 120 Jahre	SE[%]		98	29	14	14	24	41	75	101	0	11
121 - 140 Jahre	SE[%]			51	41	21	32	46	50	0	102	12
141 - 160 Jahre	SE[%]			81	81	55	29	54	47	104	0	13
> 160 Jahre	SE[%]			59	59	33	20	29	36	70	67	8
alle Baumaltersklassen	SE[%]	35	14	8	8	10	13	22	27	56	52	5

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	14	62	24	0	0	0	0	0	0	0	100
21 - 40 Jahre	%	1	48	38	12	1	0	0	0	0	0	100
41 - 60 Jahre	%	0	18	39	29	12	1	0	0	0	0	100
61 - 80 Jahre	%		4	25	39	23	7	2	1	0	0	100
81 - 100 Jahre	%		1	12	38	32	13	3	1	0	0	100
101 - 120 Jahre	%		0	10	25	41	17	4	2	1	0	100
121 - 140 Jahre	%			4	21	26	26	10	11	0	2	100
141 - 160 Jahre	%			4	8	30	21	8	26	4	0	100
> 160 Jahre	%			2	10	16	14	23	7	14	14	100
alle Baumaltersklassen	%	0	12	22	27	22	10	3	2	1	1	100

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[m³/ha]	5	30	4	0	0	0	0	0	0	0	39
21 - 40 Jahre	[m³/ha]	8	107	83	18	3	1	0	0	0	0	221
41 - 60 Jahre	[m³/ha]	1	57	137	94	28	7	2	0	0	0	325
61 - 80 Jahre	[m³/ha]	1	22	113	136	68	20	3	4	1	1	369
81 - 100 Jahre	[m³/ha]		10	84	137	98	34	9	2	1	1	375
101 - 120 Jahre	[m³/ha]		8	69	147	119	63	25	8	7	1	446
121 - 140 Jahre	[m³/ha]		4	48	93	114	76	55	17	8	5	421
141 - 160 Jahre	[m³/ha]		1	64	105	55	56	35	44	27	8	395
> 160 Jahre	[m³/ha]				37	57	65	105	90	97	138	588
alle Baumaltersklassen	[m³/ha]	2	42	87	87	51	22	9	4	3	2	311

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	32	48	9	0	0	0	0	0	0	0	55
21 - 40 Jahre	Sek	73	233	170	42	5	3	1	0	0	0	276
41 - 60 Jahre	Sek	8	175	270	188	80	22	5	1	1	0	332
61 - 80 Jahre	Sek	2	67	166	190	105	44	7	5	1	2	240
81 - 100 Jahre	Sek		30	139	173	149	64	23	5	2	1	235
101 - 120 Jahre	Sek		14	65	100	84	62	30	8	8	1	147
121 - 140 Jahre	Sek		8	32	60	67	51	39	15	6	3	108
141 - 160 Jahre	Sek		1	12	17	12	13	8	10	8	3	43
> 160 Jahre	Sek				1	3	4	5	7	9	9	25
alle Baumaltersklassen	Sek	114	549	799	711	472	244	116	49	35	19	1072

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	18	17	37	0	0	0	0	0	0	0	16
21 - 40 Jahre	SE[%]	14	5	8	19	54	58	100	0	0	0	4
41 - 60 Jahre	SE[%]	44	8	5	8	14	23	49	100	100	0	3
61 - 80 Jahre	SE[%]	78	13	6	5	11	16	38	49	100	71	4
81 - 100 Jahre	SE[%]		25	7	6	8	16	24	55	78	99	4
101 - 120 Jahre	SE[%]		31	11	7	10	14	20	38	36	100	5
121 - 140 Jahre	SE[%]		33	19	12	11	15	18	26	68	63	5
141 - 160 Jahre	SE[%]		99	29	35	35	36	38	35	39	59	15
> 160 Jahre	SE[%]				77	62	53	28	41	39	48	6
alle Baumaltersklassen	SE[%]	12	5	4	4	6	8	12	17	21	28	2

1.07.20 Vorrat [m³/ha] nach Baumaltersklasse und Bruthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1Jl_L634of_2012_bi)												
Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	14	76	10	0	0	0	0	0	0	0	100
21 - 40 Jahre	%	4	49	38	8	1	0	0	0	0	0	100
41 - 60 Jahre	%	0	17	42	29	8	2	1	0	0	0	100
61 - 80 Jahre	%	0	6	31	37	18	5	1	1	0	0	100
81 - 100 Jahre	%		3	22	36	26	9	2	1	0	0	100
101 - 120 Jahre	%		2	15	33	27	14	6	2	2	0	100
121 - 140 Jahre	%		1	11	22	27	18	13	4	2	1	100
141 - 160 Jahre	%		0	16	27	14	14	9	11	7	2	100
> 160 Jahre	%				6	10	11	18	15	16	23	100
alle Baumaltersklassen	%	1	14	28	28	16	7	3	1	1	1	100