

## 1.10.19 Nutzung [m³/ha\*a; Efm o.R.] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	[m³/ha*a]	2,2	3,0	3,4	2,4	2,8
Buche	[m³/ha*a]	4,3	5,8	6,8	6,2	6,2
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha*a]	1,8	2,7	2,8	2,5	2,6
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha*a]	2,2	1,9	2,5	2,2	2,2
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[m³/ha*a]</b>	<b>2,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>
Fichte	[m³/ha*a]	10,4	12,0	14,2	14,0	13,3
Tanne	[m³/ha*a]		7,4	9,6	8,4	8,4
Douglasie	[m³/ha*a]	12,3	6,7	6,6	3,6	5,8
Kiefer	[m³/ha*a]	5,0	5,6	6,1	4,8	5,2
Lärche	[m³/ha*a]	3,5	5,1	5,9	4,4	4,9
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[m³/ha*a]</b>	<b>6,0</b>	<b>8,9</b>	<b>10,4</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[m³/ha*a]</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>

## 1.10.19 Nutzung [m³/ha\*a; Efm o.R.] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	Sek	51	639	881	759	2.330
Buche	Sek	53	1.813	1.901	1.404	5.171
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	22	347	587	580	1.536
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	76	400	356	798	1.630
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>178</b>	<b>2.870</b>	<b>3.236</b>	<b>3.109</b>	<b>9.393</b>
Fichte	Sek	115	3.139	2.815	4.829	10.898
Tanne	Sek		271	346	404	1.021
Douglasie	Sek	7	287	347	150	791
Kiefer	Sek	380	1.958	1.158	2.932	6.428
Lärche	Sek	17	435	305	383	1.140
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>492</b>	<b>5.481</b>	<b>4.410</b>	<b>7.937</b>	<b>18.320</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>624</b>	<b>7.668</b>	<b>6.946</b>	<b>10.274</b>	<b>25.512</b>

## 1.10.19 SE68%: Nutzung [m<sup>3</sup>/ha\*a; Efm o.R.] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	SE[%]	+/-18,2%	+/-5,2%	+/-4,8%	+/-5,2%	+/-2,9%
Buche	SE[%]	+/-20,6%	+/-3,5%	+/-3,6%	+/-4,0%	+/-2,2%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-27,2%	+/-8,5%	+/-6,3%	+/-5,8%	+/-3,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-16,7%	+/-7,0%	+/-9,5%	+/-6,1%	+/-4,2%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-11,3%</b>	<b>+/-2,8%</b>	<b>+/-3,0%</b>	<b>+/-3,0%</b>	<b>+/-1,7%</b>
Fichte	SE[%]	+/-15,1%	+/-3,1%	+/-3,1%	+/-2,4%	+/-1,7%
Tanne	SE[%]		+/-7,8%	+/-6,7%	+/-6,9%	+/-4,3%
Douglasie	SE[%]	+/-50,2%	+/-7,9%	+/-7,9%	+/-11,9%	+/-5,1%
Kiefer	SE[%]	+/-6,7%	+/-2,8%	+/-4,4%	+/-2,5%	+/-1,7%
Lärche	SE[%]	+/-29,4%	+/-5,9%	+/-7,4%	+/-6,9%	+/-3,9%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-7,1%</b>	<b>+/-2,3%</b>	<b>+/-2,5%</b>	<b>+/-2,0%</b>	<b>+/-1,3%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-6,4%</b>	<b>+/-1,9%</b>	<b>+/-2,0%</b>	<b>+/-1,7%</b>	<b>+/-1,1%</b>

## 1.10.19 SE68: Nutzung [m<sup>3</sup>/ha\*a; Efm o.R.] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	SE68 ±	+/-0,4	+/-0,2	+/-0,2	+/-0,1	+/-0,1
Buche	SE68 ±	+/-0,9	+/-0,2	+/-0,2	+/-0,3	+/-0,1
andere Lb hoher Lebensdauer	SE68 ±	+/-0,5	+/-0,2	+/-0,2	+/-0,1	+/-0,1
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE68 ±	+/-0,4	+/-0,1	+/-0,2	+/-0,1	+/-0,1
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-0,3</b>	<b>+/-0,1</b>	<b>+/-0,1</b>	<b>+/-0,1</b>	<b>+/-0,1</b>
Fichte	SE68 ±	+/-1,6	+/-0,4	+/-0,4	+/-0,3	+/-0,2
Tanne	SE68 ±		+/-0,6	+/-0,6	+/-0,6	+/-0,4
Douglasie	SE68 ±	+/-6,2	+/-0,5	+/-0,5	+/-0,4	+/-0,3
Kiefer	SE68 ±	+/-0,3	+/-0,2	+/-0,3	+/-0,1	+/-0,1
Lärche	SE68 ±	+/-1,0	+/-0,3	+/-0,4	+/-0,3	+/-0,2
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-0,4</b>	<b>+/-0,2</b>	<b>+/-0,3</b>	<b>+/-0,2</b>	<b>+/-0,1</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-0,3</b>	<b>+/-0,1</b>	<b>+/-0,1</b>	<b>+/-0,1</b>	<b>+/-0,1</b>

## 1.10.19 Nutzung [m³/ha\*a; Efm o.R.] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	[m³/ha*a]		2,3	1,5	1,0	1,4
Buche	[m³/ha*a]	1,6	3,5	0,8	3,9	3,2
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha*a]		4,7	1,5	1,8	2,3
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha*a]	0,5	2,5	2,4	1,3	1,7
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[m³/ha*a]</b>	<b>0,6</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>
Fichte	[m³/ha*a]	4,1	7,5	10,7	6,6	7,6
Douglasie	[m³/ha*a]		13,0	0,0	2,1	5,1
Kiefer	[m³/ha*a]	3,8	4,4	5,5	4,1	4,2
Lärche	[m³/ha*a]	1,1	4,3	6,5	1,9	3,7
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[m³/ha*a]</b>	<b>3,7</b>	<b>6,5</b>	<b>8,8</b>	<b>4,9</b>	<b>5,9</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[m³/ha*a]</b>	<b>3,1</b>	<b>5,5</b>	<b>6,3</b>	<b>3,6</b>	<b>4,6</b>

## 1.10.19 Nutzung [m³/ha\*a; Efm o.R.] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	Sek		18	8	26	52
Buche	Sek	1	20	3	9	33
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		10	5	9	24
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	4	54	19	55	132
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>5</b>	<b>98</b>	<b>31</b>	<b>90</b>	<b>224</b>
Fichte	Sek	5	315	76	124	520
Douglasie	Sek		2	0	1	3
Kiefer	Sek	49	94	38	203	384
Lärche	Sek	1	33	13	8	55
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>55</b>	<b>405</b>	<b>117</b>	<b>323</b>	<b>900</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>57</b>	<b>479</b>	<b>137</b>	<b>392</b>	<b>1.065</b>

## 1.10.19 SE68: Nutzung [m<sup>3</sup>/ha\*a; Efm o.R.] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	SE68 ±		+/-0,5	+/-0,5	+/-0,2	+/-0,2
Buche	SE68 ±	+/-1,3	+/-0,8	+/-0,4	+/-1,4	+/-0,6
andere Lb hoher Lebensdauer	SE68 ±		+/-1,4	+/-0,6	+/-0,8	+/-0,7
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE68 ±	+/-0,3	+/-0,4	+/-0,6	+/-0,2	+/-0,2
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-0,3</b>	<b>+/-0,3</b>	<b>+/-0,3</b>	<b>+/-0,2</b>	<b>+/-0,2</b>
Fichte	SE68 ±	+/-1,6	+/-0,5	+/-1,6	+/-0,8	+/-0,4
Douglasie	SE68 ±		+/-7,1	+/-0,0	+/-1,6	+/-2,8
Kiefer	SE68 ±	+/-0,6	+/-0,6	+/-1,0	+/-0,4	+/-0,3
Lärche	SE68 ±	+/-1,1	+/-0,7	+/-1,7	+/-0,9	+/-0,6
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-0,6</b>	<b>+/-0,4</b>	<b>+/-1,1</b>	<b>+/-0,4</b>	<b>+/-0,3</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-0,5</b>	<b>+/-0,3</b>	<b>+/-0,8</b>	<b>+/-0,3</b>	<b>+/-0,2</b>

## 1.10.19 SE68%: Nutzung [m<sup>3</sup>/ha\*a; Efm o.R.] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	SE[%]		+/-23,1%	+/-32,1%	+/-21,5%	+/-14,8%
Buche	SE[%]	+/-81,5%	+/-23,9%	+/-52,2%	+/-35,7%	+/-19,4%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-29,5%	+/-43,8%	+/-45,9%	+/-30,1%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-52,8%	+/-15,5%	+/-26,6%	+/-17,3%	+/-10,8%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-49,1%</b>	<b>+/-11,1%</b>	<b>+/-18,4%</b>	<b>+/-13,9%</b>	<b>+/-8,6%</b>
Fichte	SE[%]	+/-40,1%	+/-6,6%	+/-15,2%	+/-11,7%	+/-5,6%
Douglasie	SE[%]		+/-54,3%	+/-0,0%	+/-76,5%	+/-54,9%
Kiefer	SE[%]	+/-16,8%	+/-13,9%	+/-18,7%	+/-9,8%	+/-6,9%
Lärche	SE[%]	+/-96,5%	+/-17,0%	+/-25,8%	+/-49,4%	+/-14,8%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-15,2%</b>	<b>+/-6,1%</b>	<b>+/-12,5%</b>	<b>+/-8,0%</b>	<b>+/-4,5%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-16,2%</b>	<b>+/-5,5%</b>	<b>+/-12,2%</b>	<b>+/-7,3%</b>	<b>+/-4,2%</b>



## 1.10.19 Nutzung [m³/ha; Vfm] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatwald - Bund	Staatwald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	[m³/ha] Vfm		31,1	21,2	14,7	19,7
Buche	[m³/ha] Vfm	19,2	40,9	10,3	46,7	37,7
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha] Vfm		61,3	20,2	24,3	30,7
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha] Vfm	6,8	35,7	34,9	19,2	25,0
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[m³/ha] Vfm</b>	<b>7,9</b>	<b>37,9</b>	<b>24,7</b>	<b>20,1</b>	<b>25,9</b>
Fichte	[m³/ha] Vfm	49,6	94,5	136,7	82,9	95,4
Douglasie	[m³/ha] Vfm		174,8	0,0	27,7	67,7
Kiefer	[m³/ha] Vfm	52,6	59,3	77,0	56,3	57,9
Lärche	[m³/ha] Vfm	16,5	62,4	93,5	26,3	53,9
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[m³/ha] Vfm</b>	<b>51,4</b>	<b>83,9</b>	<b>115,4</b>	<b>64,9</b>	<b>77,0</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[m³/ha] Vfm</b>	<b>42,2</b>	<b>71,4</b>	<b>83,3</b>	<b>47,4</b>	<b>60,1</b>


## 1.10.19 SE68: Nutzung [m<sup>3</sup>/ha; V<sub>f</sub>m] nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte), nur HB und PLT

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA\_L417mF\_0212\_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	SE68 ±		+/-7,0	+/-6,8	+/-3,2	+/-2,9
Buche	SE68 ±	+/-15,7	+/-9,5	+/-5,3	+/-16,4	+/-7,1
andere Lb hoher Lebensdauer	SE68 ±		+/-17,5	+/-9,0	+/-11,4	+/-9,3
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE68 ±	+/-3,5	+/-5,7	+/-9,2	+/-3,3	+/-2,7
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-3,8</b>	<b>+/-4,1</b>	<b>+/-4,5</b>	<b>+/-2,8</b>	<b>+/-2,2</b>
Fichte	SE68 ±	+/-20,0	+/-6,3	+/-20,9	+/-9,6	+/-5,3
Douglasie	SE68 ±		+/-95,0	+/-0,0	+/-21,2	+/-37,3
Kiefer	SE68 ±	+/-8,5	+/-8,3	+/-14,2	+/-5,5	+/-3,9
Lärche	SE68 ±	+/-15,9	+/-10,5	+/-24,0	+/-12,8	+/-7,9
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-7,6</b>	<b>+/-5,1</b>	<b>+/-14,2</b>	<b>+/-5,0</b>	<b>+/-3,4</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE68 ±</b>	<b>+/-6,7</b>	<b>+/-3,9</b>	<b>+/-9,9</b>	<b>+/-3,4</b>	<b>+/-2,5</b>

**BWI 3: Nutzung pro ha [m<sup>3</sup>/ha; Vfm] 2002-2012 nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte)  
Freistaat Sachsen**



**BWI 3: jährliche Nutzung [m<sup>3</sup>/ha\*a; Efm o.R.] 2002-2012 nach Baumartengruppe und Eigentumsart (letzte) Freistaat Sachsen**

