

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[%]	1,2%	2,2%	4,4%	6,2%	7,5%	7,4%	6,5%	6,0%	5,1%	3,5%	3,5%
Buche	[%]	3,8%	7,3%	11,0%	13,2%	15,5%	15,8%	13,9%	12,8%	11,5%	8,2%	8,4%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	3,3%	4,3%	5,9%	6,3%	7,1%	4,6%	5,2%	3,0%	2,7%	6,3%	4,5%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	1,5%	2,5%	2,2%	3,1%	2,9%	3,3%	1,7%	1,4%	0,2%	1,1%	2,2%
alle Laubbäume	[%]	2,7%	4,4%	6,2%	8,3%	10,6%	11,1%	9,7%	8,6%	7,0%	5,0%	5,0%
Fichte	[%]	1,8%	5,4%	9,6%	14,5%	17,4%	17,9%	18,4%	14,0%	13,4%	6,5%	8,1%
Tanne	[%]	4,7%	6,9%	8,6%	8,8%	11,4%	10,5%	12,1%	12,0%	13,7%	16,3%	7,6%
Douglasie	[%]	2,1%	3,3%	4,7%	5,4%	6,6%	5,3%	8,7%	6,6%	5,1%	4,1%	4,1%
Kiefer	[%]	0,5%	1,5%	3,3%	5,2%	6,4%	7,2%	8,1%	4,4%	0,0%	12,6%	2,6%
Lärche	[%]		2,8%	4,0%	5,4%	6,3%	5,2%	7,1%	5,8%	1,1%	0,0%	4,0%
alle Nadelbäume	[%]	1,4%	3,6%	6,4%	9,7%	12,5%	13,8%	15,2%	12,1%	11,5%	9,1%	5,6%
alle Baumarten	[%]	2,1%	4,0%	6,4%	9,3%	11,8%	12,6%	12,1%	9,8%	8,2%	5,6%	5,3%

Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser												
Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)												
Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	12	120	283	432	532	413	231	121	59	33	1.906
Buche	Sek	107	767	1.229	1.598	1.779	1.393	739	315	113	49	5.473
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	56	339	428	387	278	105	51	15	7	6	1.447
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	29	162	195	182	86	42	10	7	1	4	662
alle Laubbäume	Sek	203	1.369	2.078	2.511	2.564	1.904	1.014	454	180	91	8.389
Fichte	Sek	48	894	2.414	3.783	3.328	1.872	787	213	56	13	8.398
Tanne	Sek	13	85	135	177	260	239	189	93	41	26	944
Douglasie	Sek	3	47	87	126	125	66	48	19	9	5	426
Kiefer	Sek	9	185	725	1.178	842	355	86	9	0	2	2.858
Lärche	Sek		25	75	173	167	71	28	7	1	0	486
alle Nadelbäume	Sek	73	1.225	3.385	5.302	4.590	2.534	1.110	338	106	46	12.106
alle Baumarten	Sek	276	2.574	5.384	7.642	6.986	4.340	2.098	789	286	137	18.899

Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser												
Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)												
Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-31,8%	+/-11,8%	+/-7,6%	+/-6,1%	+/-5,4%	+/-6,1%	+/-8,3%	+/-11,5%	+/-16,5%	+/-27,5%	+/-4,7%
Buche	SE[%]	+/-11,6%	+/-5,0%	+/-3,7%	+/-3,2%	+/-2,9%	+/-3,2%	+/-4,4%	+/-6,5%	+/-11,5%	+/-18,2%	+/-3,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-15,7%	+/-7,6%	+/-6,2%	+/-6,0%	+/-7,1%	+/-11,2%	+/-17,1%	+/-27,9%	+/-38,2%	+/-51,1%	+/-5,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-23,4%	+/-10,0%	+/-9,2%	+/-8,9%	+/-13,1%	+/-17,8%	+/-38,5%	+/-42,5%	+/-99,8%	+/-54,3%	+/-7,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-8,5%	+/-3,7%	+/-2,9%	+/-2,6%	+/-2,5%	+/-2,9%	+/-3,9%	+/-5,7%	+/-9,5%	+/-14,3%	+/-2,3%
Fichte	SE[%]	+/-17,2%	+/-4,6%	+/-2,6%	+/-2,0%	+/-2,1%	+/-2,8%	+/-4,5%	+/-8,0%	+/-16,6%	+/-33,7%	+/-2,2%
Tanne	SE[%]	+/-35,5%	+/-13,2%	+/-10,1%	+/-8,4%	+/-7,0%	+/-7,2%	+/-8,2%	+/-11,1%	+/-16,2%	+/-21,0%	+/-7,3%
Douglasie	SE[%]	+/-56,8%	+/-18,9%	+/-13,4%	+/-11,1%	+/-11,2%	+/-13,5%	+/-17,1%	+/-25,0%	+/-33,3%	+/-44,8%	+/-9,7%
Kiefer	SE[%]	+/-43,0%	+/-10,3%	+/-4,8%	+/-3,7%	+/-4,4%	+/-6,3%	+/-12,8%	+/-34,0%	+/-0,0%	+/-65,1%	+/-4,1%
Lärche	SE[%]		+/-25,4%	+/-15,2%	+/-8,6%	+/-9,0%	+/-13,9%	+/-22,1%	+/-40,4%	+/-98,9%	+/-0,0%	+/-7,9%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-14,5%	+/-4,0%	+/-2,3%	+/-1,8%	+/-1,9%	+/-2,5%	+/-3,8%	+/-6,4%	+/-12,1%	+/-17,1%	+/-1,9%
alle Baumarten	SE[%]	+/-7,4%	+/-2,8%	+/-1,8%	+/-1,5%	+/-1,5%	+/-1,9%	+/-2,8%	+/-4,3%	+/-7,5%	+/-11,5%	+/-1,5%

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammsschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[%]	4,4%	4,4%	5,2%	7,6%	7,3%	5,4%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	5,1%
Buche	[%]	4,0%	7,5%	16,0%	23,8%	13,6%	20,9%	11,1%	15,8%	8,9%	18,7%	9,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	4,7%	8,6%	8,8%	3,7%	3,0%	2,4%	4,4%	5,4%	0,0%	0,0%	7,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	1,4%	4,9%	6,4%	6,7%	4,1%	6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%
alle Laubbäume	[%]	3,0%	5,8%	7,2%	8,6%	7,2%	9,6%	4,2%	8,5%	2,5%	12,1%	5,6%
Fichte	[%]	1,0%	2,9%	8,8%	15,4%	18,6%	19,5%	15,8%	28,7%	17,9%	0,0%	7,4%
Kiefer	[%]	0,4%	2,1%	5,5%	6,9%	7,2%	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,2%
Lärche	[%]		1,5%	1,0%	4,3%	3,6%	1,7%	5,7%	48,6%	0,0%	0,0%	2,0%
alle Nadelbäume	[%]	0,6%	2,4%	6,8%	11,7%	14,8%	16,1%	14,1%	26,7%	11,5%	0,0%	5,1%
alle Baumarten	[%]	1,6%	3,5%	6,9%	11,0%	13,2%	14,0%	8,7%	11,4%	3,3%	11,5%	5,2%

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	2	8	16	20	13	7	0	2	0	0	57
Buche	Sek	1	6	11	21	16	19	9	6	1	7	68
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	2	13	13	6	3	1	1	1	0	0	35
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	1	23	32	23	6	4	0	0	0	0	78
alle Laubbäume	Sek	6	48	71	68	38	30	10	9	1	7	218
Fichte	Sek	1	35	134	248	212	94	23	6	1	0	485
Kiefer	Sek	1	28	87	82	35	3	0	0	0	0	204
Lärche	Sek		2	2	7	6	1	1	1	0	0	20
alle Nadelbäume	Sek	2	65	223	333	249	97	24	7	1	0	681
alle Baumarten	Sek	8	113	289	389	285	125	33	16	2	7	851

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammsschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-70,2%	+/-37,1%	+/-25,2%	+/-22,8%	+/-26,5%	+/-39,0%	+/-0,0%	+/-73,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-19,7%
Buche	SE[%]	+/-97,5%	+/-42,8%	+/-28,6%	+/-21,5%	+/-23,1%	+/-21,7%	+/-30,3%	+/-41,2%	+/-94,5%	+/-31,9%	+/-24,4%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-67,9%	+/-26,8%	+/-31,6%	+/-40,3%	+/-51,6%	+/-95,5%	+/-98,3%	+/-83,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-20,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-99,5%	+/-21,9%	+/-18,0%	+/-20,1%	+/-39,1%	+/-49,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-16,2%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-41,2%	+/-15,1%	+/-12,4%	+/-13,3%	+/-16,6%	+/-19,1%	+/-31,3%	+/-34,8%	+/-98,8%	+/-35,2%	+/-10,6%
Fichte	SE[%]	+/-100,0%	+/-19,3%	+/-10,0%	+/-6,5%	+/-6,7%	+/-10,2%	+/-21,2%	+/-33,3%	+/-103,0%	+/-0,0%	+/-7,1%
Kiefer	SE[%]	+/-100,9%	+/-20,1%	+/-11,3%	+/-11,5%	+/-16,4%	+/-56,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,7%
Lärche	SE[%]		+/-73,5%	+/-72,4%	+/-38,6%	+/-40,2%	+/-100,0%	+/-98,5%	+/-72,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-31,1%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-71,9%	+/-13,7%	+/-7,5%	+/-5,7%	+/-6,3%	+/-10,3%	+/-21,2%	+/-31,4%	+/-99,3%	+/-0,0%	+/-6,1%
alle Baumarten	SE[%]	+/-36,1%	+/-10,5%	+/-6,4%	+/-5,4%	+/-6,0%	+/-9,3%	+/-19,4%	+/-25,1%	+/-74,9%	+/-35,6%	+/-5,5%

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Buche	[%]						25,8%	0,0%	0,0%	0,0%	42,1%	1,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	23,1%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,9%
alle Laubbäume	[%]	20,4%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	42,1%	5,8%
Fichte	[%]				7,7%	21,0%	49,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Kiefer	[%]	1,7%	2,6%	8,8%	5,1%	10,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,7%
alle Nadelbäume	[%]	1,7%	2,3%	8,0%	5,6%	11,8%	40,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%
alle Baumarten	[%]	4,3%	1,9%	7,0%	4,8%	11,4%	30,4%	0,0%	0,0%	0,0%	42,1%	3,9%

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Buche	Sek						1	0	0	0	1	2
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
alle Laubbäume	Sek	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Fichte	Sek				3	2	2	0	0	0	0	4
Kiefer	Sek	1	6	15	7	4	0	0	0	0	0	25
alle Nadelbäume	Sek	1	6	15	10	6	2	0	0	0	0	29
alle Baumarten	Sek	2	6	16	10	6	3	0	0	0	1	32

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Buche	SE[%]						+/-71,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-71,1%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-87,1%	+/-0,0%	+/-103,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-91,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-88,2%	+/-0,0%	+/-96,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-85,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-89,5%
Fichte	SE[%]				+/-76,0%	+/-47,6%	+/-35,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-37,4%
Kiefer	SE[%]	+/-106,9%	+/-35,9%	+/-27,9%	+/-36,6%	+/-42,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-31,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-106,5%	+/-36,4%	+/-28,2%	+/-32,7%	+/-31,6%	+/-41,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-29,4%
alle Baumarten	SE[%]	+/-76,0%	+/-37,3%	+/-27,6%	+/-32,3%	+/-31,4%	+/-42,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-28,1%


1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[%]		11,6%	4,1%	12,3%	17,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%
Buche	[%]	6,3%	11,7%	16,4%	29,7%	14,4%	21,7%	6,3%	21,0%	0,0%	23,3%	12,4%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	5,5%	16,7%	14,9%	4,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		6,0%	6,1%	8,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%
alle Laubbäume	[%]	3,4%	9,3%	8,5%	15,0%	10,9%	12,0%	5,6%	14,2%	0,0%	20,1%	8,1%
Fichte	[%]	1,9%	4,3%	8,0%	14,8%	18,8%	20,0%	20,8%	29,2%	17,9%	0,0%	8,4%
Kiefer	[%]		1,9%	5,5%	5,6%	7,9%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,2%
Lärche	[%]			1,2%	4,0%	3,9%	3,1%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	1,9%
alle Nadelbäume	[%]	1,3%	3,4%	7,0%	12,2%	16,1%	17,3%	17,2%	29,1%	12,9%	0,0%	6,6%
alle Baumarten	[%]	2,2%	4,9%	7,2%	12,6%	15,5%	16,2%	12,7%	18,9%	3,1%	19,5%	7,0%

Fichte BRD 2012	[%]	1,8%	5,4%	9,6%	14,5%	17,4%	17,9%	18,4%	14,0%	13,4%	6,5%	8,1%
Fichte LW SN 2012	[%]	1,9%	4,3%	8,0%	14,8%	18,8%	20,0%	20,8%	29,2%	17,9%	0,0%	8,4%
Fichte LW SN 2002	[%]	1,9%	4,5%	13,4%	25,9%	31,1%	35,7%	22,9%	26,9%	1,0%		10,8%



1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)												
Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek		4	4	10	5	0	0	0	0	0	19
Buche	Sek	1	5	7	13	9	10	3	3	0	5	38
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1	4	4	1	0	0	1	0	0	0	8
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		7	8	8	1	0	0	0	0	0	24
alle Laubbäume	Sek	2	18	23	31	15	10	4	3	0	5	84
Fichte	Sek	1	23	70	136	122	57	17	5	1	0	278
Kiefer	Sek		6	20	19	10	1	0	0	0	0	51
Lärche	Sek			1	4	4	1	0	1	0	0	11
alle Nadelbäume	Sek	1	29	91	158	133	58	17	6	1	0	324
alle Baumarten	Sek	3	47	111	180	148	67	20	9	1	5	381

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]		+/-46,5%	+/-62,1%	+/-32,5%	+/-33,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-31,5%
Buche	SE[%]	+/-95,5%	+/-43,3%	+/-35,4%	+/-25,4%	+/-31,5%	+/-29,3%	+/-53,9%	+/-52,7%	+/-0,0%	+/-35,6%	+/-29,4%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-90,4%	+/-45,7%	+/-46,4%	+/-101,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-37,6%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-39,7%	+/-31,0%	+/-34,7%	+/-93,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-28,1%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-69,8%	+/-24,5%	+/-20,7%	+/-20,1%	+/-26,8%	+/-33,9%	+/-50,0%	+/-53,6%	+/-0,0%	+/-37,7%	+/-18,1%
Fichte	SE[%]	+/-99,9%	+/-24,0%	+/-13,5%	+/-8,7%	+/-8,8%	+/-14,0%	+/-22,8%	+/-36,0%	+/-103,0%	+/-0,0%	+/-9,0%
Kiefer	SE[%]		+/-45,8%	+/-23,6%	+/-21,0%	+/-31,0%	+/-97,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-21,8%
Lärche	SE[%]			+/-101,6%	+/-50,9%	+/-49,1%	+/-99,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-34,6%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-99,1%	+/-21,4%	+/-11,3%	+/-8,3%	+/-8,5%	+/-14,0%	+/-24,3%	+/-33,3%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-8,5%
alle Baumarten	SE[%]	+/-57,7%	+/-16,7%	+/-10,2%	+/-8,0%	+/-8,1%	+/-12,9%	+/-24,3%	+/-31,8%	+/-100,7%	+/-37,9%	+/-8,3%

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[%]		3,8%	0,0%	3,9%	16,8%	11,3%	0,0%	13,1%	0,0%	0,0%	2,5%
Buche	[%]		5,9%	0,0%	7,8%	12,1%	24,0%	38,0%	11,2%	0,0%	0,0%	4,9%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	13,4%	1,8%	5,0%	0,0%	9,2%	0,0%	0,0%	14,9%	0,0%	0,0%	5,9%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		1,9%	0,0%	3,1%	0,0%	12,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
alle Laubbäume	[%]	4,2%	2,7%	1,6%	2,9%	10,5%	11,9%	10,0%	11,1%	0,0%	0,0%	3,3%
Fichte	[%]			10,2%	24,3%	23,6%	24,6%	13,0%	100,0%	0,0%	0,0%	9,5%
Kiefer	[%]		4,0%	7,1%	8,1%	11,5%	6,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%
Lärche	[%]				5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
alle Nadelbäume	[%]		2,1%	8,8%	18,8%	20,3%	20,0%	11,6%	56,1%	0,0%	0,0%	7,3%
alle Baumarten	[%]	3,1%	2,3%	6,2%	14,8%	18,1%	17,9%	10,6%	14,8%	0,0%	0,0%	5,7%

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)												
Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek		1	0	1	3	1	0	1	0	0	7
Buche	Sek		1	0	1	2	2	3	1	0	0	8
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1	1	3	0	2	0	0	1	0	0	8
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
alle Laubbäume	Sek	1	4	3	3	7	4	3	3	0	0	21
Fichte	Sek			16	38	35	15	2	1	0	0	64
Kiefer	Sek		5	5	6	4	1	0	0	0	0	18
Lärche	Sek				1	0	0	0	0	0	0	1
alle Nadelbäume	Sek		5	21	44	39	16	2	1	0	0	80
alle Baumarten	Sek	1	9	24	46	46	20	5	4	0	0	97

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]		+/-103,9%	+/-0,0%	+/-104,4%	+/-49,6%	+/-71,4%	+/-0,0%	+/-97,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-57,8%
Buche	SE[%]		+/-118,9%	+/-0,0%	+/-99,0%	+/-57,6%	+/-56,7%	+/-45,5%	+/-95,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-72,2%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-83,7%	+/-78,8%	+/-70,4%	+/-0,0%	+/-41,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-60,2%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-100,1%	+/-0,0%	+/-94,9%	+/-0,0%	+/-96,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-73,4%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-95,7%	+/-46,6%	+/-71,4%	+/-55,4%	+/-30,7%	+/-41,4%	+/-54,9%	+/-52,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-41,4%
Fichte	SE[%]			+/-30,1%	+/-17,1%	+/-13,0%	+/-21,1%	+/-63,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-21,3%
Kiefer	SE[%]		+/-37,3%	+/-35,3%	+/-54,5%	+/-45,9%	+/-83,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-26,7%
Lärche	SE[%]				+/-93,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,2%
alle Nadelbäume	SE[%]		+/-41,9%	+/-23,9%	+/-16,9%	+/-13,4%	+/-21,8%	+/-60,4%	+/-62,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-16,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-97,1%	+/-31,1%	+/-23,3%	+/-17,3%	+/-12,7%	+/-22,3%	+/-46,5%	+/-43,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-16,1%

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[%]	7,2%	2,1%	6,1%	6,4%	4,1%	6,3%	0,0%	4,4%	0,0%	0,0%	4,8%
Buche	[%]			32,4%	19,2%	12,9%	17,9%	12,5%	11,4%	26,4%	8,7%	7,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		8,7%	9,3%	4,9%	1,3%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,2%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		5,4%	8,0%	6,9%	6,4%	8,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%
alle Laubbäume	[%]	1,4%	5,3%	8,3%	7,1%	5,0%	7,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,8%	5,0%
Fichte	[%]		2,1%	9,7%	14,0%	15,7%	14,0%	7,9%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%
Kiefer	[%]		1,8%	4,7%	7,7%	5,8%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%
Lärche	[%]		2,3%	1,0%	4,9%	5,3%	0,0%	24,6%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%
alle Nadelbäume	[%]		1,9%	6,3%	10,2%	11,3%	10,8%	8,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,9%
alle Baumarten	[%]	0,6%	3,1%	6,8%	9,4%	9,2%	9,3%	4,2%	4,5%	4,3%	3,5%	4,3%

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser												
Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;												
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)												
Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	2	3	12	9	5	6	0	1	0	0	31
Buche	Sek			4	7	5	6	3	2	1	1	20
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		8	6	5	1	1	0	0	0	0	19
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		15	23	14	5	3	0	0	0	0	49
alle Laubbäume	Sek	2	26	44	34	16	15	3	3	1	1	109
Fichte	Sek		12	48	71	53	20	4	0	0	0	139
Kiefer	Sek		11	47	50	17	1	0	0	0	0	110
Lärche	Sek		2	1	2	2	0	1	0	0	0	8
alle Nadelbäume	Sek		25	96	121	71	21	5	0	0	0	248
alle Baumarten	Sek	2	51	138	153	85	35	8	3	1	1	341

1.13.1 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1Jf_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-69,7%	+/-60,0%	+/-27,1%	+/-32,3%	+/-44,9%	+/-41,7%	+/-0,0%	+/-98,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-26,4%
Buche	SE[%]			+/-38,7%	+/-30,2%	+/-39,9%	+/-39,6%	+/-46,0%	+/-64,8%	+/-79,5%	+/-93,5%	+/-36,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-33,4%	+/-44,1%	+/-42,2%	+/-100,9%	+/-92,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-24,9%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-26,9%	+/-21,2%	+/-25,0%	+/-42,5%	+/-56,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-18,7%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-70,5%	+/-19,9%	+/-15,3%	+/-16,7%	+/-25,4%	+/-26,4%	+/-56,2%	+/-59,0%	+/-97,8%	+/-97,1%	+/-12,9%
Fichte	SE[%]		+/-30,7%	+/-16,6%	+/-11,5%	+/-14,6%	+/-18,3%	+/-49,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,7%
Kiefer	SE[%]		+/-33,6%	+/-15,5%	+/-14,4%	+/-23,8%	+/-99,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,1%
Lärche	SE[%]		+/-76,7%	+/-103,1%	+/-70,6%	+/-68,1%	+/-0,0%	+/-92,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-48,9%
alle Nadelbäume	SE[%]		+/-22,2%	+/-11,5%	+/-8,9%	+/-12,4%	+/-18,7%	+/-43,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-9,6%
alle Baumarten	SE[%]	+/-70,7%	+/-15,6%	+/-9,1%	+/-7,8%	+/-11,4%	+/-15,7%	+/-34,2%	+/-59,1%	+/-97,8%	+/-97,5%	+/-8,0%