


## 1.22.11 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	168	28.083	28.109	56.360	-3.975	52.385
Buchen-Typ	[ha]	36.827	41.039	62.266	140.131	-9.375	130.756
Eschen-Typ	[ha]	600	18.623	7.351	26.574	1.052	27.626
Birken-Typ	[ha]	-3.396	-4.600	22.434	14.439	-4.656	9.783
Erlen-Typ	[ha]	-3.081	4.876	6.541	8.337	-958	7.379
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	-2.301	-2.504	12.477	7.672	-4.250	3.422
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	699	23.880	31.562	56.141	4.345	60.486
Fichten-Typ	[ha]	-29.021	-29.313	43.850	-14.483	-213.192	-227.675
Tannen-Typ	[ha]	113	932	16.314	17.359	37	17.396
Douglasien-Typ	[ha]	5.326	10.348	27.340	43.014	2.430	45.444
Kiefern-Typ	[ha]	-38.746	16.392	15.065	-7.289	-79.776	-87.065
Lärchen-Typ	[ha]	-6.266	-2.599	14.208	5.343	-1.693	3.649
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	-2.015	12.035	28.654	38.674	0	38.674
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>-41.092</b>	<b>117.192</b>	<b>316.171</b>	<b>392.271</b>	<b>-310.010</b>	<b>82.261</b>



## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[%]	100%	106%	109%	107%	95%	106%
Buchen-Typ	[%]	110%	108%	111%	110%	96%	108%
Eschen-Typ	[%]	113%	118%	115%	117%	113%	117%
Birken-Typ	[%]	95%	95%	120%	105%	91%	103%
Erlen-Typ	[%]	81%	105%	115%	105%	98%	104%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[%]	79%	98%	125%	105%	88%	102%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[%]	105%	112%	130%	118%	115%	117%
Fichten-Typ	[%]	95%	97%	106%	99%	81%	93%
Tannen-Typ	[%]	100%	105%	121%	112%	101%	112%
Douglasien-Typ	[%]	115%	123%	147%	131%	107%	126%
Kiefern-Typ	[%]	86%	102%	104%	100%	93%	97%
Lärchen-Typ	[%]	86%	95%	116%	103%	93%	102%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[%]	89%	119%	114%	114%	0%	114%
<b>alle führenden Baumarten</b>	[%]	<b>97%</b>	<b>103%</b>	<b>111%</b>	<b>105%</b>	<b>89%</b>	<b>101%</b>

## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	410	3.068	2.141	5.203	560	5.506
Buchen-Typ	Sek	2.575	3.617	4.070	9.375	1.618	10.339
Eschen-Typ	Sek	42	891	437	1.302	80	1.348
Birken-Typ	Sek	414	622	788	1.690	321	1.900
Erlen-Typ	Sek	103	753	327	1.111	290	1.286
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	83	758	428	1.220	240	1.406
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	123	1.626	929	2.516	239	2.639
Fichten-Typ	Sek	3.457	5.843	5.209	13.279	5.646	17.320
Tannen-Typ	Sek	500	240	921	1.491	88	1.533
Douglasien-Typ	Sek	311	472	679	1.323	300	1.529
Kiefern-Typ	Sek	1.309	4.039	2.433	7.261	4.562	10.916
Lärchen-Typ	Sek	256	351	627	1.124	138	1.200
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	169	688	2.051	2.897	0	2.897
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>9.290</b>	<b>21.387</b>	<b>18.496</b>	<b>42.517</b>	<b>13.966</b>	<b>51.689</b>

Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

## 1.22.11 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung


Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	1.241	3.080	1.646	5.967	-431	5.537
Buchen-Typ	[ha]	823	817	1.241	2.881	-212	2.669
Eschen-Typ	[ha]	-206	604	617	1.016	0	1.016
Birken-Typ	[ha]	-823	-2.894	212	-3.505	-206	-3.710
Erlen-Typ	[ha]	-412	817	617	1.022	-617	405
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	-617	399	418	199	-6	193
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	-206	392	3.273	3.459	-6	3.453
Fichten-Typ	[ha]	3.087	4.109	3.099	10.295	-12.559	-2.263
Tannen-Typ	[ha]	206	0	0	206	412	617
Douglasien-Typ	[ha]	412	206	0	617	0	617
Kiefern-Typ	[ha]	-1.852	823	2.263	1.235	-3.723	-2.489
Lärchen-Typ	[ha]	206	206	611	1.022	0	1.022
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	-823	-206	2.868	1.839	0	1.839
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>1.035</b>	<b>8.353</b>	<b>16.867</b>	<b>26.255</b>	<b>-17.349</b>	<b>8.906</b>

**BWI 3: Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha]  
Freistaat Sachsen (alle Eigentumsarten)  
 nach Bestockungstyp der Hauptbestockung (OST) und Beimischung**

*Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil)*



## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[%]	143%	122%	114%	120%	89%	117%
Buchen-Typ	[%]	122%	128%	121%	123%	94%	117%
Eschen-Typ	[%]		133%	0%	149%	0%	149%
Birken-Typ	[%]	89%	73%	102%	89%	90%	89%
Erlen-Typ	[%]		123%	160%	121%	50%	107%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[%]	40%	113%	123%	103%	100%	102%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[%]	50%	105%	245%	131%	99%	128%
Fichten-Typ	[%]	111%	109%	109%	110%	87%	99%
Tannen-Typ	[%]						
Douglasien-Typ	[%]			100%	250%	0%	250%
Kiefern-Typ	[%]	79%	102%	115%	102%	95%	98%
Lärchen-Typ	[%]	109%	108%	111%	110%	100%	109%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[%]	33%	90%	141%	118%	0%	118%
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>102%</b>	<b>106%</b>	<b>117%</b>	<b>109%</b>	<b>91%</b>	<b>102%</b>

## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	24	95	84	188	25	207
Buchen-Typ	Sek	29	23	43	87	21	100
Eschen-Typ	Sek	1	14	3	17	0	17
Birken-Typ	Sek	58	61	91	190	15	201
Erlen-Typ	Sek	2	25	10	36	8	39
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	6	25	16	46	18	62
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	2	58	30	87	7	90
Fichten-Typ	Sek	191	295	225	652	495	1.037
Tannen-Typ	Sek	1	0	0	1	2	3
Douglasien-Typ	Sek	2	1	2	5	0	5
Kiefern-Typ	Sek	56	314	105	446	423	791
Lärchen-Typ	Sek	18	16	39	68	8	72
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	7	19	78	103	0	103
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>377</b>	<b>899</b>	<b>645</b>	<b>1.684</b>	<b>1.022</b>	<b>2.449</b>


Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

## 1.22.11 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	-206	0	-206	-412	0	-412
Buchen-Typ	[ha]	206	0	-206	0	0	0
Eschen-Typ	[ha]		0	0	0	0	0
Birken-Typ	[ha]	617	0	0	617	-6	611
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	0	0	0	0	0
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		-206	0	-206	0	-206
Fichten-Typ	[ha]	206	206	206	617	-412	206
Kiefern-Typ	[ha]	206	823	0	1.029	-1.029	0
Lärchen-Typ	[ha]					0	0
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		0	206	206	0	206
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>1.029</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>1.852</b>	<b>-1.447</b>	<b>405</b>



## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[%]		100%	0%	33%	0%	33%
Buchen-Typ	[%]				100%	100%	100%
Eschen-Typ	[%]		100%	0%	100%	0%	100%
Birken-Typ	[%]	160%	0%	100%	133%	99%	123%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[%]	100%	0%	0%	100%	0%	100%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[%]						
Fichten-Typ	[%]	150%	125%	0%	150%	71%	108%
Kiefern-Typ	[%]	133%	121%	100%	119%	93%	100%
Lärchen-Typ	[%]					100%	100%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[%]		100%	0%	200%	0%	200%
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>142%</b>	<b>115%</b>	<b>100%</b>	<b>118%</b>	<b>92%</b>	<b>101%</b>

## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	1	2	1	4	0	4
Buchen-Typ	Sek	1	0	1	1	1	2
Eschen-Typ	Sek		1	0	1	0	1
Birken-Typ	Sek	10	0	5	13	6	17
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	1	0	0	1	0	1
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		1	0	1	0	1
Fichten-Typ	Sek	3	6	1	9	7	14
Kiefern-Typ	Sek	6	27	6	38	79	103
Lärchen-Typ	Sek					1	1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		2	1	3	0	3
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>94</b>	<b>141</b>


Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

## 1.22.11 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	212	2.669	412	3.292	-617	2.675
Buchen-Typ	[ha]	823	0	412	1.235	-412	823
Eschen-Typ	[ha]		0	0	0	0	0
Birken-Typ	[ha]	-611	-412	0	-1.022	0	-1.022
Erlen-Typ	[ha]	-206	0	206	0	-206	-206
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	-206	412	206	206	412
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	-206	0	206	0	0	0
Fichten-Typ	[ha]	823	1.235	2.681	4.739	-4.527	212
Tannen-Typ	[ha]	206	0	0	206	206	412
Douglasien-Typ	[ha]		206	0	206	0	206
Kiefern-Typ	[ha]	-1.852	617	823	-412	206	-206
Lärchen-Typ	[ha]	206	206	0	412	0	412
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	-617	0	1.235	617	0	617
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>-1.222</b>	<b>4.315</b>	<b>6.385</b>	<b>9.478</b>	<b>-5.144</b>	<b>4.334</b>



## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[%]	126%	285%	110%	152%	57%	134%
Buchen-Typ	[%]	129%	100%	113%	117%	80%	109%
Eschen-Typ	[%]		100%	0%	100%	0%	100%
Birken-Typ	[%]	67%	75%	100%	87%	0%	87%
Erlen-Typ	[%]		100%	200%	100%	50%	86%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[%]	100%	75%	200%	114%	150%	122%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[%]		100%	117%	100%	0%	100%
Fichten-Typ	[%]	105%	106%	116%	108%	92%	100%
Tannen-Typ	[%]						
Douglasien-Typ	[%]			100%	200%	0%	200%
Kiefern-Typ	[%]	59%	105%	113%	98%	102%	99%
Lärchen-Typ	[%]	111%	125%	100%	107%	100%	106%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[%]	40%	100%	150%	117%	0%	117%
<b>alle führenden Baumarten</b>	[%]	<b>96%</b>	<b>110%</b>	<b>115%</b>	<b>108%</b>	<b>93%</b>	<b>102%</b>

## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	8	21	29	53	7	58
Buchen-Typ	Sek	22	8	22	49	12	55
Eschen-Typ	Sek		2	0	2	0	2
Birken-Typ	Sek	14	10	29	49	0	49
Erlen-Typ	Sek	1	5	3	9	3	9
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	2	6	6	14	4	18
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	11	10	19	0	19
Fichten-Typ	Sek	114	144	110	346	300	591
Tannen-Typ	Sek	1	0	0	1	1	2
Douglasien-Typ	Sek		1	1	2	0	2
Kiefern-Typ	Sek	24	79	46	138	67	195
Lärchen-Typ	Sek	15	6	20	39	5	40
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	6	2	29	37	0	37
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>193</b>	<b>289</b>	<b>272</b>	<b>673</b>	<b>399</b>	<b>974</b>


Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

## 1.22.11 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	0	1.235	823	2.058	-13	2.045
Buchen-Typ	[ha]	-206	206	412	412	-206	206
Eschen-Typ	[ha]	-206	399	206	399	0	399
Birken-Typ	[ha]	-206	-412	0	-617	405	-212
Erlen-Typ	[ha]		206	0	206	0	206
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		611	0	611	-206	405
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		-412	617	206	-412	-206
Fichten-Typ	[ha]	-617	1.852	206	1.440	-1.646	-206
Tannen-Typ	[ha]					206	206
Douglasien-Typ	[ha]	206	0	0	206	0	206
Kiefern-Typ	[ha]	-412	-823	0	-1.235	1.029	-206
Lärchen-Typ	[ha]		-206	0	-206	0	-206
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	-206	412	412	617	0	617
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>-1.646</b>	<b>3.067</b>	<b>2.675</b>	<b>4.096</b>	<b>-842</b>	<b>3.254</b>



## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[%]	100%	250%	200%	211%	98%	183%
Buchen-Typ	[%]	50%	200%	167%	133%	50%	113%
Eschen-Typ	[%]		294%	0%	197%	0%	197%
Birken-Typ	[%]	50%	67%	100%	79%	0%	93%
Erlen-Typ	[%]		150%	0%	150%	100%	133%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[%]			100%	397%	67%	149%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[%]		75%	200%	109%	33%	93%
Fichten-Typ	[%]	81%	147%	103%	111%	85%	99%
Tannen-Typ	[%]						
Douglasien-Typ	[%]						
Kiefern-Typ	[%]	33%	82%	100%	81%	131%	98%
Lärchen-Typ	[%]			100%	80%	0%	80%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[%]		300%	300%	200%	0%	200%
<b>alle führenden Baumarten</b>	[%]	<b>69%</b>	<b>123%</b>	<b>122%</b>	<b>113%</b>	<b>95%</b>	<b>107%</b>

## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	1	11	10	21	6	24
Buchen-Typ	Sek	3	3	5	11	3	12
Eschen-Typ	Sek	1	3	1	4	0	4
Birken-Typ	Sek	2	8	9	18	2	20
Erlen-Typ	Sek		3	0	3	1	4
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		3	2	5	4	8
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		9	7	16	4	16
Fichten-Typ	Sek	25	34	44	88	62	133
Tannen-Typ	Sek					1	1
Douglasien-Typ	Sek	1	0	0	1	0	1
Kiefern-Typ	Sek	4	27	11	39	24	61
Lärchen-Typ	Sek		1	5	6	0	6
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	1	4	4	9	0	9
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>37</b>	<b>103</b>	<b>88</b>	<b>196</b>	<b>107</b>	<b>269</b>


Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

## 1.22.11 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	1.235	-823	617	1.029	199	1.228
Buchen-Typ	[ha]	0	611	624	1.235	405	1.640
Eschen-Typ	[ha]		206	412	617	0	617
Birken-Typ	[ha]	-624	-2.071	212	-2.482	-604	-3.087
Erlen-Typ	[ha]	-206	611	412	817	-412	405
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	-617	-6	6	-617	-6	-624
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	0	1.010	2.450	3.459	405	3.865
Fichten-Typ	[ha]	2.675	817	6	3.498	-5.974	-2.476
Douglasien-Typ	[ha]	206	0	0	206	0	206
Kiefern-Typ	[ha]	206	206	1.440	1.852	-3.929	-2.077
Lärchen-Typ	[ha]	0	206	611	817	0	817
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		-617	1.016	399	0	399
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>2.874</b>	<b>148</b>	<b>7.806</b>	<b>10.829</b>	<b>-9.916</b>	<b>913</b>



## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[%]	175%	93%	109%	105%	111%	106%
Buchen-Typ	[%]	100%	142%	134%	133%	166%	138%
Eschen-Typ	[%]		117%	0%	150%	0%	150%
Birken-Typ	[%]	86%	73%	103%	87%	51%	85%
Erlen-Typ	[%]		125%	150%	123%	33%	110%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[%]		100%	101%	85%	100%	89%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[%]	100%	120%	695%	160%	297%	165%
Fichten-Typ	[%]	139%	105%	100%	110%	77%	96%
Douglasien-Typ	[%]			100%	200%	0%	200%
Kiefern-Typ	[%]	107%	101%	124%	105%	92%	98%
Lärchen-Typ	[%]	100%	114%	133%	122%	100%	120%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[%]		57%	124%	107%	0%	107%
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>116%</b>	<b>100%</b>	<b>119%</b>	<b>108%</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>

## 1.22.11 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L321mf\_0212\_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Bestockungstyp	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	15	64	47	118	12	129
Buchen-Typ	Sek	3	12	15	26	5	31
Eschen-Typ	Sek		9	2	11	0	11
Birken-Typ	Sek	32	46	50	117	8	123
Erlen-Typ	Sek	1	19	7	26	4	28
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	3	18	9	29	11	39
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	38	14	53	3	56
Fichten-Typ	Sek	53	119	71	225	140	330
Douglasien-Typ	Sek	1	0	1	2	0	2
Kiefern-Typ	Sek	22	198	45	252	268	470
Lärchen-Typ	Sek	4	9	15	25	2	27
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		11	44	55	0	55
<b>alle führenden Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>133</b>	<b>515</b>	<b>284</b>	<b>829</b>	<b>453</b>	<b>1.181</b>

Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]