

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-4.231	-851	-826	23	63	18	10	6	0	-5.789
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-6.005	-25.143	-26.689	-1.734	-1.429	-305	65	-33	133	-61.140
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	59	-29.653	-6.369	-11.902	-17.715	-4.193	662	1.607	545	-66.959
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	-136	-3.310	54.485	4.592	-24.612	-1.178	3.221	6.482	1.837	41.382
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	-9	335	39.137	31.077	2.613	17.167	7.791	13.461	6.770	118.343
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]		-488	11.710	16.270	8.750	17.617	9.250	12.255	13.132	88.496
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	9	-798	2.901	4.343	7.117	12.679	6.552	12.619	12.789	58.212
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	10	-109	732	2.023	2.753	4.749	4.498	5.130	10.408	30.195
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]		-256	-149	436	855	1.277	2.033	2.998	6.496	13.690
ab 90 cm	[1000 m³]	5	-208	267	896	639	1.052	96	2.895	5.356	10.998
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-10.298	-60.480	75.199	46.023	-20.966	48.883	34.178	57.421	57.467	227.428

BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

alle Eigentumsarten, alle Baumartengruppen Deutschland (alle Länder)

2002-2012: + 227 Mio. m³ (78 % o. 177 Mio. m³ > 80 J.)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten




BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Baumaltersklasse

alle Eigentumsarten, alle Baumartengruppen Deutschland (alle Länder)

2002-2012: + 227 Mio. m³ (78 % o. 177 Mio. m³ > 80 J.; 89 % > 50 cm.)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	4.408	5.975	1.648	421	102	22	3	1	0	10.813
10,0 - 19,9 cm	Sek	4.313	15.507	12.463	5.516	2.116	855	323	109	41	30.538
20,0 - 29,9 cm	Sek	618	11.218	17.082	11.946	7.163	3.585	1.474	545	205	37.871
30,0 - 39,9 cm	Sek	47	4.720	13.777	13.181	10.901	7.110	3.607	1.557	604	37.965
40,0 - 49,9 cm	Sek	7	1.179	6.811	9.329	10.237	8.323	5.186	2.776	1.300	31.684
50,0 - 59,9 cm	Sek		250	2.110	4.124	6.244	6.511	5.081	3.310	1.875	21.686
60,0 - 69,9 cm	Sek	1	79	588	1.278	2.525	3.492	3.390	2.726	1.908	12.502
70,0 - 79,9 cm	Sek	1	28	207	355	781	1.296	1.632	1.601	1.561	6.185
80,0 - 89,9 cm	Sek		17	91	110	242	388	611	775	1.045	2.862
ab 90 cm	Sek	1	11	62	77	110	179	254	373	783	1.585
alle BHD-Stufen	Sek	6.527	18.740	21.707	17.907	15.058	11.719	8.207	5.454	3.616	50.783

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-9,4%	+/-56,5%	+/-26,6%	+/-356,3%	+/-63,2%	+/-106,1%	+/-74,0%	+/-97,8%	+/-0,0%	+/-9,4%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-18,2%	+/-13,5%	+/-9,8%	+/-77,6%	+/-49,5%	+/-127,5%	+/-318,4%	+/-354,2%	+/-37,1%	+/-5,6%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-618,1%	+/-11,7%	+/-78,0%	+/-31,2%	+/-13,7%	+/-37,4%	+/-150,8%	+/-30,9%	+/-50,5%	+/-7,7%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]	+/-95,1%	+/-51,4%	+/-7,9%	+/-107,8%	+/-18,9%	+/-288,8%	+/-72,5%	+/-20,3%	+/-37,0%	+/-14,5%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]	+/-262,1%	+/-205,5%	+/-5,9%	+/-10,6%	+/-163,5%	+/-22,3%	+/-37,8%	+/-15,3%	+/-15,4%	+/-4,5%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]		+/-71,8%	+/-7,9%	+/-9,8%	+/-27,5%	+/-15,2%	+/-26,8%	+/-17,6%	+/-10,2%	+/-4,2%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]	+/-95,6%	+/-32,3%	+/-17,4%	+/-14,5%	+/-17,3%	+/-11,8%	+/-24,3%	+/-12,8%	+/-9,3%	+/-4,1%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]	+/-97,8%	+/-153,1%	+/-45,5%	+/-17,8%	+/-19,6%	+/-16,2%	+/-21,0%	+/-20,2%	+/-9,5%	+/-5,3%
80,0 - 89,9 cm	SE[%]		+/-65,0%	+/-186,9%	+/-48,9%	+/-40,9%	+/-31,8%	+/-26,9%	+/-20,0%	+/-10,8%	+/-7,5%
ab 90 cm	SE[%]	+/-99,2%	+/-67,0%	+/-125,3%	+/-36,2%	+/-44,4%	+/-30,7%	+/-586,2%	+/-21,9%	+/-10,1%	+/-7,8%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-14,4%	+/-11,0%	+/-13,7%	+/-23,8%	+/-54,0%	+/-19,8%	+/-23,5%	+/-10,9%	+/-6,8%	+/-5,1%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	73,1%	14,7%	14,3%	-0,4%	-1,1%	-0,3%	-0,2%	-0,1%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	9,8%	41,1%	43,7%	2,8%	2,3%	0,5%	-0,1%	0,1%	-0,2%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	-0,1%	44,3%	9,5%	17,8%	26,5%	6,3%	-1,0%	-2,4%	-0,8%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%	-0,3%	-8,0%	131,7%	11,1%	-59,5%	-2,8%	7,8%	15,7%	4,4%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%	0,0%	0,3%	33,1%	26,3%	2,2%	14,5%	6,6%	11,4%	5,7%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%		-0,6%	13,2%	18,4%	9,9%	19,9%	10,5%	13,8%	14,8%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%	0,0%	-1,4%	5,0%	7,5%	12,2%	21,8%	11,3%	21,7%	22,0%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%	0,0%	-0,4%	2,4%	6,7%	9,1%	15,7%	14,9%	17,0%	34,5%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%		-1,9%	-1,1%	3,2%	6,2%	9,3%	14,9%	21,9%	47,5%	100,0%
ab 90 cm	%	0,0%	-1,9%	2,4%	8,1%	5,8%	9,6%	0,9%	26,3%	48,7%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-4,5%	-26,6%	33,1%	20,2%	-9,2%	21,5%	15,0%	25,2%	25,3%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle AKL
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-489	121	-37	14	0	0	0	0	0	-392
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-562	735	-1.760	137	41	-78	-7	18	0	-1.477
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	78	1.426	-82	-919	-607	-217	25	324	-3	24
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	-8	247	5.487	-1.023	939	-92	683	634	90	6.956
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]		-65	2.487	988	3.122	2.245	1.670	396	187	11.030
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]		-18	490	435	1.373	1.881	1.311	-57	176	5.591
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]		19	44	127	402	636	821	15	302	2.365
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]		10	0	124	11	178	130	286	142	882
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]			7	0	-4	83	177	16	212	491
ab 90 cm	[1000 m³]				0	40	18	74	97	182	411
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-982	2.475	6.636	-116	5.315	4.654	4.883	1.728	1.289	25.882

BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

alle Eigentumsarten, alle Baumartengruppen Freistaat Sachsen


2002-2012: + 25,9 Mio. m³ (69 % o. 17,9 Mio. m³ > 80 J.)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Baumaltersklasse

alle Eigentumsarten, alle Baumartengruppen Freistaat Sachsen

2002-2012: + 25,9 Mio. m³ (69 % o. 17,9 Mio. m³ > 80 J.)*Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten*

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	272	324	75	9	0	0	0	0	0	573
10,0 - 19,9 cm	Sek	260	832	651	251	86	39	15	2	0	1.559
20,0 - 29,9 cm	Sek	39	541	861	539	397	198	76	20	2	1.924
30,0 - 39,9 cm	Sek	1	163	640	589	552	334	143	40	9	1.741
40,0 - 49,9 cm	Sek		25	269	355	477	324	154	50	14	1.224
50,0 - 59,9 cm	Sek		3	65	125	265	218	122	58	19	674
60,0 - 69,9 cm	Sek		2	13	32	84	97	85	45	21	306
70,0 - 79,9 cm	Sek		1	4	9	22	30	35	35	24	133
80,0 - 89,9 cm	Sek			2	0	6	12	17	19	26	69
ab 90 cm	Sek				1	2	3	6	13	33	54
alle BHD-Stufen	Sek	386	943	994	713	679	460	259	121	81	2.377

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-16,0%	+/-78,3%	+/-104,6%	+/-101,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-25,9%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-40,9%	+/-87,2%	+/-26,0%	+/-163,0%	+/-279,2%	+/-91,3%	+/-430,9%	+/-73,1%	+/-0,0%	+/-41,4%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-110,3%	+/-43,0%	+/-997,0%	+/-76,5%	+/-82,6%	+/-134,6%	+/-884,8%	+/-37,6%	+/-477,8%	+/-4057,6%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]	+/-96,9%	+/-88,7%	+/-13,4%	+/-72,9%	+/-88,9%	+/-624,3%	+/-58,4%	+/-41,5%	+/-71,5%	+/-14,3%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]		+/-154,4%	+/-14,0%	+/-43,5%	+/-22,4%	+/-27,4%	+/-20,8%	+/-54,5%	+/-52,3%	+/-6,9%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]		+/-127,4%	+/-29,1%	+/-39,2%	+/-24,6%	+/-24,4%	+/-22,8%	+/-371,4%	+/-55,1%	+/-8,9%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]		+/-68,6%	+/-99,0%	+/-61,0%	+/-40,0%	+/-32,3%	+/-21,3%	+/-1056,5%	+/-40,9%	+/-12,6%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]		+/-96,9%	+/-48138,9%	+/-42,2%	+/-625,8%	+/-58,7%	+/-83,1%	+/-50,2%	+/-68,3%	+/-22,5%
80,0 - 89,9 cm	SE[%]			+/-170,3%	+/-0,0%	+/-949,4%	+/-71,8%	+/-60,5%	+/-479,3%	+/-39,4%	+/-29,9%
ab 90 cm	SE[%]				+/-96,9%	+/-76,0%	+/-193,4%	+/-55,5%	+/-57,8%	+/-36,1%	+/-23,3%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-31,1%	+/-47,5%	+/-23,5%	+/-1425,6%	+/-35,7%	+/-34,2%	+/-21,7%	+/-44,0%	+/-28,6%	+/-6,4%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	124,9%	-30,8%	9,5%	-3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	38,1%	-49,8%	119,2%	-9,3%	-2,7%	5,3%	0,5%	-1,2%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	323,1%	5919,7%	-342,1%	-3814,2%	-2520,9%	-900,9%	103,7%	1343,9%	-12,3%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%	-0,1%	3,5%	78,9%	-14,7%	13,5%	-1,3%	9,8%	9,1%	1,3%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%		-0,6%	22,5%	9,0%	28,3%	20,4%	15,1%	3,6%	1,7%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%		-0,3%	8,8%	7,8%	24,6%	33,6%	23,4%	-1,0%	3,2%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%		0,8%	1,9%	5,4%	17,0%	26,9%	34,7%	0,6%	12,8%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%		1,1%	0,0%	14,1%	1,2%	20,2%	14,8%	32,4%	16,1%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%			1,5%	0,0%	-0,8%	16,9%	36,0%	3,3%	43,2%	100,0%
ab 90 cm	%				0,0%	9,7%	4,3%	18,0%	23,6%	44,4%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-3,8%	9,6%	25,6%	-0,4%	20,5%	18,0%	18,9%	6,7%	5,0%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: Bdat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle AKL
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-53	63	-29	6	0	0	0	0	0	-12
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-20	156	-242	93	-50	0	-1	0	0	-64
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	-19	-70	-6	260	-177	37	-99	61	0	-14
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	0	-7	290	270	-33	-83	-70	64	14	446
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	0	0	32	60	66	32	2	19	46	258
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	0	0	11	21	20	-63	15	0	8	11
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	1	-1	0	35	-13	0	22
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	0	-19	21	-13	26	14
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
ab 90 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	0	-21	23	-20	23	5
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-92	142	56	712	-160	-117	-75	97	117	680

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	18	21	7	2	0	0	0	0	0	38
10,0 - 19,9 cm	Sek	17	54	36	15	4	2	2	0	0	94
20,0 - 29,9 cm	Sek	2	22	50	28	20	7	10	2	0	101
30,0 - 39,9 cm	Sek		4	24	24	20	11	12	5	2	79
40,0 - 49,9 cm	Sek			10	9	9	6	8	6	3	43
50,0 - 59,9 cm	Sek			1	3	2	3	4	0	1	12
60,0 - 69,9 cm	Sek				1	1	0	2	1	0	5
70,0 - 79,9 cm	Sek						1	1	1	1	2
80,0 - 89,9 cm	Sek					1	0	0	0	0	1
ab 90 cm	Sek						1	1	1	1	2
alle BHD-Stufen	Sek	28	58	56	34	25	15	18	10	6	136

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-54,5%	+/-68,1%	+/-51,1%	+/-70,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-243,2%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-334,3%	+/-98,3%	+/-43,7%	+/-54,2%	+/-61,9%	+/-1912,1%	+/-821,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-245,3%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-117,0%	+/-131,5%	+/-3587,4%	+/-49,8%	+/-58,9%	+/-189,2%	+/-76,1%	+/-70,3%	+/-0,0%	+/-1364,3%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]		+/-352,3%	+/-66,9%	+/-35,8%	+/-170,8%	+/-89,5%	+/-131,2%	+/-123,3%	+/-96,9%	+/-49,8%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]			+/-143,0%	+/-89,1%	+/-98,7%	+/-159,3%	+/-1156,4%	+/-223,5%	+/-71,6%	+/-44,5%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]			+/-96,9%	+/-113,4%	+/-68,5%	+/-57,9%	+/-205,4%	+/-0,0%	+/-96,9%	+/-409,1%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]				+/-96,9%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-68,6%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-127,2%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]						+/-96,9%	+/-96,9%	+/-96,9%	+/-96,9%	+/-86,0%
80,0 - 89,9 cm	SE[%]					+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-96,9%
ab 90 cm	SE[%]						+/-96,9%	+/-96,9%	+/-96,9%	+/-96,9%	+/-96,9%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-89,4%	+/-171,4%	+/-679,5%	+/-34,4%	+/-84,1%	+/-118,9%	+/-214,4%	+/-151,7%	+/-53,6%	+/-47,1%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	437,7%	-525,9%	240,2%	-52,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	31,3%	-244,4%	379,4%	-146,3%	79,1%	-0,7%	1,7%	0,0%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	138,7%	501,0%	40,1%	-1849,1%	1255,6%	-262,9%	707,0%	-430,5%	0,0%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%		-1,5%	65,0%	60,6%	-7,3%	-18,6%	-15,7%	14,3%	3,2%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%			12,5%	23,3%	25,8%	12,4%	0,9%	7,3%	17,9%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%			97,8%	184,3%	177,1%	-561,4%	129,8%	0,0%	72,4%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%				6,4%	-5,5%	0,0%	158,7%	-59,7%	0,0%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%						-135,3%	147,4%	-92,3%	180,3%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%					100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
ab 90 cm	%						-470,0%	508,9%	-446,5%	507,6%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-13,6%	20,9%	8,3%	104,7%	-23,5%	-17,3%	-11,0%	14,3%	17,2%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle AKL
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-121	22	13	-2	0	0	0	0	0	-87
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-300	242	-1.129	258	12	-31	-14	12	0	-951
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	64	181	-913	121	-645	-134	31	30	-12	-1.277
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	0	-38	3.459	-97	-326	-301	231	194	4	3.126
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	0	-10	1.505	337	1.318	1.304	635	190	50	5.329
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	0	9	313	77	764	1.284	725	-60	41	3.154
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	0	19	47	57	233	413	314	180	-19	1.244
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	0	10	11	39	61	51	19	174	42	407
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	7	-27	109	8	61	158
ab 90 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	10	25	20	63	41	159
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-358	436	3.306	790	1.434	2.584	2.069	792	208	11.262


BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Staatswald-Land, alle Baumartengruppen Freistaat Sachsen

2002-2012: + 11,3 Mio. m³ (63 % o. 7,1 Mio. m³ > 80 J.; 93 % > 45 cm; 46 % > 50 cm)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und BaumaltersklasseStaatswald-Land, alle Baumartengruppen Freistaat Sachsen2002-2012: + 11,3 Mio. m³ (63 % o. 7,1 Mio. m³ > 80 J.)*Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten*

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	85	105	27	1	0	0	0	0	0	189
10,0 - 19,9 cm	Sek	87	285	258	87	26	8	1	1	0	562
20,0 - 29,9 cm	Sek	14	216	358	178	148	66	11	4	1	764
30,0 - 39,9 cm	Sek		74	298	212	230	139	37	14	3	742
40,0 - 49,9 cm	Sek		10	133	142	222	158	55	21	5	563
50,0 - 59,9 cm	Sek		1	33	59	130	105	46	29	6	331
60,0 - 69,9 cm	Sek		2	5	15	37	43	30	24	9	138
70,0 - 79,9 cm	Sek		1	1	3	8	13	10	16	11	53
80,0 - 89,9 cm	Sek					1	4	9	8	10	27
ab 90 cm	Sek					1	1	1	8	16	26
alle BHD-Stufen	Sek	122	333	405	253	273	185	80	48	33	960

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-28,6%	+/-169,3%	+/-166,7%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-52,9%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-40,7%	+/-142,7%	+/-26,3%	+/-58,0%	+/-347,9%	+/-61,0%	+/-96,9%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-38,1%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-93,4%	+/-213,2%	+/-58,2%	+/-357,5%	+/-46,6%	+/-94,4%	+/-196,9%	+/-52,6%	+/-96,9%	+/-50,2%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]		+/-372,0%	+/-15,7%	+/-507,8%	+/-172,4%	+/-129,0%	+/-97,3%	+/-69,1%	+/-379,9%	+/-23,2%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]		+/-260,3%	+/-18,3%	+/-94,4%	+/-41,3%	+/-37,4%	+/-36,0%	+/-77,2%	+/-137,0%	+/-11,8%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]		+/-96,9%	+/-40,5%	+/-162,7%	+/-36,0%	+/-30,4%	+/-30,9%	+/-220,0%	+/-105,3%	+/-13,2%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]		+/-68,6%	+/-69,0%	+/-90,8%	+/-48,0%	+/-41,5%	+/-32,9%	+/-63,9%	+/-180,3%	+/-18,1%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]		+/-96,9%	+/-96,9%	+/-55,9%	+/-71,4%	+/-126,3%	+/-301,7%	+/-71,8%	+/-100,9%	+/-33,7%
80,0 - 89,9 cm	SE[%]					+/-96,9%	+/-128,5%	+/-69,0%	+/-642,4%	+/-73,5%	+/-54,8%
ab 90 cm	SE[%]					+/-96,9%	+/-96,9%	+/-96,9%	+/-72,2%	+/-73,1%	+/-42,1%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-47,6%	+/-164,1%	+/-31,4%	+/-143,3%	+/-95,1%	+/-47,5%	+/-32,1%	+/-54,7%	+/-46,2%	+/-12,1%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	138,3%	-25,7%	-14,6%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	31,6%	-25,5%	118,8%	-27,1%	-1,3%	3,2%	1,5%	-1,3%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	-5,0%	-14,2%	71,5%	-9,5%	50,5%	10,5%	-2,4%	-2,4%	0,9%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%		-1,2%	110,7%	-3,1%	-10,4%	-9,6%	7,4%	6,2%	0,1%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%		-0,2%	28,3%	6,3%	24,7%	24,5%	11,9%	3,6%	0,9%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%		0,3%	9,9%	2,5%	24,2%	40,7%	23,0%	-1,9%	1,3%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%		1,5%	3,8%	4,6%	18,7%	33,2%	25,2%	14,5%	-1,5%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%		2,5%	2,7%	9,6%	15,0%	12,6%	4,6%	42,8%	10,2%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%					4,4%	-17,3%	68,9%	5,2%	38,7%	100,0%
ab 90 cm	%					6,5%	15,7%	12,5%	39,6%	25,8%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-3,2%	3,9%	29,4%	7,0%	12,7%	22,9%	18,4%	7,0%	1,8%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-68	8	6	0	0	0	0	0	0	-54
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-96	179	-502	-47	9	-25	0	0	0	-481
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	79	119	-653	-578	-666	-194	8	11	0	-1.874
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	0	-67	2.723	-157	-842	-298	8	116	0	1.484
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	0	2	1.258	294	592	1.172	517	142	0	3.977
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	0	0	285	78	427	1.241	534	31	-13	2.584
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	0	0	15	36	87	400	147	122	0	808
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	0	10	0	0	17	117	-24	89	0	209
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	0	8	41	0	0	49
ab 90 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-84	251	3.132	-374	-375	2.420	1.232	522	-13	6.712


BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³; Vfm] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Staatswald-Land, Fichte Freistaat Sachsen

2002-2012: + 6,7 Mio. m³ (56 % o. 3,8 Mio. m³ > 80 J.)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³, Vfm] 2002-2012 nach BaumaltersklasseStaatswald-Land, Fichte Freistaat Sachsen2002-2012: + 6,7 Mio. m³ (56 % o. 3,8 Mio. m³ > 80 J.)*Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten*

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	44	45	16	0	0	0	0	0	0	92
10,0 - 19,9 cm	Sek	53	150	128	42	19	5	0	0	0	315
20,0 - 29,9 cm	Sek	10	122	194	100	116	49	4	1	0	479
30,0 - 39,9 cm	Sek		44	174	106	175	102	15	4	0	489
40,0 - 49,9 cm	Sek		6	97	76	152	110	26	4	0	378
50,0 - 59,9 cm	Sek			20	28	88	82	27	5	1	215
60,0 - 69,9 cm	Sek			1	3	24	30	14	6	0	69
70,0 - 79,9 cm	Sek		1	0	0	2	7	3	2	0	13
80,0 - 89,9 cm	Sek						1	3	0	0	4
ab 90 cm	Sek								1	0	1
alle BHD-Stufen	Sek	68	177	220	132	197	126	36	8	1	645

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-40,4%	+/-265,9%	+/-291,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,4%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-103,8%	+/-135,3%	+/-37,2%	+/-182,0%	+/-358,9%	+/-54,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-54,1%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-70,3%	+/-274,7%	+/-60,5%	+/-50,7%	+/-39,2%	+/-52,3%	+/-518,7%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-27,6%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]		+/-155,3%	+/-16,8%	+/-250,1%	+/-59,9%	+/-110,4%	+/-2063,6%	+/-74,0%	+/-0,0%	+/-41,0%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]		+/-1066,8%	+/-18,1%	+/-88,0%	+/-82,7%	+/-38,8%	+/-35,5%	+/-55,7%	+/-0,0%	+/-13,3%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]			+/-32,0%	+/-118,9%	+/-59,1%	+/-30,3%	+/-38,6%	+/-101,0%	+/-96,9%	+/-14,7%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]			+/-96,9%	+/-56,3%	+/-104,1%	+/-38,3%	+/-52,8%	+/-46,3%	+/-0,0%	+/-20,7%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]		+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-155,6%	+/-41,6%	+/-196,1%	+/-75,9%	+/-0,0%	+/-28,8%
80,0 - 89,9 cm	SE[%]						+/-96,9%	+/-104,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-89,2%
ab 90 cm	SE[%]								+/-96,9%	+/-0,0%	+/-96,9%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-172,3%	+/-222,0%	+/-24,9%	+/-227,6%	+/-321,4%	+/-46,2%	+/-43,9%	+/-43,8%	+/-96,9%	+/-15,8%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	125,6%	-15,3%	-10,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	19,9%	-37,3%	104,3%	9,7%	-1,9%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	-4,2%	-6,3%	34,8%	30,9%	35,5%	10,4%	-0,4%	-0,6%	0,0%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%		-4,5%	183,5%	-10,6%	-56,7%	-20,1%	0,6%	7,8%	0,0%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%		0,1%	31,6%	7,4%	14,9%	29,5%	13,0%	3,6%	0,0%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%			11,0%	3,0%	16,5%	48,0%	20,7%	1,2%	-0,5%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%			1,9%	4,5%	10,8%	49,5%	18,2%	15,1%	0,0%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%		4,8%	0,0%	0,0%	8,3%	55,9%	-11,4%	42,3%	0,0%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%						15,8%	84,2%	0,0%	0,0%	100,0%
ab 90 cm	%								100,0%	0,0%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-1,3%	3,7%	46,7%	-5,6%	-5,6%	36,1%	18,4%	7,8%	-0,2%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle AKL
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-27	0	-14	0	0	0	0	0	0	-42
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-36	71	-449	277	-28	-5	0	0	0	-171
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	-3	163	-120	509	-88	66	41	0	0	568
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	0	-6	461	-35	44	-2	267	26	0	754
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	0	7	57	-76	194	154	158	63	0	559
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	0	0	23	-41	50	42	60	20	0	154
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	23	17	21	12	0	73
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-66	235	-43	635	210	271	548	121	0	1.910


BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Staatsswald-Land, Kiefer Freistaat Sachsen

2002-2012: + 1,91 Mio. m³ (60 % o. 1,1 Mio. m³ > 80 J.)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach BaumaltersklasseStaatswald-Land, Kiefer Freistaat Sachsen2002-2012: + 1,91 Mio. m³ (60 % o. 1,1 Mio. m³ > 80 J.)*Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten*

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	11	27	4	0	0	0	0	0	0	38
10,0 - 19,9 cm	Sek	7	53	61	22	3	3	0	0	0	119
20,0 - 29,9 cm	Sek	2	44	96	41	22	17	6	0	0	179
30,0 - 39,9 cm	Sek		9	69	59	55	39	16	3	0	190
40,0 - 49,9 cm	Sek		1	9	28	44	38	19	3	0	106
50,0 - 59,9 cm	Sek			2	3	20	13	6	7	0	39
60,0 - 69,9 cm	Sek					2	4	1	1	0	8
70,0 - 79,9 cm	Sek					1	0	0	0	0	1
alle BHD-Stufen	Sek	14	66	117	76	76	54	21	10	0	294

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-41,1%	+/-3960,1%	+/-59,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-47,7%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-97,7%	+/-267,6%	+/-40,2%	+/-39,6%	+/-76,5%	+/-236,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-103,7%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-293,3%	+/-98,2%	+/-206,9%	+/-49,1%	+/-133,9%	+/-111,6%	+/-84,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-48,1%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]		+/-602,8%	+/-37,7%	+/-504,0%	+/-387,2%	+/-8346,9%	+/-39,9%	+/-70,5%	+/-0,0%	+/-34,0%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]		+/-96,9%	+/-60,7%	+/-114,1%	+/-70,0%	+/-96,0%	+/-66,6%	+/-84,7%	+/-0,0%	+/-26,4%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]			+/-68,8%	+/-58,3%	+/-104,5%	+/-92,3%	+/-74,4%	+/-172,0%	+/-0,0%	+/-40,1%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]					+/-69,9%	+/-73,4%	+/-96,9%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-42,3%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]					+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-96,9%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-66,5%	+/-141,0%	+/-1054,8%	+/-79,4%	+/-170,6%	+/-138,4%	+/-45,3%	+/-76,6%	+/-0,0%	+/-26,1%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	64,7%	1,1%	34,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	21,3%	-41,5%	262,8%	-162,4%	16,7%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	-0,5%	28,7%	-21,2%	89,7%	-15,5%	11,6%	7,3%	0,0%	0,0%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%		-0,8%	61,2%	-4,7%	5,8%	-0,3%	35,4%	3,4%	0,0%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%		1,3%	10,2%	-13,6%	34,7%	27,6%	28,4%	11,4%	0,0%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%			14,7%	-26,5%	32,4%	27,1%	39,4%	13,0%	0,0%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%					32,0%	23,6%	28,4%	16,0%	0,0%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%					100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-3,5%	12,3%	-2,2%	33,2%	11,0%	14,2%	28,7%	6,3%	0,0%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle AKL
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-17	-56	-21	0	0	0	0	0	0	-94
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-24	327	-80	-31	1	2	-9	0	0	187
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	-14	422	-152	-424	-166	-96	1	-8	9	-430
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	-8	120	165	-570	35	-130	55	-34	58	-309
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	0	-8	177	-11	402	182	142	1	67	952
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	0	0	11	36	246	257	142	-37	36	691
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	24	127	49	86	-77	117	327
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	0	0	-10	19	24	43	51	42	10	179
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	0	0	-5	0	0	0	0	0	46	42
ab 90 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	0	0	17	0	39	56
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-63	805	86	-957	669	307	486	-113	383	1.602


BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Körperschaftswald, alle Baumartengruppen Freistaat Sachsen

2002-2012: + 1,6 Mio. m³

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach BaumaltersklasseKörperschaftswald, alle Baumartengruppen Freistaat Sachsen2002-2012: + 1,6 Mio. m³*Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten*

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	30	22	6	0	0	0	0	0	0	56
10,0 - 19,9 cm	Sek	25	73	53	17	5	2	1	0	0	142
20,0 - 29,9 cm	Sek	8	46	76	65	39	20	7	2	1	201
30,0 - 39,9 cm	Sek	1	18	55	68	68	31	11	3	2	187
40,0 - 49,9 cm	Sek		3	24	57	59	31	15	6	3	138
50,0 - 59,9 cm	Sek			8	17	38	20	14	8	6	90
60,0 - 69,9 cm	Sek				5	11	8	7	5	5	33
70,0 - 79,9 cm	Sek			2	1	3	2	3	5	3	18
80,0 - 89,9 cm	Sek			1	0	0	0	0	0	4	5
ab 90 cm	Sek				1	0	0	1	0	3	5
alle BHD-Stufen	Sek	42	84	90	83	77	42	26	11	10	259

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-141,3%	+/-62,4%	+/-75,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-48,1%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-250,6%	+/-67,1%	+/-159,8%	+/-152,9%	+/-863,3%	+/-468,0%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-127,3%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-309,6%	+/-40,9%	+/-137,5%	+/-59,5%	+/-83,0%	+/-106,1%	+/-3487,2%	+/-247,1%	+/-96,9%	+/-81,7%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]	+/-96,9%	+/-53,2%	+/-109,5%	+/-53,9%	+/-942,5%	+/-153,3%	+/-258,9%	+/-172,4%	+/-96,9%	+/-120,6%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]		+/-170,0%	+/-50,2%	+/-1298,0%	+/-72,6%	+/-127,6%	+/-78,0%	+/-8238,3%	+/-89,1%	+/-25,1%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]			+/-309,3%	+/-144,6%	+/-41,5%	+/-49,1%	+/-70,9%	+/-173,5%	+/-135,6%	+/-24,7%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]				+/-143,7%	+/-39,2%	+/-87,9%	+/-47,1%	+/-71,9%	+/-60,3%	+/-30,3%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]			+/-119,6%	+/-96,9%	+/-62,1%	+/-74,1%	+/-56,2%	+/-86,2%	+/-301,5%	+/-34,9%
80,0 - 89,9 cm	SE[%]			+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-108,7%	+/-121,1%
ab 90 cm	SE[%]				+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-87,1%	+/-67,5%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-154,8%	+/-40,9%	+/-476,3%	+/-65,6%	+/-108,1%	+/-173,1%	+/-67,1%	+/-255,6%	+/-67,9%	+/-44,2%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	18,1%	59,4%	22,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	-12,9%	174,7%	-42,5%	-16,4%	0,7%	1,1%	-4,6%	0,0%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	3,4%	-98,1%	35,3%	98,6%	38,7%	22,4%	-0,2%	2,0%	-2,0%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%	2,6%	-38,7%	-53,3%	184,4%	-11,2%	42,1%	-17,7%	10,9%	-18,9%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%		-0,9%	18,6%	-1,2%	42,3%	19,1%	14,9%	0,1%	7,0%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%			1,6%	5,2%	35,5%	37,2%	20,6%	-5,4%	5,3%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%				7,4%	38,9%	15,1%	26,4%	-23,6%	35,7%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%			-5,6%	10,4%	13,4%	24,0%	28,4%	23,5%	5,8%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%			-10,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	110,9%	100,0%
ab 90 cm	%				0,2%	0,0%	0,0%	29,8%	0,0%	70,0%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-4,0%	50,2%	5,4%	-59,8%	41,8%	19,2%	30,3%	-7,1%	23,9%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle AKL
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-298	90	0	10	0	0	0	0	0	-198
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-218	10	-309	-183	77	-50	17	6	0	-650
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	48	894	988	-876	380	-23	93	242	0	1.745
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	0	172	1.573	-625	1.262	423	467	410	13	3.694
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	0	-47	772	602	1.335	727	891	186	24	4.491
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	0	-27	155	301	343	403	429	40	91	1.734
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	0	0	-3	44	43	173	386	-75	204	772
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	0	0	-1	66	-74	103	40	83	64	281
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	0	0	12	0	-26	110	68	8	105	276
ab 90 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	29	14	15	54	80	192
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-468	1.092	3.188	-661	3.371	1.880	2.404	952	580	12.338

BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse


Privatwald, alle Baumartengruppen Freistaat Sachsen

2002-2012: + 12,3 Mio. m³ (75 % o. 9,2 Mio. m³ > 80 J.; 63% > 40 cm; 26 % > 50 cm)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Baumaltersklasse
Privatwald, alle Baumartengruppen Freistaat Sachsen
2002-2012: + 12,3 Mio. m³ (75 % o. 9,2 Mio. m³ > 80 J.; 63% > 40 cm; 26 % > 50 cm)
Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	140	180	35	6	0	0	0	0	0	300
10,0 - 19,9 cm	Sek	131	431	312	132	52	28	11	1	0	806
20,0 - 29,9 cm	Sek	15	262	391	273	198	108	48	12	0	922
30,0 - 39,9 cm	Sek		69	273	286	246	159	84	18	2	791
40,0 - 49,9 cm	Sek		12	104	150	198	133	76	19	3	520
50,0 - 59,9 cm	Sek		2	24	47	100	92	59	22	6	263
60,0 - 69,9 cm	Sek			8	12	36	46	46	17	7	138
70,0 - 79,9 cm	Sek			1	5	12	14	21	14	9	64
80,0 - 89,9 cm	Sek			1	0	4	8	8	11	12	36
ab 90 cm	Sek					1	1	3	4	13	21
alle BHD-Stufen	Sek	195	486	469	352	320	225	138	55	33	1.127

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-20,0%	+/-74,7%	+/-22657,8%	+/-141,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-38,0%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-79,2%	+/-4985,8%	+/-100,6%	+/-83,2%	+/-128,9%	+/-136,4%	+/-148,3%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-70,6%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-75,1%	+/-48,1%	+/-57,2%	+/-54,5%	+/-98,3%	+/-1017,6%	+/-193,2%	+/-46,0%	+/-0,0%	+/-38,9%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]		+/-89,4%	+/-28,5%	+/-72,2%	+/-44,5%	+/-92,9%	+/-57,4%	+/-49,8%	+/-171,0%	+/-17,9%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]		+/-204,5%	+/-25,4%	+/-40,4%	+/-30,2%	+/-44,4%	+/-26,3%	+/-65,6%	+/-68,7%	+/-11,5%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]		+/-76,4%	+/-42,8%	+/-34,0%	+/-60,9%	+/-54,5%	+/-40,6%	+/-395,2%	+/-70,3%	+/-16,4%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]			+/-954,5%	+/-132,4%	+/-245,7%	+/-60,4%	+/-33,9%	+/-131,9%	+/-46,9%	+/-25,9%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]			+/-96,9%	+/-66,2%	+/-75,9%	+/-71,1%	+/-215,5%	+/-79,5%	+/-121,0%	+/-50,9%
80,0 - 89,9 cm	SE[%]			+/-96,9%	+/-0,0%	+/-138,1%	+/-40,0%	+/-112,3%	+/-713,1%	+/-47,0%	+/-38,0%
ab 90 cm	SE[%]					+/-96,9%	+/-96,9%	+/-163,3%	+/-48,5%	+/-53,3%	+/-31,8%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-46,7%	+/-78,3%	+/-34,7%	+/-152,8%	+/-38,3%	+/-50,6%	+/-30,1%	+/-57,4%	+/-40,2%	+/-12,1%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	150,4%	-45,6%	-0,1%	-4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	33,5%	-1,5%	47,5%	28,1%	-11,9%	7,6%	-2,5%	-0,9%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	2,8%	51,2%	56,6%	-50,2%	21,8%	-1,3%	5,3%	13,8%	0,0%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%		4,6%	42,6%	-16,9%	34,2%	11,4%	12,6%	11,1%	0,3%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%		-1,0%	17,2%	13,4%	29,7%	16,2%	19,8%	4,1%	0,5%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%		-1,6%	9,0%	17,3%	19,8%	23,2%	24,7%	2,3%	5,2%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%			-0,4%	5,7%	5,6%	22,4%	50,1%	-9,7%	26,4%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%			-0,3%	23,6%	-26,3%	36,6%	14,1%	29,5%	22,8%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%			4,2%	0,0%	-9,4%	39,9%	24,5%	2,9%	37,9%	100,0%
ab 90 cm	%					15,4%	7,3%	7,6%	28,2%	41,5%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-3,8%	8,9%	25,8%	-5,4%	27,3%	15,2%	19,5%	7,7%	4,7%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-131	31	-14	-4	0	0	0	0	0	-118
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-124	-313	-286	-111	-4	-79	16	6	0	-895
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	11	182	727	-524	-20	-107	17	249	0	535
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	0	22	341	-244	361	490	285	268	0	1.521
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	0	0	133	118	339	200	376	114	0	1.281
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	-1	71	57	76	33	14	251
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	-63	-14	0	0	0	-77
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	-9	0	0	0	0	-9
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-243	-79	900	-766	676	546	770	671	14	2.489


BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Privatwald, Kiefer Freistaat Sachsen

2002-2012: + 2,489 Mio. m³ (108 % o. 2,7 Mio. m³ > 80 J.; 58 % > 40 cm; 7 % > 50 cm)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach BaumaltersklassePrivatwald, Kiefer Freistaat Sachsen2002-2012: + 2,489 Mio. m³ (108 % o. 2,7 Mio. m³ > 80 J.; 58 % > 40 cm; 7 % > 50 cm)*Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten*

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	41	74	15	1	0	0	0	0	0	108
10,0 - 19,9 cm	Sek	43	134	110	41	26	15	8	1	0	293
20,0 - 29,9 cm	Sek	1	85	142	107	99	68	35	12	0	411
30,0 - 39,9 cm	Sek		8	91	106	116	93	54	15	0	351
40,0 - 49,9 cm	Sek			14	30	67	62	34	9	0	174
50,0 - 59,9 cm	Sek				3	9	13	10	3	1	31
60,0 - 69,9 cm	Sek					3	1	0	0	0	4
70,0 - 79,9 cm	Sek					2	0	0	0	0	2
alle BHD-Stufen	Sek	56	153	164	129	140	110	66	21	1	554

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-31,5%	+/-183,9%	+/-150,9%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-46,6%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-79,5%	+/-98,3%	+/-76,0%	+/-83,7%	+/-1997,7%	+/-72,0%	+/-135,7%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-32,8%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-96,9%	+/-113,8%	+/-48,3%	+/-68,8%	+/-1474,3%	+/-184,5%	+/-937,4%	+/-41,5%	+/-0,0%	+/-79,2%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]		+/-170,5%	+/-56,4%	+/-102,3%	+/-97,2%	+/-63,3%	+/-69,6%	+/-45,4%	+/-0,0%	+/-22,4%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]			+/-33,1%	+/-68,4%	+/-41,6%	+/-75,7%	+/-31,6%	+/-47,7%	+/-0,0%	+/-15,7%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]				+/-1854,4%	+/-47,7%	+/-96,6%	+/-58,5%	+/-70,7%	+/-96,9%	+/-24,7%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]					+/-77,2%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-65,3%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]					+/-202,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-202,8%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-51,4%	+/-561,5%	+/-64,6%	+/-77,6%	+/-101,9%	+/-106,1%	+/-52,9%	+/-38,5%	+/-96,9%	+/-26,8%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm
Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	111,0%	-25,9%	11,8%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	13,8%	35,0%	31,9%	12,4%	0,5%	8,8%	-1,8%	-0,6%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	2,1%	34,1%	135,8%	-97,9%	-3,7%	-20,0%	3,2%	46,6%	0,0%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%		1,4%	22,4%	-16,1%	23,7%	32,2%	18,7%	17,6%	0,0%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%			10,4%	9,2%	26,5%	15,7%	29,4%	8,9%	0,0%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%				-0,4%	28,5%	22,7%	30,3%	13,3%	5,6%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%					81,3%	18,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%					100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-9,8%	-3,2%	36,2%	-30,8%	27,1%	22,0%	31,0%	26,9%	0,6%	100,0%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)


Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	-62	25	9	10	0	0	0	0	0	-19
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	-53	98	23	-253	52	8	0	0	0	-125
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	-7	504	416	-802	125	13	92	-8	0	334
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	0	119	968	-535	440	57	180	112	-8	1.333
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	0	31	476	304	380	271	357	34	0	1.854
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	0	-7	109	182	253	175	213	23	0	947
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	0	0	6	36	134	78	210	0	0	464
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	0	15	-42	16	0	-11
ab 90 cm	[1000 m³]	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	-122	769	2.007	-1.058	1.384	616	1.026	178	-8	4.793


BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Privatwald, Fichte Freistaat Sachsen

2002-2012: + 4,793 Mio. m³ (67 % o. 3,1 Mio. m³ > 80 J.; 68 % > 40 cm; 30 % > 50 cm)

Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten



BWI 3: Veränderung des Vorrates [Mio. m³] 2002-2012 nach BaumaltersklassePrivatwald, Fichte Freistaat Sachsen2002-2012: + 4,793 Mio. m³ (67 % o. 3,1 Mio. m³ > 80 J.; 68 % > 40 cm; 30 % > 50 cm)*Bäume ab 7 cm Bhd. aller Bestandesschichten*

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	36	33	5	3	0	0	0	0	0	67
10,0 - 19,9 cm	Sek	32	112	70	39	12	7	2	0	0	219
20,0 - 29,9 cm	Sek	3	85	90	68	57	33	9	2	0	277
30,0 - 39,9 cm	Sek		30	80	82	84	43	17	3	1	263
40,0 - 49,9 cm	Sek		7	40	52	77	46	15	2	0	194
50,0 - 59,9 cm	Sek		1	10	25	37	32	13	1	0	94
60,0 - 69,9 cm	Sek			3	4	13	11	12	0	0	36
70,0 - 79,9 cm	Sek						1	2	1	0	4
ab 90 cm	Sek							1	0	0	1
alle BHD-Stufen	Sek	48	121	113	97	106	62	27	5	1	391

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[%]	+/-38,7%	+/-87,2%	+/-66,6%	+/-126,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-151,2%
10,0 - 19,9 cm	SE[%]	+/-213,0%	+/-309,2%	+/-698,7%	+/-35,1%	+/-80,2%	+/-340,1%	+/-5484,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-216,8%
20,0 - 29,9 cm	SE[%]	+/-149,2%	+/-57,4%	+/-77,8%	+/-26,3%	+/-144,4%	+/-934,2%	+/-57,5%	+/-281,8%	+/-0,0%	+/-121,5%
30,0 - 39,9 cm	SE[%]		+/-105,1%	+/-31,4%	+/-52,7%	+/-85,5%	+/-366,6%	+/-57,1%	+/-77,6%	+/-96,9%	+/-35,5%
40,0 - 49,9 cm	SE[%]		+/-202,0%	+/-27,3%	+/-64,5%	+/-82,6%	+/-98,2%	+/-36,7%	+/-94,9%	+/-0,0%	+/-20,6%
50,0 - 59,9 cm	SE[%]		+/-96,9%	+/-33,6%	+/-47,4%	+/-67,9%	+/-82,0%	+/-51,2%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-22,4%
60,0 - 69,9 cm	SE[%]			+/-294,3%	+/-74,1%	+/-52,5%	+/-72,3%	+/-33,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-21,7%
70,0 - 79,9 cm	SE[%]						+/-96,9%	+/-91,4%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-402,6%
ab 90 cm	SE[%]							+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-96,9%
alle BHD-Stufen	SE[%]	+/-104,2%	+/-69,1%	+/-32,2%	+/-56,5%	+/-66,4%	+/-105,2%	+/-36,3%	+/-84,5%	+/-96,9%	+/-20,9%

1.08.14 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	%	334,8%	-133,3%	-47,2%	-54,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	42,4%	-77,8%	-18,4%	201,9%	-41,6%	-6,3%	-0,2%	0,0%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	-2,0%	150,9%	124,7%	-240,2%	37,4%	3,9%	27,5%	-2,3%	0,0%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%		8,9%	72,6%	-40,1%	33,0%	4,3%	13,5%	8,4%	-0,6%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%		1,7%	25,7%	16,4%	20,5%	14,6%	19,3%	1,9%	0,0%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%		-0,7%	11,5%	19,2%	26,7%	18,4%	22,5%	2,5%	0,0%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%			1,3%	7,8%	28,9%	16,9%	45,2%	0,0%	0,0%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%						-135,9%	384,8%	-149,0%	0,0%	100,0%
ab 90 cm	%							100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	-2,5%	16,1%	41,9%	-22,1%	28,9%	12,9%	21,4%	3,7%	-0,2%	100,0%