1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	[m³/ha]	-0	-1	-6	-2	5	8	10	4	4	3	0	**24**
Buche	[m³/ha]	0	-3	-7	-4	4	5	7	4	2	1	0	**9**
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha]	-0	-2	-2	4	8	5	4	1	1	1	0	**20**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha]	-0	-3	2	6	5	2	1	1	-0	1	0	**17**
alle Laubbäume	***[m³/ha]***	***-0***	***-2***	***-4***	***0***	***5***	***5***	***5***	***3***	***2***	***1***	***0***	***16***
Fichte	[m³/ha]	-0	-7	-10	2	13	11	6	2	1	0	0	**19**
Tanne	[m³/ha]	0	1	-5	-17	-10	8	12	11	3	1	0	**4**
Douglasie	[m³/ha]	-1	-12	-19	18	32	25	8	6	2	2	0	**60**
Kiefer	[m³/ha]	-2	-9	-2	18	18	6	2	0	0	0	0	**32**
Lärche	[m³/ha]	-1	-8	-16	5	30	15	4	1	0	0	0	**31**
alle Nadelbäume	***[m³/ha]***	***-1***	***-8***	***-7***	***8***	***16***	***10***	***4***	***2***	***1***	***0***	***0***	***24***
alle Baumarten	**[m³/ha]**	**-1**	**-6**	**-7**	**3**	**11**	**8**	**5**	**3**	**1**	**1**	**0**	**19**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	678	2.741	4.168	4.985	4.574	3.624	2.443	1.444	744	474	0	**11.320**
Buche	Sek	1.279	5.042	7.663	8.641	8.084	6.261	3.873	1.959	856	449	1	**16.612**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	963	3.482	4.233	3.708	2.554	1.423	695	302	137	85	0	**8.368**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	1.292	4.280	4.756	3.642	2.033	904	464	251	170	154	0	**9.110**
alle Laubbäume	***Sek***	***3.918***	***13.416***	***17.496***	***17.285***	***14.402***	***10.624***	***6.758***	***3.689***	***1.814***	***1.104***	***1***	***30.261***
Fichte	Sek	2.098	8.641	13.306	14.401	11.911	7.523	3.616	1.279	387	132	0	**21.609**
Tanne	Sek	168	665	1.181	1.627	1.865	1.684	1.220	680	326	145	0	**3.421**
Douglasie	Sek	183	848	1.255	1.343	1.157	786	438	236	112	48	0	**2.355**
Kiefer	Sek	1.516	5.306	8.963	9.954	7.177	3.061	741	112	21	8	3	**15.144**
Lärche	Sek	120	760	1.624	2.100	1.722	938	340	107	27	9	0	**3.788**
alle Nadelbäume	***Sek***	***3.970***	***15.091***	***23.514***	***25.297***	***20.444***	***12.303***	***5.764***	***2.245***	***829***	***332***	***3***	***35.537***
alle Baumarten	**Sek**	**7.548**	**26.019**	**36.559**	**37.295**	**30.840**	**20.856**	**11.863**	**5.744**	**2.609**	**1.428**	**4**	**50.469**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	[m³/ha]	1	-2	-7	12	17	-2	10	4	10	4	0	**46**
Buche	[m³/ha]	1	1	-3	-10	9	-2	-0	11	-1	10	0	**17**
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha]	0	1	-1	-3	3	3	4	0	1	-2	0	**6**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha]	-0	4	14	9	4	4	1	1	-0	0	0	**37**
alle Laubbäume	***[m³/ha]***	***0***	***1***	***5***	***8***	***11***	***4***	***5***	***4***	***3***	***3***	***0***	***44***
Fichte	[m³/ha]	-1	-3	-13	13	36	23	8	1	0	0	0	**66**
Tanne	[m³/ha]	5	-23	22	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
Douglasie	[m³/ha]		-16	18	-13	-14	-3	15	11	0	0	0	**-2**
Kiefer	[m³/ha]	-2	-5	10	20	16	4	-0	0	0	0	0	**43**
Lärche	[m³/ha]	-1	-2	-3	9	28	15	2	-1	1	0	0	**49**
alle Nadelbäume	***[m³/ha]***	***-1***	***-4***	***-3***	***16***	***27***	***15***	***4***	***1***	***0***	***0***	***0***	***55***
alle Baumarten	**[m³/ha]**	**-1**	**-2**	**-1**	**13**	**22**	**12**	**5**	**2**	**1**	**1**	**0**	**51**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	27	107	186	194	141	111	77	47	29	11	0	**384**
Buche	Sek	11	42	71	89	85	87	65	42	22	23	0	**230**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	14	73	97	86	57	41	25	11	3	3	0	**180**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	86	329	359	252	111	39	12	8	4	3	0	**635**
alle Laubbäume	***Sek***	***132***	***498***	***620***	***519***	***343***	***250***	***167***	***100***	***56***	***40***	***0***	***1.022***
Fichte	Sek	146	553	840	854	642	348	114	15	4	2	0	**1.144**
Tanne	Sek	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Douglasie	Sek		3	4	5	3	2	1	1	0	0	0	**7**
Kiefer	Sek	160	485	698	620	321	71	10	2	0	0	0	**988**
Lärche	Sek	9	58	99	117	102	43	11	5	2	0	0	**210**
alle Nadelbäume	***Sek***	***313***	***1.053***	***1.509***	***1.418***	***953***	***438***	***134***	***23***	***6***	***2***	***0***	***1.969***
alle Baumarten	**Sek**	**426**	**1.417**	**1.904**	**1.728**	**1.200**	**654**	**292**	**119**	**61**	**42**	**0**	**2.373**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	[m³/ha]		5	-57	19	-132	13	0	0	0	0	0	-152
Buche	[m³/ha]			-5	14	1	-26	10	22	0	36	0	53
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha]		-26	4	-2	14	0	9	0	0	0	0	-1
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha]	1	6	21	16	-4	0	0	0	0	0	0	40
alle Laubbäume	***[m³/ha]***	***1***	***3***	***13***	***10***	***-13***	***-6***	***2***	***3***	***0***	***5***	***0***	***18***
Fichte	[m³/ha]	1	13	-38	92	6	13	0	0	0	0	0	87
Kiefer	[m³/ha]	-1	-8	-2	5	16	1	0	0	0	0	0	11
Lärche	[m³/ha]		3	0	30	58	0	0	0	0	0	0	91
alle Nadelbäume	***[m³/ha]***	***-1***	***-5***	***-6***	***17***	***16***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22***
alle Baumarten	**[m³/ha]**	**-1**	**-3**	**-2**	**16**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**23**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek		2	1	4	3	2	0	0	0	0	0	**5**
Buche	Sek			2	2	1	3	3	2	0	2	0	**6**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		1	3	2	1	0	1	0	0	0	0	**3**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	3	19	15	6	1	0	0	0	0	0	0	**27**
alle Laubbäume	***Sek***	***3***	***21***	***20***	***13***	***4***	***5***	***4***	***2***	***0***	***2***	***0***	***34***
Fichte	Sek	1	8	12	13	7	4	0	0	0	0	0	**16**
Kiefer	Sek	25	62	81	58	30	1	0	0	0	0	0	**106**
Lärche	Sek		1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	**3**
alle Nadelbäume	***Sek***	***26***	***71***	***91***	***71***	***38***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***123***
alle Baumarten	**Sek**	**29**	**86**	**101**	**77**	**42**	**10**	**4**	**2**	**0**	**2**	**0**	**136**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	[m³/ha]	-0	-13	-9	34	4	-9	14	8	7	-0	0	**36**
Buche	[m³/ha]	1	2	-1	-5	3	5	3	2	-1	12	0	**21**
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha]	2	-20	9	23	-4	-4	-14	-13	-5	-5	0	**-32**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha]	-1	0	2	9	8	5	2	1	0	2	0	**28**
alle Laubbäume	***[m³/ha]***	***-0***	***-4***	***-0***	***14***	***7***	***5***	***6***	***3***	***2***	***4***	***0***	***35***
Fichte	[m³/ha]	-1	-4	-19	15	40	26	8	2	0	0	0	**68**
Tanne	[m³/ha]	7	-23	30	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
Douglasie	[m³/ha]			30	21	-171	7	63	39	0	0	0	**-12**
Kiefer	[m³/ha]	-1	-5	17	22	16	6	2	0	0	0	0	**58**
Lärche	[m³/ha]	-0	-12	-12	6	42	18	5	-1	2	0	0	**49**
alle Nadelbäume	***[m³/ha]***	***-1***	***-5***	***-10***	***16***	***34***	***21***	***6***	***1***	***0***	***0***	***0***	***63***
alle Baumarten	**[m³/ha]**	**-0**	**-5**	**-8**	**14**	**27**	**17**	**6**	**2**	**1**	**1**	**0**	**54**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	6	34	53	48	30	19	17	10	6	1	0	**103**
Buche	Sek	7	21	43	50	49	46	35	19	13	13	0	**126**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	7	20	21	16	9	7	2	2	1	2	0	**46**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	23	87	113	81	36	15	5	2	0	2	0	**203**
alle Laubbäume	***Sek***	***41***	***146***	***209***	***175***	***115***	***83***	***55***	***32***	***18***	***18***	***0***	***372***
Fichte	Sek	80	297	473	487	374	212	68	11	4	1	0	**638**
Tanne	Sek	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Douglasie	Sek			1	3	2	2	1	1	0	0	0	**4**
Kiefer	Sek	33	117	179	190	104	33	8	1	0	0	0	**291**
Lärche	Sek	3	29	50	69	61	25	9	3	2	0	0	**121**
alle Nadelbäume	***Sek***	***117***	***418***	***632***	***650***	***481***	***255***	***85***	***16***	***6***	***1***	***0***	***847***
alle Baumarten	**Sek**	**150**	**514**	**751**	**740**	**555**	**323**	**134**	**47**	**23**	**19**	**0**	**959**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	[m³/ha]	2	4	-22	16	16	-14	15	8	16	7	0	**48**
Buche	[m³/ha]	-0	0	12	-22	16	-13	-1	32	-7	2	0	**19**
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha]	1	4	0	-10	10	4	12	7	0	0	0	**28**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha]	2	0	16	4	2	4	3	-1	-3	-4	0	**23**
alle Laubbäume	***[m³/ha]***	***1***	***2***	***2***	***2***	***12***	***-1***	***9***	***8***	***2***	***1***	***0***	***39***
Fichte	[m³/ha]	-2	-2	-27	-28	28	25	7	1	0	0	0	**1**
Douglasie	[m³/ha]		-61	28	0	0	0	0	0	0	0	0	**-33**
Kiefer	[m³/ha]	-8	16	-8	12	-4	9	0	0	0	0	0	**17**
Lärche	[m³/ha]	-1	-6	-13	-14	21	20	-0	2	0	0	0	**9**
alle Nadelbäume	***[m³/ha]***	***-4***	***3***	***-20***	***-17***	***17***	***20***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3***
alle Baumarten	**[m³/ha]**	**-2**	**2**	**-13**	**-12**	**14**	**13**	**6**	**3**	**1**	**1**	**0**	**13**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	4	10	19	17	14	8	10	5	3	1	0	**45**
Buche	Sek	2	6	8	10	10	9	9	8	1	3	0	**30**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	3	12	20	15	11	6	3	1	0	0	0	**33**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	5	26	38	26	12	8	2	3	1	1	0	**67**
alle Laubbäume	***Sek***	***14***	***48***	***73***	***60***	***39***	***29***	***20***	***16***	***5***	***5***	***0***	***119***
Fichte	Sek	16	56	101	110	88	48	11	1	0	0	0	**142**
Douglasie	Sek		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Kiefer	Sek	10	31	51	51	28	10	0	0	0	0	0	**86**
Lärche	Sek	1	7	13	20	18	6	2	1	0	0	0	**34**
alle Nadelbäume	***Sek***	***26***	***86***	***149***	***151***	***110***	***62***	***12***	***2***	***0***	***0***	***0***	***201***
alle Baumarten	**Sek**	**39**	**125**	**200**	**184**	**136**	**88**	**31**	**17**	**5**	**5**	**0**	**257**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	[m³/ha]	1	1	-3	3	25	4	7	2	10	5	0	**55**
Buche	[m³/ha]	2	-3	-13	-17	19	-7	-8	24	2	9	0	**5**
andere Lb hoher Lebensdauer	[m³/ha]	-1	9	-6	-12	1	4	7	3	4	-2	0	**8**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m³/ha]	-1	7	20	9	4	3	0	1	-0	0	0	**44**
alle Laubbäume	***[m³/ha]***	***-0***	***4***	***8***	***6***	***14***	***6***	***5***	***4***	***4***	***2***	***0***	***52***
Fichte	[m³/ha]	-1	-1	4	23	34	18	9	1	0	0	0	**87**
Douglasie	[m³/ha]		-17	18	-23	89	0	0	0	0	0	0	**66**
Kiefer	[m³/ha]	-1	-6	13	23	17	3	-1	-0	0	0	0	**48**
Lärche	[m³/ha]	-3	12	9	24	9	11	0	-2	0	0	0	**60**
alle Nadelbäume	***[m³/ha]***	***-1***	***-4***	***10***	***23***	***24***	***9***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65***
alle Baumarten	**[m³/ha]**	**-1**	**-1**	**9**	**17**	**20**	**8**	**4**	**1**	**1**	**1**	**0**	**59**

1.08.28 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L636mf_0212_bi / 2014-7-24 10:40:4.723)*

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	Angabe fehlt	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	17	64	117	129	98	85	53	34	20	9	0	**247**
Buche	Sek	2	16	19	29	25	29	18	13	8	5	0	**70**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	4	41	58	56	38	30	20	8	2	1	0	**109**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	57	208	204	145	70	20	5	4	3	0	0	**372**
alle Laubbäume	***Sek***	***77***	***301***	***339***	***285***	***197***	***143***	***92***	***53***	***33***	***15***	***0***	***544***
Fichte	Sek	50	198	272	262	193	93	35	3	0	1	0	**382**
Douglasie	Sek		2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**2**
Kiefer	Sek	93	286	411	345	170	28	4	2	0	0	0	**548**
Lärche	Sek	5	22	38	28	24	13	0	1	0	0	0	**57**
alle Nadelbäume	***Sek***	***146***	***496***	***680***	***587***	***353***	***127***	***39***	***6***	***0***	***1***	***0***	***870***
alle Baumarten	**Sek**	**213**	**725**	**913**	**782**	**507**	**254**	**129**	**57**	**33**	**16**	**0**	**1.122**